

١١٠

الألف كتاب (الثاني)

الانقراض الكبير

ما الذي قضى على الديناصورات ودمر الأرض؟

ميكائيل ألبى
تأليف: جيمس لفلوك
ترجمة: د. أحمد مستجير



الهيئة العامة للغات والنشر



Bibliotheca Alexandrina



0147771

الانقراض الكبير
ما الذي يتخبره الناس في عصر الانقراض؟

الألفا كتاب الثاني

الإشراف العام

و. سمير سرحان

رئيسة مجلة البدار

رئيس التحرير

لمنى المطيعي

مدير التحرير

أحمد صليحة

سكرتير التحرير

محمود عبده

الإشراف الفني

محمد قطب

الإخراج الفني

ميراد نسيم

الانقراض الكبير ما الذى قضى على الديناصورات ودمر الأرض؟

تأليف
ميكائيل ألبي و جيمس لفلوك
ترجمة
د. أحمد مستجير
عميد كلية الزراعة - جامعة القاهرة



المكتبة العامة للمكتبة الوطنية

١٩٩٢

هذه هي الترجمة العربية الكاملة لكتاب

The great extinction

by

Michael Allaby & James Lovelock

بسم الله الرحمن الرحيم

« إذا الشمس كورت . وإذا النجوم انكدرت . وإذا
الجال سيرت . وإذا البحار عطلت . وإذا الوحوش حشرت .
وإذا البحار سجرت ... وإذا السماء كشطت . وإذا الجحيم
سجرت .. »

صدق الله العظيم

كورت : لفت وعى ضوءها	حشرت : جمعت ذاملة من شدة الفزع
انكدرت : تساقطت من مواقعها وتناثرت	سجرت : تأججت نارا تلتهب .
سيرت : تحركت من مواضعها حتى صار كالحباء .	كشطت : أزيلت من أماكنها .
عطلت : تركت بلا راع	سجرت : توقدت واشتدت .

مقدمة المترجم

كما الفن ، كما الأدب ، يرتكز العلم على الملاحظة ، والخيال ،
والجسارة . وكل هذه أنشطة ذهنية بشرية تحاول ابتكار العالم : تجريده ،
والتمعق في جوهره ، بغية الوصول الى المحال - الحقيقة !

ثمة بهجة تملأ رجل العلم - ومثله الفنان والأديب - ان هو أحس ان
عملا له قد اقترب أو يقترب من الحقيقة .

مدهش هذا العلم وجميل حقا ، منهجه ، أسلوبه ، نماذجه ، نتائجه ،
تأملاته ، نظرياته !

وهذا الكتاب يقدم نظرية ، نظرية تبرر انقراض الدينوسورات -
ومعها ٧٠٪ من الكائنات الحية التي كانت تعيش على ظهر الأرض منذ
٦٥ مليون سنة . قد لا تبدو النظرية - وموضوعها - للبعض مثيرة ،
فماذا « سنستفيد » منها على أي حال ؟ ولكن ، حتى من يرى هذا ، سيجد
متعة - أي متعة - فماذا في تأمل « الطريقة » التي استطاع بها المؤلفان ان
ان يكتشفا - في جسارة - واقعة حدثت منذ ملايين السنين ، بتفاصيلها
- حتى لكانهما قد شاهداها - كيف جمعا وعرضا وناقشا - تعصيذا
لنظرية - وجبة عجيبة متماسكة من علوم التطور والحفريات والوراثة
والجيولوجيا والبيئة والمناخ والأقلمة والكيمياء والفيزياء والفلك ، كيف
استطاعا ان يبحرا في مسالك بعيدة ليوثقا النظرية - لتؤكد لنا وحدة
المعرفة . فان لم تكن من فائدة لهذا الكتاب سوى توضيح الطريقة التي
تصاغ بها النظريات العلمية ، فكفى بذلك ، عندى ، سببا لترجمته . لكنى
أعرف ان هذا الكتاب سيبهز القارئ ، وسيضيف الكثير الى معلوماته ،
وسيدفعه دفعا الى آفاق جديدة من التأمل الثرى والتفكير العميق .

٩ مارس سنة ١٩٨٨ .

أحمد مستجير

مقدمة

في أواخر السبعينات من قرننا هذا ، بدأت في الولايات المتحدة وانجلترا سلسلة من البحوث المنشورة تلقى الضوء على واحد من أكبر الألغاز العلمية في العصر الحالي . ان هذا الكتاب يحكى قصة حل هذا اللغز .

يتعلق هذا اللغز - هامشيا - بمصير الدينوصورات ، والدينوصورات هي تلك الزواحف الضخمة التي « حكمت » العالم (وسنخفف من معنى هذه الكلمة كثيرا) منذ زمن سحيق في القدم ، والتي اثار اكتشافها البهجة في صدور الصغار (والكبار) منذ نحو قرن ونصف من الزمان . وهامشية هذا الوجه من القصة لا ترجع الى أن الدينوصورات ليست مثيرة أو انها ليست مهمة ، وانما لأننا قد نميل - في خضم انفعالنا بها - الى أن ننسى انها لم تندثر وحدها ، وانما اندثر معها أيضا نحو ٧٠٪ من انواع الكائنات الحية .

ليست كل الزواحف الكبيرة دينوصورات ، ولم تكن كلها يوما هكذا ، فهذه الكلمة تصف مجموعة ضخمة متباينة من الحيوانات تشكل عددا كبيرا من الأنواع ، ولكنها بالرغم من ذلك كلمة دقيقة . كانت الزواحف هي الشكل الحيواني السائد على اليابسة لفترة بلغت بضعة ملايين من السنين ، وكانت الدينوصورات هي قمة التطور في الزواحف . وهي لم تكن حيوانات بطيئة غبية خرقاء سيئة التكيف لا تصلح الا كنكات «كارتون» في مجال التطور ، فلقد كان الكثير منها سريع الحركة ، وكانت جميعا متقدمة تطوريا ، وكان كل منها في زمانه مكيفا كافضل ما يكون للبيئة التي يعيش فيها .

ولقد بقيت الدينوصورات مزدهرة عموما حتى ٦٥ مليون سنة مضت . ثم اندثرت معظم الزواحف من فوق سطح الأرض . ولقد اختفت على حد علمنا كل الدينوصورات ، ومعها أيضا - كما ذكرنا - نحو ثلاثة أرباع الأنواع التي كانت تحيا على الأرض .

هذا هو اللغز . ماذا حدث فتسبب في هذه الكارثة الهائلة ؟

نحن نعتقد أننا نعرف السبب .

ظل اللغز دون حل لفترة بلغت قرنا ونصف ، وذلك من تاريخ كشف أول العظام المتحفرة لنوع من زواحف ضخمة لا تشبه ايا من الزواحف الموجودة الآن . أما الشيء المؤكد - وأن كان قد شكك فيه هو الآخر - فهو أن طبقات الصخور الرسوبية - التي تحمل أحافير الدينوصورات وكثير غيرها من الحيوانات - ترقد مباشرة تحت طبقات أخرى لا تكاد تحمل أية أحافير وليس بهائى من أحافير الدينوصورات ، وهذه الطبقات الأخيرة هي بالضرورة أحدث عمرا لأنها توجد فوق الصخور الرسوبية . تنتسب الصخور التي تحمل أحافير الدينوصورات الى عصر يسميه الحفريون والجيولوجيون باسم العصر الطباشيرى ، أما الطبقات التي تعلوها فتنتسب للحقب الثالث الجيولوجى . تمثل الحدود بين هاتين الطبقتين نهاية فصل فى تاريخ كوكبنا ، وبداية فصل تال . ثم تعود الأحافير وتظهر مرة أخرى فى الصخور الأحدث عمرا الموجودة أعلى هاتين الطبقتين ، لكنها أحافير أنواع مختلفة عاشت فى عالم تسوده الثدييات . لقد حدث الانقراض - هذا الانقراض الجماعى - فجأة .

قدمت تفسيرات كثيرة ، كان بعضها معقولا ، وكان البعض الآخر مجرد سخف . يقبل الآن تفسير ما ، ثم يقبل من بعده تفسير آخر ، وهكذا حتى أصبح لدينا بعض الزمن من التفسيرات ما حدا بالكثير من العلماء الى امالتها جميعا ، ليدرجوا القضية فى مجال ما لا يفسر .

وبال حال هكذا حتى ظهر اكتشاف جديد . قلنا الآن ان طبقة صخور العصر الطباشيرى تقع مباشرة تحت صخور الحقب الثالث وتلاصقه . ولكن هذا ليس صحيحا تماما . فبينهما - وفى مواقع كثيرة من العالم - توجد طبقة رقيقة من الصلصال . وعندما حللت عينات من هذا الصلصال اتضح أن مكوناته الكيميائية تختلف اختلافا واسعا عن تركيب الصلصال العادى وعن تركيب الصخور الموجودة فوقه أو تحته .

من هنا تبدأ قصتنا ، من الصلصال على التخوم بين الطبقتين . ان القصة أشبه ما تكون بالرواية البوليسية . تكتشف جثة - أو جثث كثيرة فى روايتنا الحالية . تفشل كل محاولات تفسير سبب الموت . ثم تظهر الأدلة من حيث لا نحسب - فقد انشغل العلماء فى فحص شيء مختلف تماما ، ولم يفكروا فى التوافق الزمنى الا مؤخرا . وما أن تفك طلاسم هذه الدلائل حتى تبرز صورة لكارثة هائلة !

اننا نعتقد أن محاولتنا فى فهم الأدلة هي فتح جديد فى بابيه . طبيعى أن يكون الكثير من توصيفنا للواقعة وما قد حدث فى أعقابها هو مجرد

تأملات ، لكنها تأملات معقولة من الناحية العلمية • قد لا يكون ما نصفه هو ما حدث فعلا ، ولكننا متأكدون من أننا نصف ما يمكن أن يكون واقع ما حدث • وهذا ليس أمرا سهلا ، لأن الكارثة ذاتها كانت أبعد بمراحل من كل ما خبره جنسنا البشرى ، أبعد بكثير من كل الظواهر التى أمكن تحقيقها تجريبيا • ان ما حدث يتحدى كل قدراتنا التصورية •

كانت الكارثة هائلة ، أبعد بكثير من كل ما أمكن للإنسان العصرى أن يصنع ، حتى لو فجرنا كل أسلحتنا الذرية فى وقت واحد • لهذه الحقيقة تضمينات ، وهى تظهر أهمية خاصة لقصة حدثت من دهور مضت • اذا كانت الكارثة الضخمة قد فشلت فى تدمير الحياة على أرضنا ، فكيف تكون نظرتنا للتهديدات المفترضة اليوم من الصناعة أو الحروب ، والتى يمتدح الكثيرون بوجودها ؟ هل يمكن أن ندمر جنسنا البشرى ، دعه من تدمير الحياة كلها ؟ فإذا لم يكن فى استطاعتنا أن نفعل حتى هذا ، فما هو مدى تكيف الحياة نفسها ؟ كم يتطلب الأمر كى نغير وجه الأرض ونحيلها الى أحافير وحطام وأشباح ؟ •

هذه افكار قد تشغلك بعد قراءة الكتاب • ولكن دعنا نحكى القصة أولا • لقد بدأت فى جنوب انجلترا بامراة ، كان اسمها مارى آننج ••

جيمس لفلوك

لونسستون - كورنول

ميكايل آلبى

ويدبريدج - كورنول

الفصل الأول

العثور على الجثة

لم تكن ماري آننج (١٧٩٩ - ١٨٤٧) مجرد امرأة عادية • تلقت قسما ضئيلا من التعليم الرسمي ، لكنها وجهت اهتمامها الى حرفة بذاتها ، وبإلها من حرفة ا تخصصت في البحث عن الأحافير ، وبيعها ، لتشتهر في نهاية الأمر بقدرتها الفائقة على تحديد أماكن وجود الأحافير - وكان ملك سكسونيا واحدا من عملائها - ويزدهار عملها تعلمت الكثير عن بضاعتها الغريبة •

كانت تعيش في قرية لايم ريجيس ، بمقاطعة دورسيت على الشاطئ الجنوبي لانجلترا ، حيث الصخور الطباشيرية الغنية ببقايا النباتات والحيوانات التي عاشت في الأزمنة القديمة ، وحفظت ودقت بعد موتها في المواد الرسوبية التي يأتي بها البحر • ثم تعرضت الصخور الأقدم عندما قام البحر في العصر الحديث بنحت سطح المنحدرات الصخرية على الشاطئ ليزيل الطبقات التي رسبت عليها مؤخرا • كانت هذه المنحدرات هي الأماكن التي فتشت فيها ماري ، وفحصت بها محتويات الانزلاقات الأرضية والأسطح الطباشيرية التي تتعري كلما سقطت الى الشاطئ • قطعة سائبة من المادة •

عرفها والدها بعملية جمع الأحافير ، كانت حرفته هي النجارة ، ولكنه كان يهتم بالعالم الطبيعي اهتماما واضحا ، شانه في ذلك شأن الكثير من الأوروبيين في مطلع القرن التاسع عشر • ولقد كان هاويا متحمسا لجمع الأحافير الغريبة •

كانت ماري تصبح في تجواله ، وبدأت مجموعتها الخاصة من الأحافير • لا يستطيع كل شخص أن يحيا في جوار الأجزاء الطباشيرية ، ولقد نشأت بسرعة أسواق في أماكن أخرى من إنجلترا تباع فيها الأحافير • كان عمر ماري احدى عشرة سنة عندما باعت أولى عيانتها •

ثم توفى مستر آننج ، وكان على ماري أن تبحث عن وسيلة للانفاق على عائلتها . كثفت بحثها إذن عن الأحافير ، وأخذت تبيع أعدادا أكبر منها ، وظلت تعمل عائلتها بهذه الطريقة طالما لزم ذلك ، إلا أن ذبوع شهرتها جعل مهنتها في جمع الأحافير وبيعها أنجح من أن تترك . بل الحق أنها أصبحت شيئا كالأسطورة . غير أن طول تعرضها للجسر البارد قد تسبب في إصابتها بالروماتيزم الحاد . لكن ، لم يكن هناك ما يحولها عن طريقها في الحياة - أو هكذا بدا لها .

كانت شواطئ دورسيت أيضا منطقة معروفة لقضاء الصيف ، ولقد شارك الكثيرون من المصطافين ماري الحماس في جمع الأحافير . وبذا افتتحت للجمهور « مستودعا للأحافير » ، ليزداد دخلها . وما يزال الكثير من أحافير ماري آننج موجودا حتى الآن في المتحف البريطاني (للتاريخ الطبيعي) . اختفى بالطبع « مستودع الأحافير » ، لكن المبنى الذي كان يضمه ما يزال قائما في قرية لايم ريجيس على مبعده بضعة أمطار من الشاطئ .

وفي نحو عام ١٨١٠ اكتشفت ماري في الأجراف عظام حيوان بحري ضخم لا يشبه أيا من الحيوانات الحالية . كانت العظام ما تزال مترابطة ، ومنها لم يكن من الصعب أن يقوم العلماء بمحاولة لإعادة تركيب الشكل الحي للحيوان الذي كانته . ولقد أطلق عليه فيما بعد اسم الأكصور .

عندما أعيد تركيب الأكصور كان شبيها بالسفكة ، فله الشكل العالم للأسمالك . لكن أطرافه كانت أطراف حيوان ثديي بحري ، وكالثدييات البحرية كان الواضح أنه يتنفس الهواء ، بالزئذات لا بالخياشيم . فإذا نظرنا إلى النواحي الهامة الأخرى وجدناه في وضوح من الزواحف . وبذا تبنت صورة زاحف ضخم ، فيه شيء من السفكة وفيه أيضا من الدلفين الحديث ، كان يحيا في البحر - هو شيء يمكن أن يقال له « سحلية سمكية » . ما هذا الحيوان ؟ من أين أتى ؟ وأين يعيش الآن ؟ واشتهر أكصور ماري آننج . لقد عثرت ماري على الجثة ، أو قل أنها على الأقل قد عثرت على « إحدى » الجثث .

لم يكن هذا هو الحيوان الغريب الوحيد الذي عثر على بقاياها . لا ولم يكن حتى أول حيوان . ففي عام ١٧٧٠ ، وفي بلدة ماشترخت الهولندية الواقعة على نهر موس ، عثر على فكي سحلية هائلة في كهف طباشيري تحت الأرض ، سميت فيما بعد باسم « موساصور » (أي سحلية موسى) . واقترح أن هذين الفكين لزاحف بحري لاجم مفترس ، يبلغ طوله

٦ - ٨ أمتار ، ذى ذيل طويل كان يستخدمه فى السباحة ، وأطرافه حورت لتعمل كمجاديف .

وفى عام ١٧٨٤ عثر على بقايا زاحف طائر صغير يشبه الخفاش، وكان ذلك فى بافاريا ، ولقد أطلق على هذا المخلوق اسم « تيروصور » .

ثم ، فى عام ١٨٢٢ ، عثرت امرأة تسمى مسز مانتل على بعض الأسنان الحفرية فى حديقته بمقاطعة سبكس بجنوب إنجلترا، وعرضتها على زوجها الدكتور جديون مانتل ، وكان ممارسا عاما وحفريا هاريا ممتازا . بدت هذه الأسنان له شبيهة بأسنان سحلية إيجوانا التى يعرفها ، سوى أنها كانت أكبر بكثير . ثم اكتشفت على مقربة من نفس هذا الموقع عظام بدا أنها تنتنسب لصاحب الأسنان . قام الدكتور مانتل إذن - مفترضا أن البقايا لزاحف يشبه سحلية إيجوانا - بإعادة تركيب العظام ، ونشر نتيجة عمله عام ١٨٢٥ وصف فيها ما أسماه « إيجوانودون » ، وهو زاحف يشبه - عموما - سحلية إيجوانا الموجودة الآن ، وأن كان ذا رجلين اثنتين ، وارتفاعه عند الوقوف يصل الى عشرة أمتار . وبينما كان مانتل منشغلا فى تركيب الإيجوانودون مستعينا بأحد الحفرين كان وإيام يكلاند ، استاذ الجيولوجيا بجامعة أكسفورد، يقوم بعمل مشابه يعيد به تركيب حيوان يسمى « ميغالوصورس » وكان لاحما رهيبا . كانت عظام هذا الحيوان قد اكتشفت فى مقاطعة أكسفورد عام ١٨٢٤ . غدا الاهتمام بهذه الاكتشافات عظيما ، وكذا أيضا أصبح البحث عن عظام أخرى شبيهة . وما أن وصلنا عام ١٨٤١ حتى كان العلماء قد عرفوا تسعة أجناس من هذه الحيوانات المنقرضة . وبعد مرور ثلاثين عاما - ما بين ١٨٧٧ و ١٨٨٠ عثر فى مدينة بيرنيسارت ببلجيكا على واحد وثلاثين إيجوانودونا تنتنسب جميعا لإيجوانودون دكتور مانتل .

كان السير ريتشارد أوين - الانجليزى عالم التشريح والحيوان - هو من صاغ فى عام ١٨٤١ اسما لهذه الرتبة من الحيوانات ، فضم الكلمتين اليونانيتين : دينوص (وتعنى الرهيبية) وصورس (وتعنى السحلية) فى كلمة واحدة هى دينوصور . حسنا ، لقد أعطينا هذه الجثث الاسم ، ولكن ، هل عرفنا هويتها ؟

كان الناس على مر التاريخ يعثرون على ما يبدو عظاما ماردة ، وكانت هذه العظام تفسر - فلايد من تفسير لها - على أنها بقايا مردة . كانوا يعتقدون بأن سلالات عملاقة من البشر - أم هل نقول من شبيهات البشر - كانت تعمّر هذه الأرض من زمان طويل ، يصاحبها أشكال ماردة

من الحيوانات الموجودة الآن • ثمة أحفورة شهييرة تعرفوا عليها - وتكثروا منها على ما يبدو - كانت هي « غراب سيدنا نوح » • ويبدو أننا لو عرفنا الحقيقة فسند على الأغلب أن كل أساطيرنا عن العملاقة وعن العملاقة من جنس البشر في المناطق الملازمة لحفظ الأحافير - إنما ترجع إلى اكتشاف مثل هذه العظام ، بجانب آثار الأقدام المحفوظة هنا وهناك • فالعظام وآثار الأقدام لم تكن أذن تشكل أية صعوبات فلسفية للناس في العصور القديمة • لا ولم تسبب أية صعوبات لمعظم الناس في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر • لقد كانوا يعتقدون أن كل الأنواع قد خلقت سويا وأن معظمها قد هلك في الطوفان العظيم ولم يبق منها إلا ما حفظه سيدنا نوح •

اهملوا بعضا من الصعوبات التي لا بد وأن قد واجهها نوح • كان لا بد لسفينته أن تتسع لحمل ما يبلغ نحو مليون نوع من الحشرات ، ٢٥ ألف نوع من الطيور و ٢٥٠٠ نوع من البرمائيات وستة آلاف نوع من الزواحف وبضعة آلاف نوع من الثدييات بجانب عشرات الآلاف من أنواع الكائنات الدقيقة ، ومعها بالطبع غذاؤها • كان حجم سفينة نحو ٤٣٨٠٠ مترا مكعبا •

أيا كان الأمر ، فإن ما اكتشف في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر من أن العظام وآثار الأقدام وغيرها من البقايا لم تكن لبشر من المدة وإنما لحيوانات مختلفة تماما ، هذا الاكتشاف قد قاد أساسا إلى تاملات عن أحوال الأرض قبل الطوفان • كانت وجهة النظر المقبولة في تلك الأيام هي أن خلق الكائنات قد تم في الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد ٢٣ أكتوبر سنة ٤٠٠٤ قبل الميلاد • وهذا التاريخ هو كل ما يذكره الكثيرون عن رئيس أساقفة أرمناغ • جيمس آش ، (١٥٨١ - ١٦٥٦) ، ذلك الرجل المثقف الموهوب ، الذي توصل إلى هذا التاريخ بأن عد الأجيال - في قائمة النسل الموجودة بسفر التكوين - حتى مولد المسيح • ليس في هذا ما يجعل هذا الأسقف الطيب أول من صمم نمطا رياضيا لوصف الحقيقة ؟ إذا كان الأمر كذلك ، فلا أقل من أن يتمتع نسله من المعاصرين عن السخرية منه • وعلى أية حال فلقد رسخ التاريخ ٤٠٠٤ ق م • تماما في القرن التاسع عشر ولم يكن يجرؤ على الاعتراض عليه إلا الشجاع حقًا •

كان من الضروري في النهاية أن يعترض عليه العلماء • ومن الطبيعي أن العلم يستخدم الأنماط ، لكنه يختلف عن غيره من النظم التي تستخدم الأنماط في أنه يختبر أنماطه على الظواهر المشاهدة في العالم

الواقعي ، وفي أنه مستمد - نظريا على الأقل - أن يطرح أنماطه جانباً إذا ما وجد أن قدرتها على الوصف قاصرة . كان أول من تشكك في هذا النمط لخلق الكائنات هم الجيولوجيون . كانت دراسة الصخور قد أصبحت في القرن التاسع عشر موضوعاً يتابعه الكثيرون ، وبينما كان الهواة يجمعون البيانات والعينات ، كان المتخصصون يبحثون في تضمينات ما يجده هؤلاء الهواة .

كان جيمس هاتون (١٧٢٧ - ١٧٩٧) طبيباً اسكتلندياً تحول ليصبح جيولوجياً . قدم هذا العالم عام ١٧٨٥ بالجمعية الملكية بادنبرة بحثاً أعلن فيه نظرية « المشابهة » ، وهي نظرية تقترح أن العمليات الجيولوجية التي يمكن ملاحظة عملها الآن على الأرض قد عملت دائماً بنفس الطريقة خلال تاريخ هذا الكوكب ، وعلى هذا فإذا لاحظنا - على سبيل المثال - تجرير البراكين وفحصنا الصخور التي تنشأ عن ذلك ، فمن الممكن أن نستنتج حدوث البراكين في العصور القديمة إذا ما عثرنا على صخور مشابهة لم نرصد بجوارها أية انفجارات بركانية . افترض هاتون إذن أننا إذا عرفنا العملية التي تنتج نوعاً من الصخور فلنا أن نقول أن نفس العملية هي المسؤولة عن إنتاج نفس الصخور خلال التاريخ . وتكمن أهمية هذه النظرية في رفض التبرير بحدوث الكوارث أو التدمير الفجائي كمكونات ضرورية لتفسير وجود الصخور التي نراها حولنا اليوم .

وبعد فترة قصيرة لاحظ وليام سميث (١٧٦٩ - ١٨٢٩) - وهو مساح جال خلال بريطانيا يخصص طبيعة الريف لحساب شركات بناء القنوات - لاحظ أن توالى طبقات الصخور يحدث دائماً بنفس النظام ، وأنه من الممكن أن تستخدم أحافير معينة في تحديد الطبقات بالصخور الرسوبية .

وعندما فحصت هذه الملاحظات مع غيرها مما أورده جيولوجيون آخر ، ظهرت تضمينات معينة . فمن فحص الصخور الرسوبية يمكن أن نقول أنها قد تكونت عن تراكم الرسابة ، التي قد تظهر فيها بعض البكتينات الحية ، ثم أنها قد ضغطت تحت ثقل الصخور من فوقها . وقد تحدث أحياناً عمليات أخرى ، فتشوه الطبقات ، أو تسخن أو تعرض لسوائل أو غازات تسبب بها تغيرات كيميائية . ولقد أمكن ملاحظة أن هذه الصخور قد تكونت خلال حقبة معينة تراكت فيها الرسابة ، تخللتها حقبة لم تضاف فيها أية رواسب . كما لوحظ أيضاً أن عمليات مشابهة لا زالت تحدث حتى الآن ، فهناك مواقع كثيرة يحدث فيها الترسيب ويمكن فيها قياس معدل . ومن مثل هذه القياسات يمكن تقدير الزمن الذي يستغرقه


تكوين طبقة من الصخور ذات سمك معين • ومنه يمكن تقدير عمر طبقات الصخور الواقية • وكانت نتيجة ذلك أن اتضح أن عمر هذه الصخور كان أقدم بكثير مما كان يظن • كان من الضروري إذن أن يهمل تاريخ أشر ، وأن يقدر عمر الأرض بالملايين لا بالآلاف بل وبمئات الملايين ، بل وبمئات الملايين (ونحن نعرف الآن ، باستخدام القياس الإشعاعي الدقيق ، أنه يقدر بآلاف الملايين من السنين) • كان لذلك تضميناته بالنسبة لأحافير الردة أيضا • فقد أصبح من الجلى من مستويات الصخور التى عثر فيها على هذه الأحافير أنها عاشت حقا منذ زمن سحيق جدا • كان من الضروري إذن أن تتغير النظرة التقليدية للعالم الطبيعى ، ولقد تغيرت •

ثم لوحظ أن بقايا الحيوانات القديمة تحمل شبيها بالحيوانات المعاصرة يصعب تفسيره عن طريق نظرية الكارثة الفجائية • وعندما قرنت مثل هذه الملاحظات بأخرى صارمة عن العلاقات بين الأنواع الحية، نشأت نظرية التطور عن طريق الانتخاب الطبيعى ، ثم أن النظرية قد قبلت تدريجيا •

حلت إذن حلقة من الأسرار : فالعظام القديمة تنتسب الى مجموعة من الزواحف المنقرضة • وثبت أن عمر هذه العظام يبلغ عشرات الملايين من السنين ، وأن الانتخاب الطبيعى يمكن أن يفسر ظهور الزواحف على الأرض ، ومعها أيضا الأنواع التى خلفتها • عثرنا على جثة أو جثتين ثم قاد ذلك الى حمية فى البحث عن جثث أكثر ، وكانت النتيجة أن تحولت الجثة أو الجثتان الى عدد كبير من الجثث • ولأن الظروف التى تؤدى الى حفظ وتصغير بقايا النبات أو الحيوان فى ظروف غير عادية وخاصة جدا، فمن الممكن أن نتأكد حقا من أن الأحافير التى عثرنا عليها لا تمثل أكثر من قمة جبل ثلجى هائل للغاية – بل القمة غير الممتلئة حقا •

أصبح فى مقدورنا الآن أن نحدد تاريخ الأحافير بمساعدة الجيولوجيين والطرق التى ابتكروها لتحديد العمر ، ولقد عرفنا الآن هوية هذه الجثث وزمان موتها • فهى قد اختفت من فوق ظهر الأرض منذ ٦٥ مليون سنة •

كما كشفت البحوث أيضا عن سر آخر ، لعله أكثر إثارة • نتفق جميعا على انقراض الزواحف الضخمة تماما – بالرغم من أن قدامى مؤلفى قصص الخيال العلمى قد كتبوا قصصا رائعة ممتازة معتمة مفترضين أن بعضا من هذه الزواحف لا يزال يعيش فى بعض العوالم المفقودة • – ولكن ، ما هو السبب فى انقراضها ؟ وبالذات ، لماذا انقرضت أيضا مع الزواحف نسبة كبيرة من الأنواع الحية فجأة منذ نحو ٦٥ مليون



شكل (١)

ثلاثة دينوصورات نموذجية تمثل تلك التي اختلفت من فوق ظهر الأرض منذ ٦٥ مليون سنة أثناء الانقراض العظيم

سنة مضت ؟ كان السؤال ببساطة هو : ما الذى قضى عليها ؟ ولم يكن
ثمة اجابة شافية .

قد تبدو مشكلة اندثار هذه الكائنات العملاقة اقل اهمية من طريقة حياتها ، عند البعض منا ممن يفضلونها حية . فعلى اية حال ، ثمة بهجة تملؤنا فى تصور الشكل الذى كانت عليه هذه الكائنات ، وفى تخيل أنفسنا فى مواجهة تيرانوصورص ركس (الذى اندثر قبل ان يظهر

أسلافنا بملايين عديدة من السنين) ، لا فى تأمل موتها • ان فضول الانسان لا يمكن اشباعه ، لا سيما فى مواضيع كالتحريات البوليسية بحثا عن المجرم • اننا نود أن نعرف السبب فى انقراض الدينوصورات ، ونحس بأن من حقنا أن نعرف ، وأن العدل يتطلب أن نعرف •

أجهد المفكرون انفسهم - رجالا ونساء - على مدى سنين طويلة يحاولون حل اللغز ، ووصلوا أخيرا الى نقطة كان التأمل عبرها غير مجد • أصبح لدينا من التفسيرات الكثير ، حتى غدا من الصعب طرح أية تفسيرات جديدة • كانت المشكلة هى وجود شواهد قليلة لبناء التفسيرات • كان الشيء الوحيد المعروف عن يقين هو أن الانقراض قد حدث • وبذا كانت التفسيرات بالضرورة تخمينية ، فما يجب شخصا اليوم ، قد يرفضه آخر غدا •

تسجل الانقراضات الجماعية الحد الفاصل بين قسمين من أكبر اقسام الأزمنة الجيولوجية •

ابتدأ الحقب الميزوزوى (حقب الحياة الوسطى) منذ نحو ٢٢٥ مليون سنة ، وقد ازدهرت الزواحف على طوله • وهذا الحقب مقسم الى عصور عديدة آخرها العصر الطباشيرى • وتلا العصر الطباشيرى - منذ ٦٥ مليون سنة مضت - العصر الثالث وهو أول اقسام الحقب الحديث • وأيما كان سبب الانقراض فهو يعرف باسم « واقعة الحد بين العصر الطباشيرى والعصر الثالث » • وهذا الحد واقع حقيقى ، واقع مادى يمكنك أن تراه اذا كنت تبحث عنه ، فهو خط واضح يفصل ما بين طبقة من الصخور وطبقة أخرى فوقها (لم تعثر مارى آننج على أحافيرها عند هذا الحد - وإنما كانت طبقات تتبع الفترة الجورافية الدنيا ، وهذه قسم من العصر الجورافى يسبق العصر الطباشيرى - وهذا يجعل عمر أحافيرها ما بين ٦٥ و ٢٠٠ مليون سنة) • ثمة أماكن يمكن أن يرى فيها هذا الحد الفاصل • فى إنجلترا ، على سبيل المثال ، يظهر هذا الحد فى الأجراف الدنيا على شاطئ البحر فى ستضلاند ، بمقاطعة دورسيت ، وهذا موقع ليس ببعيد عن لايم ريجيس ، وأن كان أبعد عن منطقة مارى آننج •

هل حدث الانقراض بالفعل فجأة ؟ صحيح أن الأمر يبدو هكذا ، ولكن هل تم فجأة ؟ ان نوع التفسير الذى نحتاجه للواقعة الفجائية سيختلف تماما عن التفسير الملائم لواقعة حدثت تدريجيا • ان الاختلاف يشبه الفارق ما بين حادثة القتل وبين الموت على السرير بعد مرض طويل • ان السؤال الذى يلزم أن نجد اجابته أولا يختص بسرعة حدوث

الانقراض • ولقد قدمت تفسيرات بعضها يعضد الانقراض التدريجى والبعض الآخر يعضد الانقراض الفجائى •

افترض البعض أن السبب قد يرجع الى تغير الجو الذى نعرف أنه قد حدث أثناء العصر الطباشيرى • ولقد كان من المعتقد أن تغيرا سابقا فى الجو قد تسبب فى انقراضات جماعية مماثلة فى يده الحقب الميزوزوى ونهاية العصر البرمى السابق له ، فهذه الانقراضات على ما يبدو قد حدثت فجأة • ولكن ، إذا كانت الانقراضات الطباشيرية قد نتجت عن مثل هذا السبب ، فالأغلب أنها كانت ستحدث تدريجيا ، وفى هذه الحالة فإن انقراضات العصر الطباشيرى – الثالث الفجائية لن تكون بأكثر من نتاج مضلل لشواهد أحفورية مشتتة • قد لا يشير السجل الموجود بين أيدينا الا الى الأنواع التى اختفت خلال فترة قصيرة ، أما الأنواع التى اختفت قبلها على مدى زمنى أطول فقد لا تكون قد حفظت ، أو أننا لم نعثر على بقايا أحافيرها •

ولقد اكتشف حديثا أن المجال المغنطيسى للأرض يعكس قطبيته من آن لآخر ، فيصبح الشمال جنوبا والجنوب شمالا ، وفى أثناء حدوث هذا الانقلاب – وهو يحدث على فترة تبلغ بضعة آلاف من السنين – يضعف المغنيطوسفير – وهذا غلاف يكونه المجال المغنطيسى الذى يغلف كوكبنا • ومثل هذا الضعف قد يسمح بدخول اشعاعات مؤينة من الشمس ولقد كان من المعتقد أن حدوث هذا يضعف من طبقة الأوزون التى تمتص الكثير من الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس ، وبذا يشع سطح الأرض • فهل علينا أن نفترض أن الأنواع التى انقرضت قد قليت بالأشعة فوق البنفسجية ؟ اقترح أن الانقلابات القطبية قد تنتج عن التغيرات الجوية • وفى هذه الحالة ، هل يكون انقلاب القطبية مجرد مؤشر لحدوث الواقعة البيولوجية الهامة ، وليس سببا فيها ؟

ثمة تفسير دنيوى لهذا الانقراض يرجعه الى ظهور الثدييات • فالثدييات حيوانات ذات « دم حار » تحفظ درجة حرارة أجسامها مستقلة عن البيئة الخارجية (حيوانات ثابتة الحرارة) ، وبذا ففى مقدورها أن تحيا حياة ليلية ، أما الزواحف ذات « الدم البارد » فلا تستطيع هذا • فإذا كانت الزواحف القديمة تشبه الكثير من نظائرها من الزواحف المعاصرة ، فمن الممكن أن يقع بيضها المكشوف فريسة للثدييات تتغذى عليه أثناء الليل ، وبذا تنخفض الكفاءة التوالدية للزواحف ، ويقل عددها ، حتى تختفى تماما •

أو لربما انفجر نجم فى منطقتنا من المجرة فأمطر سطح الأرض بجسيمات عالية الطاقة • فهل ماتت أنواع من مثل هذا الاشعاع – بشكل

مباشر ، أو بشكل غير مباشر بأن أصبحت عقيمة ؟ هل هذا ما حدث ؟ وهل انقرضت لهذا السبب بسرعة ؟

ربما تحركت نسابة من « غبار - ما - بين - النجوم » خلال نظامنا الشمسي (أو تحرك نظامنا الشمسي خلال هذا الغبار ، فالنتيجة واحدة) . فهل حجب هذا الغبار الاشعاعات الشمسية لفترة قصيرة أظلمت فيها الدنيا ؟ ففي الظلام تموت النباتات الخضراء التي تعتمد على ضوء الشمس ، كما تنفق الحيوانات التي تتغذى عليها ، من الجوع . وعلى أية حال ، فالعالم المظلم البارد لن يكون المكان الملائم لحيوانات متغيرة الحرارة . فهل كان الأفاق في أواخر العصر الطباشيري مظلمًا ؟

ثم هناك احتمال أخير - هو أكثر الاحتمالات مأساوية . هل اصطدم بالأرض جسم ضخم - قل مثلاً نيزك أو شهاب ؟ لو حدث هذا ، فمآذيا يكون الأمر ؟ يطلق اسم « كويكب » على الأجسام الصلبة الصغيرة السابحة في الفضاء ، ولها حجم كوكب ضئيل - أى يبلغ قطرها نحو عشرة أميال أو ما أشبه . فالنيازك والنجمات تعتبر كويكبات تسير بسرعات عالية . أما المذنبات فهي أصغر حجماً ، ونصفها ثلج ، ولكنها تتحرك بسرعة أكبر بمراحل ، وبذا فقد تحوى نفس القدر من الطاقة تقريباً .

فإذا ما اخترق غلاف الأرض الجوى أحد الكويكبات بسرعة تبلغ عشرين كيلو متراً في الثانية (٧٢٠٠٠ كيلو متراً في الساعة) فسيصل سطح الأرض بعد ثوانٍ من الاختراق . هنا سيسمع صوت اصطدامه كقرعة هائلة - فرقة إذا قورنت بفرقة انفجار قنبلة هيدروجينية فتستكون مثل ثورة بركان سانت هيلين مقارنة بصوت إطلاق بندقية الأطفال - صوت هو أبعد بكثير جداً من كل ما خبره البشر على الإطلاق . سيجمل الصوت كخشد من الأمواج الصاخبة ، وستعم الزلازل أرجاء الأرض جميعاً . ولو سقط الجسم في البحر ، فستنتقل الأمواج عبر المحيطات بسرعة مئات الكيلومترات في الساعة ، لتشكل حوائط هائلة من الماء - قد يصل ارتفاعها إلى مائة متر - تكتسح شواطئ القارات . ولو أنه سقط على اليابسة اذن لأحدث حفرة ربما بلغ اتساع فوهتها ٢٠٠ كيلو متر ، لتنتثر مادة الأرض تدريجياً - على مدى فترة طويلة - إلى الغلاف الجوى ، ثم تسقط كغبار على الأرض . كما أن مرور جسم غنى بالطاقة خلال الغلاف الجوى سيسبب تفاعلات كيميائية في الهواء نفسه ، كما قد تحدث تفاعلات كيميائية عقب انتشار الغبار ، وربما انبثقت الصخور المصهورة من تحت قشرة الأرض عن البراكين الثائرة بسبب هذه الهزة العنيفة .

فاذا لم تكن زاوية دخول الجسم فى الغلاف الجوى حادة ولم يكن سريعا ، وانما كان دخوله بزاوية ضحلة ، بحيث يرتد عن سطح الأرض ليتخذ مدارا له غير ثابت ، فانه سيفقد فى كل دورة جزءا من طاقته ليقترّب بالتدريج من الأرض دورة بعد دورة حتى يسقط فى نهاية الامر على الأرض شظايا مبعثرة على اوسع جبهة . سيفقد الجسم ، فى الغلاف الجوى - اثناء هذا كله - طاقته الهائلة ، ان يكن ذلك ببطء .

هل قضى مثل هذا الاصطدام على مجاميع كاملة من الأنواع ؟ ان فى امكانه بالطبع ان يفعل ذلك . ان ستارا من الغبار يحجب ضوء الشمس عن الأرض سيسبب الموت للكثير من النباتات ، تماما كما اقترحنا بالنسبة لـ «غبار - ما - بين - النجوم» . كما يمكن للتفاعلات الكيماوية ان تحدث اظلاما مماثلا اذا ما تكونت كميات كبيرة من اكسيدات النتروجين . فاذا ما نتج عن هذه التفاسلات احماض النتريك والهيدروكلوريك والكبريتيك - وهو ما يمكن بالفعل ان يحدث - فان سقوطها « كمطر حمضى » سيسبب اتلافا كبيرا للنباتات .

والحقيقة ان ثمة طرقا عديدة يمكن بها لمثل هذه الواقعة ان تعزل الانقراض ، وان كان البعض من هذه التفسيرات الممكنة - مثل المسوت جوعا بسبب موت نباتات الغذاء - قد يدفعنا الى الا نهمل احتمال ان تضم آخر الزواحف الهائلة انواعا ثابتة درجة الحرارة .

كل هذا طيب جدا . ولكن هل ثمة من سبب يدعونا الى ان نفضل هذه الكارثة كتفسير للانقراض ، مقارنة بالتفسير السابقة ؟ هل يرتكز هذا التفسير على اكثر من مجرد التخمين ؟

للإجابة على هذا السؤال علينا ان نتعقب اثر الأدلة التى دفعت العلماء فى السنين القليلة الماضية الى الاستنباط بان الواقعة التى حدثت على الحد بين العصر الطباشيرى والعصر الثالث كانت بسبب ارتطام جسم فضائى بالأرض .

الفصل الثامن

أولى من الصلصال

كان ثمة علماء يخريشون فى سطح الأرض ، لم يكونوا يبحثون عن شئ معين ، وإنما كانوا يجمعون عينات للتحليل المعلى • كانوا يطمعون فى أن تدمهم هذه العينات ومحتواها الكيماوى بوسيلة أفضل من الوسائل المعروفة لتقدير عمر طبقات معينة من الصخور •

كانوا يعملون قرب مدينة جوبيو فى وسط إيطاليا ، وهذا هو الاسم الحديث للمدينة ، فقد كان أبناء مقاطعة أمبريا القديمة يسمونها إيجوفيوم ، وكذا أيضا كان يسميها الرومان الذين شيّدوا مسرحها • ثم وفى القرن الرابع عشر بنى بها قصر فخيم - بلازو دى كونسولى - ويشغله اليوم مجلس المدينة •

تقع جوبيو فى حوض جبال الأبينين بمقاطعة بيروجيا • وهى مدينة ساحرة جميلة تضم ٣٢٠٠٠ من السكان ، تفخر - كالبعض غيرها من المدن الإيطالية - بما تحتفظ به من تقاليد العصور الوسطى • ظلت هذه المدينة مستقلة قرونا طويلة ولم تتحد مع المملكة الإيطالية حتى عام ١٨٦٠ • وهى تشرف على هضبة عند سفح جبل انجينو ترتفع كثيرا عن سطح البحر وتتمتع بجو معتدل • والحقول حول جوبيو تنتج أعنابا يصنع منها نبيذ محلى ، كما تنتج الزيتون لاستخلاص الزيت ، بجانب العسروب •

غير أن جوبيو قد ذاع صيتها فى ربوع إيطاليا كلها ، منذ أوائل القرن السادس عشر ، بما تصنعه من الخزف • ثم أصبح الاسمنت والطوب فيها مؤخرا من أهم منتجاتها التجارية • يصنع الخزف والطوب من الصلصال المحلى ، وكان هذا الصلصال هو ما اهتم به العلماء •

كان اهتمامهم يرجع الى أن صلصال جوبيو يحدد فى وضوح تام الحدود ما بين العصر الطباشيرى والعصر الثالث . فجوبيو واحدة من تلك المواقع التى يمكن فيها أن ترى هذه الحدود بسهولة . فإذا كان التركيب الكيماوى لصلصال هذه الطبقة مميزا لها ، فمن الممكن أن يشير أى صلصال له نفس التركيب فى أى مكان بالعالم الى نفس هذه الحدود . سيعمل الصلصال اذن كعلامة يمكن بها أن نميز بشكل قاطع موقعا على قشرة الأرض عمره ٦٥ مليون سنة ، يكون عمر الصخور الموجودة تحته - بما تحمله من أحافير - أقدم من ٦٥ مليون سنة ، ويكون عمر الصخور من فوقه أقل من هذا .

ربما تطلبت كلمة « الصلصال » بعضا من التوضيح . فهى بالنسبة للجيولوجى لا تعنى أكثر من تربة مكونة من جسيمات قطرها أقل من ٠.٠٠٤ من المليمتر ، أى نحو نصف عرض كرية الدم الحمراء . وإذا ما كان الصلصال يمين الحد الأدنى لحجم جسيمات التربة فإن الرمل يعين الحد الأعلى ، فقطره يتراوح ما بين ٠.٠٥ من المليمتر (الرمل الناعم) و ٢.٠٠ مليمتر . وبذا فإن الصلصال أو الرمل لا يقلوان شيئا بالمرة - حسنا ، شيئا ذا وزن - عن كيمياء المادة التى تكونهما . وكل مادة أرضية معدنية تعنى عند الجيولوجى « صخورا » ، وبذا فليس هناك أى تمارض إذا استخدمنا كلمة « صخور » بدلا من « صلصال » أو « رمل » .

كان العلماء يفحصون هذا الصلصال بجوبيو . ووجدوا انه يحتوى على كميات عالية نسبيا من عنصرى الايريديوم والأوسميوم .

والايريديوم والأوسميوم معدنان ثمينان ، وهما ثمينان لأنهما نادرا الوجود . وهما يتتميان الى مجموعة المعادن البلاتينية (لأن أشهر معادن المجموعة هو البلاتين) . ويجانب ارتباطهما بالمجموعة البلاتينية فهما أيضا معدنان نيبيلان ، بسبب عزوفهما عن التلوث بالدخول فى التفاعلات الكيماوية . والمعادن النيبيلة تمر بنجاح فى اختبار الحامض ، وهذا يعنى أن الأحماض البسيطة لا تؤثر فيها ، وانما يذيبها الماء الملكى - وأن لم يكن ذلك بسهولة فى حالة الايريديوم والأوسميوم - والماء الملكى هو مزيج من حامض النيتريك وحامض الهيدروكلوريك . والمعادن النيبيلة الأخرى تضم الذهب والبلاتين والبلاديوم . ولأنها معادن نيبيلة فهى توجد عادة فى صورة معدن نقى (لولا صعوبة العثور عليها) .

اهتم العلماء فى جوبيو أساسا بالايريدوم والاوسميوم ، ولم تثرهم
بقية المعادن النبيلة الا فيما بعد .

والاييريديوم معدن ثقيل جدا ، والحقيقة أن الايريديوم والاوسميوم
هما الأكثر كثافة من بين العناصر الأرضية كلها . اكتشف الايريديوم عام
١٨٠٣ كيميائى انجليزى اسمه سميستون تينانت واطلق عليه الاسم
الاغريقى لـ « قوس قزح » . ويبلغ الوزن النوعى لهذا العنصر ٢٢ر٢٦
جم للسنتيمتر المكعب على درجة حرارة ٢٠ مئوية ، وعدده الذرى ٧٧
ووزنه الذرى ١٩٢ر٢٢ وينصهر على درجة حرارة أعلى من ٢٤٠٠ درجة
مئوية ويغلى على درجة ٤١٠٠° م ، وهو يستخدم كسبيكة مع
البلاتين فى صناعة الحلى ، وفى بعض الأطراف الكهربائية حيث تنفيذ
مقاومته لدرجات الحرارة العالية التى قد تتولد عن الشرر الكهربى ، وفى
بعض الأدوات الجراحية ، وفى أطراف ريشة أقلام الحبر . وهو يكون
أيضا جزءا من المعدن الذى يصنع منه النموذج الأصلى للمعتر والكيلوجرام
الدولى (١٠٪ من الايريديوم فى سبيكة مع ٩٠٪ بلاتين) .

يوجد عنصر الأوسميوم فى المعدن المسمى أوسميريديوم ، ويوجد
فى معظم ركاز البلاتين . كان تينانت هو أول من فصل هذا العنصر ، وقد
اعطاه اسمه عام ١٨٠٣ ، وهو مأخوذ عن الكلمة الاغريقية التى تعنى
« رائحة » ، لأن أحد مركباته كبريه الرائحة ، كالكفور ، وهو أيضا سام
كهذا الغاز . والأوسميوم - كمعدن - صلب هش لونه رمادى قضى يكاد
يستحيل تشغيله ، ووزنه النوعى ٢٢ر٥٩ وعدده الذرى ٧٦ ووزنه الذرى
١٩٠ر٢ ، وينصهر على ٣٠٠٠ درجة مئوية ، ويغلى على ٥٢٠٠° م وهو
يستعمل كالايريديوم فى تقوية أطراف ريشة أقلام الحبر كما يستخدم فى
صبغ اللبيدات (الدهون) فى المواد الحيوية لدراستها تحت الميكروسكوب
الضوئى أو الالكترونى .

هذان المعدنان اذن كثيفان جدا ، ثقلان جدا ، نادران جدا على
سطح الأرض . ثمة مواقع أخرى بالنظام الشمسى يظهر فيها هذان المعدنان
بشكل أقل ندرة مما هما عليه على سطح كوكبنا ، وأن كانا أبدا غير
شائعين فى أى مكان بهذا النظام .

ان المادتين الأساسيتين فى بناء هذا الكون هما الأيدروجين - أخف
العناصر - والهليوم ، العنصر التالى له فى الوزن . أما للعناصر الأثقل
فتنشأ فقط تحت الظروف السائدة فى جوف النجوم ، حيث توفر الأفران
الحرارية النووية حرارة هائلة فهى - بالمعنى الحرفى - نواتج ثانوية
لتفاعلات الاندماج النووى ، إذ تندمج نوايا الأيدروجين لتكون الهيليوم،

ثم تندمج نوايا الأيدروجين والهليوم لتكون نوايا أثقل ، وتندمج هذه مرة أخرى لتكون نوايا العناصر الأثقل ، ويستمر هذا النشاط حتى يتكون الحديد وتنتهى العملية عند هذا الحد فى نجوم كالمشمس ، إذ لا يمكن أن تتشكل العناصر الأثقل من الحديد إلا فى أكثر الأفران النجمية حرارة، فتكوين الأيديدوم والأوسميوم يتطلب حرارة تفوق ما وصلته الحرارة خلال المرحلة العظمى من تاريخ حياة النجم النموذجى . هما إذن يتطلبان أنجما هائلة الوزن ، استنفذت كل ذخيرتها من الأيدروجين والهليوم وابتدأت تحرق عناصر « مستحيلة » كالكربون والنيون ، إذ هنا تبدأ تفاعلات الدمج ، وهذه تفاعلات بطبيعتها غير مستقرة . فإذا ما كانت كتلة النجم أعلى من حد معين ، انفجر النجم ليكون نمطا - من نمطين - من السوبرنوفات . فالإيديدوم والأوسميوم وكل العناصر الثقيلة جدا قد صنعت مع - أو أثناء - حدوث واقعة سوبرنوفات قصيرة مذهلة ساخنة للغاية .

وبعد أن ينفجر النجم بهذه الطريقة يتقلص مركزه ويدخل فى مرحلة الشيفوخة ليكون نجما نيوترونيا أو ثقبيا أسود (حسب كتلته) . أما المادة التى يطرحها عنه أثناء الانفجار فأنها لا تعود إليه وإنما تنتشر بسرعة فى الفضاء ، فى صورة سحابة من جسيمات متباينة الأحجام ، ساخنة . وسيوجد بالفضاء أيضا سحابات باردة من غبار وجسيمات . ومجرة برج السرطان تمثل واحدة من هذه السحابات . فإذا حدث وتفاعلت سحابة سوبرنوفات ساخنة مع سحابة باردة أكثف منها ، فإن موجات الاصطدام التى تنتج عن مثل هذا التفاعل ستسبب فى تكثف كلتا السحابتين لتكون نجما جديدا ، قد يكون له كواكب مكونة جزئيا من المادة الخام الناتجة عن انفجار السوبرنوفات .

يتركب نظامنا الشمسى جزئيا من مثل هذه السحابة المختلطة . فالكثير من ذرات الأرض قد نشأ فى هذه المحرقة النووية الأولية ، ولما كان لحمنا يضم نفس هذه الذرات ، فإن أجسامنا تتكون جزئيا من الغبار الذرى المتساقط !

وفى أثناء تكثف الشمس وكواكبها ، تقاربت بالجاذبية جسيمات السحابة حتى وصلت الى مرحلة توزعت فيها بانتظام العناصر التى تكون نظامنا الشمسى . ويتقدم التكثف صنفات هذه العناصر ، فتتحرك الخفيفة منها الى الكواكب الخارجية ، أما الكواكب الداخلية فقد سخنت بشدة، مما تسبب فى ضياع العناصر الخفيفة منها فى الفضاء ، وبقاء العناصر الأثقل، لتندمج حول مركز من المعادن الثقيلة المنصهرة . يتكون قلب

الأرض المركزى أساسا من الحديد والنيكل المنصهرين ، أما المعادن الثقيلة الأخرى ، ومنها الايريديوم والأوسميوم - وهى معادن لها ألفة بالحديد - فقد امتصت داخل مركز الأرض أثناء تكون كوكبنا هذا الصلب .

فإذا بدا هذا معقولا ، فسيستتبعه طبيعيا السؤال عن السبب فى بقاء بعض الايريديوم والأوسميوم على السطح . الحقيقة انه حيثما وجدنا على السطح معادن كالايريديوم أو الأوسميوم - أو قرب السطح فى الصخور التى كانت توجد يوما على السطح - فإننا نعتقد انها قد وصلت من الفضاء الخارجى . ولكن ، لماذا يبدو انها توجد فى مناطق أخرى من النظام الشمسى بمقادير أكبر منها على الأرض ؟ الواقع ان هذا ليس صحيحا . عندما تكثفت السحابة الأصلية ، فإنها لم تستخدم بأكملها نى تكوين ما أصبح الآن الشمس والكواكب ، وإنما بقى منها بعض الغبار ، يشكل الآن حزام الكويكبات . ويعتقد معظم علماء الفلك ان مد الجاذبية الذى سببته كتلة كوكب المشترى قد منع تكوين كوكب من هذا الغبار . ربما لم يكن هناك من المادة ما يكفى لتكوين كوكب ذى حجم معقول ، لكن الحطام الذى لم يتمكن من الاندماج فى صورة كوكب ما يزال الى الآن إما فى صورة غبار - بعضه موزع خلال النظام - أو فى صورة الكويكبات نفسها .

من المعتقد ان الكويكبات هى على الأغلب مصدر النيازك - وإن كان هناك من العلماء من يرفضون هذا ، ويمكن تقسيم النيازك الى صنفين أساسيين : النيازك المكونة أساسا من الصخور - أو النيازك « الحجرية » - وهذه تتألف من المادة الأولية التى صنع منها النظام الشمسى . ثم هناك النيازك المعدنية - أو النيازك « الحديدية » - وهذه قد تكون قد سحقت بقوة فى مرحلة من تاريخها ، أو قد تمثل قلب أجرام كانت يوما أكبر حجما بكثير ثم فقدت قشرتها الحجرية الخارجية ، ربما بسبب اصطدامها بنيازك أخرى . وتحتوى هذه النيازك الحديدية عادة على معادن نبيلة بتركيزات أكبر بكثير مما يوجد فى النيازك الحجرية أو فى الصخور على سطح الأرض .

إذا ما كانت العناصر موزعة بالتساوى على السحابة الأصلية كلها ، فإننا نتوقع أن يوجد كل عنصر بنفس القدر فى أى موقع بالسحابة ، على الأقل فى العمق الداخلى للنظام الشمسى . ولما كانت العناصر الثقيلة ستعجز فى لب الكواكب ، فستغدو صخور القشرة وقد استنزفت من هذه العناصر . ومثل هذا الاستنزاف لن يحدث فى الجزء من مادة السحابة

الذى لم يكون نجما أو كوكبا ، اما لانه بلا لب ، واما لانه مجرد لب ، وعلى هذا فان تركيب المادة التى تصل الى الأرض من الفضاء يشبه على الأغلب تركيب السحابة الأصلية ، فإذا ما سقطت على سطح الأرض فستزوده بالعناصر النادرة التى حبيست داخل لب الكوكب . تلزنا هذه المعلومات الأساسية لتفهم أهمية الدليل الذى عثر عليه العلماء فى جوبيتر .

قاده فريق المخبرين فى جوبيتر والتر الفارس أستاذ علم الجيولوجيا - جامعة كاليفورنيا بيركلي ، وضم الفريق والده لويس و . الفارس من معمل لورنس للاشعاع ببركلي بجانب اثنين من الكيماويين النرويجيين من نفس المعمل هما فرانك أسارو وهيلين ف . ميشيل . ولقد حصل لويس الفارس على جائزة نوبل للفيزياء عام ١٩٦٨ عن أبحاثه فى الجسيمات الأولية التى شملت اكتشاف طبقات الرنين . كان الفريق - ببساطة - فريقا مؤهلا تماما .

ساعدهم استخدام تقنية تحليلية جديدة جدا ، هى التحليل بالتنشيط لكن طريقة عمل هذه التقنية لا تهم قصتنا بقدر ما يهمنا أنها مكنتهم من اجراء قياسات دقيقة جدا لتركيزات العناصر الموجودة بمقادير ضئيلة للغاية . وهذه المشكلة قد لا تظهر من أول وهلة ، بسبب ما يعنيه الجيوكيماويون عندما يتحدثون عن « ندرة » عنصر ما .

فالجرانيت العادى ، على سبيل المثال يحتوى فى كل مليون جزء على ٠.٠٠١ جزء من الأوسميوم و ٠.٠٠٦ جزء من الايريديوم ، ومعنى ذلك أننا نحتاج كى نجمع جراما واحدا من الأوسميوم أن نعالج عشرة آلاف طن من الصخور ، ونحتاج ستة آلاف طن من الصخر لاستخلاص جرام من الايريديوم . صحيح أن الجرانيت ليس من بين الصخور الأفضل ، الا أن تركيز هذين العنصرين فى قشرة الأرض يبلغ نحو ٠.٠٠٥ جزء فى المليون للأوسميوم و ٠.٠٠١ جزء فى المليون للايريديوم . وعلى هذا فان القياس الدقيق لتركيز مثل هذين العنصرين كان صعبا للغاية وغير حاسم قبل أن تكتشف تقنية التحليل بالتنشيط . من ناحية أخرى سنجد أن تركيز هذين العنصرين فى النظام الشمسى ككل يبلغ عشرة آلاف ضعف التركيز على سطح الأرض . وحيثما أمكن تحليل عينات من المادة الخام الأصلية للنظام الشمسى - من الغبار أو النيازك مثلا - ظهر أن تركيز هذين العنصرين أكبر بمراحل من تركيزهما على سطح الأرض . ابتداء فريق جوبيتر التحليل بعنصر الايريديوم لأنه أسهل فى التحديد والقياس مقارنة بمعظم العناصر الأخرى بالمجموعة البلاتينية .

أخذت العينات الأولى من صلصال جوبيو ، وأرسلت الى معمل لورنس للاشعاع فى بيركلى لاجراء التحليل . ولقد بين التحليل ان هذا الصلصال يحتوى من الايريديوم على ٢٠ ضعف ما هو موجود بالطبقات الموجودة مباشرة تحت أو فوق مستوى الخمسة وستين مليون عاما .

وهنا ثار السؤال : هل هذه الزيادة مجرد واقعة محلية بحتة ؟ أم يا ترى سنجد نفس الزيادة على نفس هذا المستوى فى مواقع أخرى ؟ تطلب الأمر أخذ عينات من صلصال تخوم العصر الطباشيرى من مواقع أخرى ، فتوجه العلماء فى أول الأمر الى موقع يبعد ٥٠ كيلو مترا جنوبى كوينهاجن ، ثم الى الجزيرة الشمالية فى نيوزيلنده على الناحية الأخرى من العالم .

أخذت العينات الدانيمركية من موقع قرب كنيسة هويروب فى سنيفنكلينت حيث يوجد « الصلصال السمكى » المعروف (وقد سمي هكذا لكثرة بقايا الأسماك المتحجرة فيه) الذى نشأ على أغلب الظن فى حوض مغلق يحوى ماء راكدا - ولقد توصلنا الى الظروف التى تكون فيها هذا الصلصال من تركيبه الكيماوى . كان لصلصال التخوم فى المواقع الأخرى تركيب مشابه ، وغدا من الصعب تفهم كيف يكون له نفس التركيب وقد تكون تحت المحيط العميق . وأوضح تحليل الصلصال السمكى وجود الايريديوم بتركيزات بلغت نحو ١٦٠ ضعف متوسط تركيزها فى قشرة الأرض . ثم جاءت عينات نيوزيلنده ، وكانت قد جمعت من موقع قرب خليج وودسايد ، نحو ٤٠ كيلو مترا شمال شرقى ويلنجتون . ولقد اتضح أنها تحوى من الايريديوم على عشرين ضعف الموجود بالصخور فوقها والصخور تحتها . ورغم أن عينات الدانيمرك ونيوزيلنده كانت تختلف عن عينات جوبيو ، الا أنها عززت حقيقة أن ارتفاع تركيز الايريديوم لم يكن ظاهرة خاصة بصلصال ايطاليا . ان الصلصال فى الطبقة التى يبلغ عمرها ٦٥ مليون سنة يحوى كميات أكبر غير عادية من الايريديوم مقارنة بالمناطق الأخرى من العالم .

بعد أن حددت التحاليل الكيماوية تركيزات الايريديوم فى صلصال مناطق حدود العصر الطباشيرى ، ابتدأوا فى فحص تركيزات عناصر أخرى : ٢٧ عنصرا فى العينات الايطالية و ٣٣ عنصرا فى العينات النيوزيلندية . واتضح أنها ليست غنية بشكل واضح بالايريديوم وحده، انما هى غنية أيضا بمعظم المعادن الأخرى . بدت كيمياء منحرفة تلك الخاصة بهذا الصلصال - المأخوذ من مواقع متباعدة جدا .

نشر والتر الفارس نتائجه مختصرة سنة ١٩٧٩ ، ثم أعاد نشرها سنة ١٩٨٠ في مجلة « ساينس » الأمريكية . ومباشرة أثار في المجتمع العلمي زوينة من الاهتمام تحدث دائما عقب ظهور كل فكرة جديدة معقولة مثيرة . ابتدا العلماء يحققون نتائج الفارس ، وإذا بكل نتائجهم تقدم دعما اضافيا من التحليلات ، التي تمت في مواقع جديدة عديدة .

وطدت اذن تماما حقيقة وجود طبقة من هذا الصلصال الغنى تحد التخوم ما بين العصر الطباشيري والحقب الثالث . لقد أمكن تمييزها فعلا في زومانيا بشمال اسبانيا ، وفي منطقة الكف بشمال تونس ، وفي مواقع بحرية عديدة أمكن فيها الحصول على لب من المادة بالأعماق تحت قاع المحيط الهادئ ، وذلك عن طريق فريق من الباحثين على ظهر باخرة البحوث الأمريكية « جلومر تشالنجر » أثناء تنفيذ المشروع الدولي للحفر بأعماق المحيط (القائمة ٦٢ ، الحفرة ١٤٦٥ ، كما عثر باحثون أخرى على نتائج مشابهة بالمحيط الهادئ) ، ثم أيضا - وبفواصل واسعة للغاية - في كارافاكا بجنوب اسبانيا . كان أخطر البراهين يكمن في حقيقة إمكان رؤية التخوم بوضوح بالغ في مناطق كثيرة جدا . وسنعود لهذا فيما بعد بالفصل السادس .

قام ر . جاناباثي - من معمل بصوث شركة بيكر للكيماويات في فيليبسبيرج ، نيويورك - قام بزيارة لمنطقة الصلصال السمكي بالاندلس وأخذ عينتين ، وحلل محتوياتهما من المعادن النبيلة ، وقارن أرقامه بتلك التي نتجت عن تحليل صلصال قاع البحر ، والبازلت المأخوذ من نهر كولومبيا . وأوضحت نتائجه التي نشرها في مجلة « ساينس » (في أغسطس ١٩٨٠) أن « كل هذه العناصر موجودة في صلصال التخوم بتركيزات أعلى كثيرا من تلك الموجودة عادة في المواد الأرضية كالبازلت الأرضي - وفي البازلت البحري وصلصال المحيطات » . والحق أنه وجد أن تركيز « الايريديوم يبلغ ٦٩ جزءا لكل بليون جزء من المواد الأخرى ، كما أن الايريديوم والأوسميوم والبلاديوم كانت لها جميعا تركيزات تفوق ثلاثة أضعاف تركيزها العادي » .

رجع ج . سميث (من أمستردام) و ج . هيرتوجن (من لوفان ببلجيكا) رجعا الى صلصال كارافاكا ليفحصا التفاصيل الدقيقة لتركيبه الكيماوي . أخذوا مائة عينة وفحصا عددا من العناصر بلغ سبعة وعشرين . كانت العينات مأخوذة من على مستويات مختلفة ، وبذا تمكنا من ربط نتائجهما في صورة تسلسل في الصلصال نفسه . وكان ما اكتشفاه هو أن كل هذه العناصر توجد - في معظم سمك الطبقة التي فحصها -

بالمركيزات التى يمكن توقعها ، كانت موجودة بالمركيزات الأرضية النموذجية الطبيعية . ثم ، وفى السنتيمترات الأخيرة - وجدا ان كمية الايريديوم تبلغ ٤٥٠ ضعفا لم توسطها فى قشرة الأرض ، وكان تركيز الأوسميوم ٢٥٠ ضعفا ، والزرنينخ ١١٠ ضعفا . وكان تركيز الكروم تسعة اضعاف التركيز العادى ، وتركيز الكوبالت ٣٠ ضعفا ، والنيكل ٤٤ ضعفا ، والسيلينيوم ٤٠ ضعفا والقصدير ٢٠ ضعفا . ثم ذكرنا ان هذه الطبقة بالتحديد كانت تتميز بانخفاض كبير فى عدد الأحافير . ولقد نشر سميث وهيرتوجن نتائجهما فى مجلة « نيتشر » البريطانية .

وفى عام ١٩٨٠ نشرت بمجلة « نيتشر » نتائج مماثلة لبحث قام به فرانك ت . كايت ، زيمنج زو ، وجون ت . واسون - وهم جميعا من معهد الجيوفيزيكا وفيزيكا الكواكب التابع لجامعة كاليفورنيا بـلوس انجيلوس . وتماثل سميث وهيرتوجين كانت أبحاث الفارس القديمة قد أثارتهم ودفعتهم الى فحص الصلصال بأنفسهم - ولقد استخدموا صلصالا من موقعين : أخذوا ٢٣ عينة من الدانيمرك ، مستخدمين مرة أخرى الصلصال السمكى من ستيفنز كلينت ، وثلاث عينات من أعماق المحيط الهادى - من الحفرة ١٤٦٥ ، بمركز المحيط ، تقريبا فى منتصف المسافة ما بين يوكوهاما وسان فرانسيسكو .

ومرة أخرى اذا بنتائجهم تعضد نتائج المواقع الأخرى . وبالرغم من ان عينات لب أعماق المحيط كانت تحوى من الايريديوم نسبة أقل من مثلتها فى العينات الأرضية ، الا أن هذا التركيز تزايد بشكل مفاجئ حاد ، من أقل من ٠.٧ جزء فى البليون فى أحد المستويات ، الى ١٢.٩ جزء فى مستوى آخر ، ثم الى ١٥.٦ جزء فى مستوى ثالث .

يمكننا الآن أن نقارن تركيزات الايريديوم والأوسميوم (كاجزاء فى البليون) فى الصخور الطباشيرية الطبيعية العليا ، وفى صلصال ستيفنز كلينت (فريق كايت) وفى صلصال كارافاكا (فريق سميث وهيرتوجين) :

الطباشيرية الحديثة	ستيفنز كلينت	كارافاكا
ايريديوم ٠.١٣	٣٥.٧	٢٥.٥
أوسميوم ٠.٠٨	٤٣.٨	١٦.١

ولقد أعطت تركيزات الكثير من العناصر الأخرى نفس هذه الصورة .

يشير الجدول السابق فورا الى أن الصلصال الدانيمركى يصوى من الايريديوم أكثر مما يحويه الموقعان الآخران ، وفى هذا شذوذ يبدو أنه يحتاج الى تفسير ، اليس كذلك ؟ فلنصور أولا غبارا يتساقط على سطح ماء ساكن ، هنا سيندفع الغبار خلال الماء الى أسفل ليشكل نسبة معينة من رواسب القاع . تصور الآن وضعنا يتساقط فيه الغبار على سطح ماء مفتوح به تيارات . هنا ستتحرك الرواسب بما تحمله من غبار من مكان الى آخر ، فيصبح تركيز الغبار فى منطقة أكبر منه فى منطقة أخرى . هل يمكننا بهذا أن نفسر الشذوذ الواضح بين تركيز المعادن فى الصلصال السمكى بالدانيمرك وتركيزها فى المناطق الأخرى ؟ سنعود الى فحص هذه المشكلة بتفاصيل أوسع فى فصل تال .

ابتدا فريق الفارس بحثه الأصلي لاختبار ما اذا كان الصلصال الذى يحد التخوم بين العصر الطباشيرى والعصر الثالث ، يمكن أن يميز كيميائيا . ومضى هذا الفريق ومن لف لفة كى يكتشفوا ليس فقط صحة هذا ، وانما ايضا أنه من الممكن أن تحدد هذه التخوم بوضوح فى أماكن كثيرة من العالم فى نصفى الكرة الأرضية . وهذا شيء غير طبيعى . ذلك أن الأرض لا تبدأ أبدا . طبقات الصخور تتشوه باستمرار ، وتلتوى وتسخن ، وتبرد ، كما تتبدد مكونات معظم الطبقات فى المواد المحيطة . والمواد الرسوبية - أثناء رسوبها الى قاع البحر - قد يحرکها ويخلطها عدد من الميكانيزمات لمتنزعج بالرسوبيات من تحتها ، وتتداخل الطبقات مع بعضها البعض بدلا من أن تظل منفصلة مميزة ، وهى تظل منفصلة مميزة اذا ما توقف الترسيب فترة تنضغط فيها المادة ، قبل أن يبتدىء الترسيب مرة ثانية ، فيستحيل أن يختلط ما أصبح الآن صخرا لينا بما يجد من رواسب . لكن تركيز المعادن النبيلة فى صلصال التخوم محدد بدقة بالغة . فهذه المعادن تتركز فى شريط يمكن تحديد سمكه ، يكون لتركيب المواد فوقه أو تحته بسنتيمتر واحد ، متوسط نسبة هذه العناصر فى قشرة الأرض ، بينما يزداد تركيز هذه العناصر بشكل واضح تماما داخل الشريط . أنك لا تستطيع أن ترى الخط الكيماوى فى هذا الصلصال الرمادى بعينك المجردة ، لكنه - رغم ذلك - موجود .

هناك عمليات طبيعية أرضية تتسبب فى تركيز عناصر معينة . ثمة عملية معروفة - جيولوجية جزئيا - ربما كانت المصدر الرئيسى لكثير من الركاز المعدنى . إذ تتحرك المركبات المعدنية الذائبة خلال الماء الأرضى حتى تصل الى قاع مستنقعات الماء الراكد . تتكون الرواسب تحت هذا الماء من طين تتحلل فيه البقايا العضوية تحليللا ميكروبيولوجيا لا هوائيا - تنتج عنه غازات كالميثان وكبريتيد الأيدروجين . وتعمل هذه الغازات على

الطين لتفصل المركبات المعدنية غير الذائبة ، فتترسب وتتركز في الرواسب لتتحول في نهاية الأمر الى ركاز .

وهناك عمليات بيولوجية بالكامل ، تستخلص فيها الكائنات الدقيقة غذاءها من مادة تحتوي على مركبات معدنية ، فتركز المعادن بهذه الطريقة . كما يجوز أن يكون الركاز المعدني أكثر صلابة من الصخر المحيط به ، فإذا ما وجد مثل هذا الصخر على سطح الأرض ، فقد تبدده عمليات التجوية تاركة الركاز خلفها ، وعندئذ فمن الجائز جداً أن نجد في عينات صخر السطح نسبة عالية من معدن نادر الوجود على السطح ركزت بهذه العملية الطبيعية . وليس هذا أمراً ممكناً فحسب ، فلقد حدث بالفعل ، فالمعروف أن المعادن الثقيلة قد ركزت بهذه الطريقة . ولقد وجه جاناباثي الاهتمام الى المناجم الكندية حيث يستخرج الروثينيوم والاوسميوم والايريديوم والبالاديوم والذهب من ركاز أصله أرضي تماماً (وجاناباثي هو من قام بتحليل الصلصال الكندي وصلصال نهر كولومبيا) وهذه المعادن توجد أحياناً في ركاز نحاسي نيكلي ، وفي ركاز من كبريتات المولبدينيوم ، إذ يسمح تشكيلها الذري بأن تستقر في الشبكة البلورية للصخر . وحيثما يحدث هذا يكون التركيز العالي محلياً فقط ، وهكذا بالطبع تكون أيضاً نتيجة العمليات الحيوية .

من المستبعد أن تكون زيادة تركيز هذه العناصر في صلصال التخوم مجرد ظاهرة محلية ، فلو كان الأمر كذلك ، لكان توافقا أكثر من اللازم، إذ علينا أن نقول أن نفس العملية المحلية الأرضية للتركيز قد جرت في نفس الوقت تقريباً في كل هذه المواقع المختلفة . أضف الى ذلك أن تركيز المعادن النادرة عن طريق عمليات أرضية لا بيولوجية إنما يكون إذا ما وجدت داخل الشبكات البلورية لصخور بعينها لها تركيب كيميائي معين ، ومعنى هذا أن المعادن النادرة لابد أن تصطبغ عناصر أخرى ، ومن الممكن أن ننتج بهذه العناصر وكذا بالنسب التي ستوجد بها . ولقد كانت هذه النسب في صلصال التخوم خاطئة تماماً .

علينا إذن أن نقرر أن التركيز العالي للايريديوم في طبقة التخوم لا يرجع الى العمليات الأرضية التي نعرفها . اقترح فريق الفارس أن الايريديوم لابد وأن قد وصل من الفضاء لأن درجة انتشاره بالعالم يقول بأنه من المستبعد جداً أن يأتي بسبب عملية التركيز المحلي . ولقد أشار الفريق الى وصول جسم من الفضاء مرة كل مائة مليون سنة يمكنه أن يوفر الكمية المطلوبة من المعادن النادرة (نقصد من مكان ما خارج الغلاف الجوي للأرض) . ولقد اتخذ سميت وهيرتوجين وجهة نظر

مماثلة ، يعضدان بها المصدر الفضائي ، لأن المصادر الأرضية تبدو غير كافية لتفسير التركيزات العالية من الايريديوم والاسميوم . أما جاناباشي فقد شدته نسب العناصر التي وجدها في الصلصال الذي فحصه ، ووجد بها السبب الوجيه للفرص بأنها تصوى مادة غير أرضية . أما فريق كايت فقد كان أكثر حذرا ، لكنه تبني في النهاية فكرة المصدر اللا أرضي .

إذا كانت هذه المعادن قد وصلت حقا من الفضاء ، ففي أى شكل وصلت ؟ ثمة احتمالات أربعة : سحابة غبار ، أو سحابة من المادة ناتجة عن انفجار سوبرنوبا ، أو مذنب ، أو نيزك . من المهم أن نتحدد ما إذا كانت المادة قد وصلت في صورة ناعمة مشتتة فسقطت كما يسقط الغبار ، أم وصلت في صورة كتلة - أو كتل - كبيرة .

رأى جاناباشي أنه يستطيع بالأسميوم أن يختبر أصل السوبرنوبا . فالأسميوم يوجد في شكلين من النظائر يهمانا في هذه القصة : أسميوم ١٨٤ والأسميوم ١٩٠ (توجد ذرات الكثير من العناصر في أشكال عدة ، لكل منها وزن مختلف ، ولأن الخصائص الكيميائية لهذه الذرات متشابهة جدا ، فهي تعتبر عنصرا واحدا ، وإن كانت تختلف اختلافا طفيفا . وكل نوع من أنواع العنصر يسمى « نظيرا » ، وتتخذ نظائره أى عنصر توزيعا ثابتا . فالحقصدير على سبيل المثال له عشرة نظائر : دائما نفس النظائر العشرة ودائما بنفس النسب) . يقول جاناباشي أن النسبة بين نظيري الأسميوم ثابتة في العينات الأرضية وفي عينات النيازك . ولكنه يقول أن هذه النسبة قد تختلف في السوبرنوفات المختلفة - تذكر أن كل الأسميوم يصنع في السوبرنوفات . وفي رأيه أننا سنجد نسبة واحدة في النظام الشمسي لأن المادة التي يتركب منها هذا النظام قد نشأت عن سوبرنوبا واحدة . ثم يعضى ليقول أنه إذا كان الأسميوم بالصلصال الذي فحصه قد أتى عن سوبرنوبا أخرى ، فسيكون من قبيل التوافق العجيب أن تتكرر فيه نفس النسبة التي حدثت في الانفجار الأقدم . قام جاناباشي بقياس نظيري الأسميوم في صلصال الدانيمرك و صلصال نهر كولومبيا ووجد أن النظيرين موجودان بالنسبة النموذجية لاسميوم الأرض والنيازك . من هنا يمكننا أن نرفض فكرة اختلاف السوبرنوبا ، وبالتالي نرفض وجود مصدر من خارج النظام الشمسي . استقبط جاناباشي إذن أن هذه المادة قد أتت من مكان ما داخل النظام الشمسي .

علينا أن نؤكد الآن أن وجهة النظر هذه بالنسبة لسبب توزيع النظائر هي فكرة الدكتور جاناباشي . قد يكون على حق ، لكن ثمة وجهة نظر أخرى معقولة سنعرضها فيما بعد .

من الممكن أن تحتوي السحابة من غبار ما بين النجوم على الكميات المطلوبة من الايريديوم والأوسميوم - كما قد يحدث مرة في كل مائة مليون سنة أن يتعرض النظام الشمسي الى مثل هذه السحابة أثناء مروره خلال احد أذرع المجرة . أما كمية المادة التي تدخل الغلاف الجوي للأرض وتسقط على سطحها فستتوقف على كثافة السحابة ، وعلى سرعتها ، وعلى طول الفترة التي استغرقتها الأرض للمرور خلالها - وهذا بدوره يتوقف على حجم السحابة كما يتوقف على اتجاه حركتها بالنسبة لمدار الأرض . قدر كايث وزملاؤه حجم السحابة اللازم لتوفير ما يعتقد بوجوده من المادة ، واتضح أن الأمر يتطلب سحابة كثافتها ١٠٠٠٠٠ ذرة هيدروجين بالسنتيمتر المكعب (هذا لا يعنى بالطبع أن السحابة مكونة بالكامل من الهيدروجين ، ولكن هذه هي الطريقة الملائمة لقياس الكثافة) ، وقطرها يبلغ نحو ٨٦٠٠٠٠ بليون كيلو مترا (أى ٥٧٠٠٠٠٠ وحدة فلكية أو ٢٨ فرسحا نجميا) ، وهذا يعادل عشرة أضعاف أكبر وأكثف السحابات الموجودة جوارنا بالمجرة . بل لد وجد كايث - بالنظر الى أن الايريديوم مركز في مثل هذا الشريط الضيق من صلصال كارافاكا - أن الأمر يتطلب اما أن يأتي هذا المعدن عن جزء من السحابة أكثف عشر مرات من الرقم السابق ، أو أن يكون معدل الترسيب في البحر في ذلك الوقت أقل من أدنى معدل للترسيب نلحظه اليوم ، هذا والا توزع الايريديوم في قدر أكبر من الرواسب وأصبح الشريط أسمك مما هو عليه . وعلى ذلك ، فثمة صعوبات كثيرة تواجه الافتراض بأن الايريديوم والأوسميوم قد وصلا هنا من « سحابة - بين - نجمية » .

بقى لدينا المذنب والنيازك . يقف في صف فكرة المذنب العالم كينيث ج . هسو ، من المعهد الجيولوجي السويسري بزيوريخ (مجلة نيتشر سنة ١٩٨٠) . الواقعة في هذه الحالة ستشبه الانفجار الذي حدث في حوض طنجسكا بسبيرييا في ٣٠ يونيو سنة ١٩٠٨ . ربما كان سبب ذلك الانفجار مذنباً صغيراً انفجر وتبعثر في الهواء ، وبدلاً من أن تنتج عنه حفرة كبيرة واحدة ، فقد نتج عدد من الحفر الصغيرة (قطرها من ٥٠ - ٢٠٠ بوصة) . اقترح هسو أن المذنب الذي اخترق الغلاف الجوي منذ ٦٥ مليون سنة كان في حجم مذنب هالي ، وكانت كتلته نحو ألف بليون طن . وهو يقول انه دخل بطاقة سخنت الغلاف الجوي ليسقط في البحر فيسخره هو الآخر . اننا لا نعرف الكثير عن التركيب الكيماوي للمذنبات ، لكن هسو قد اقترح أثراً كيماوياً وأثراً فيزيقياً . فمن الجائز أن يقوم المذنب بإضافة كميات كبيرة من السيانيدات (اكتشف وجود الهيدروجين وميثايل سيانيد في ذيل المذنب كوهوتيك) يمكنها أن تسمم الكثير من الكائنات النجمية . غير أنه من المشكوك فيه حقاً - كما أشار كايث

فيما بعد - أن تصمد السيانيدات بحالتها خلال مرورها في الغلاف الجوي،
 إذ المفروض أن تتأكسد وتصبح غير سامة تحت درجات الحرارة العالية
 التي لا شك وقد ولدها المذنب . وهي أن سقطت على البحر تحللت بسرعة،
 ولم تكن لتنتشر بعيدا عن أماكن سقوطها . كما أن الحقيقة هي أن مركبات
 السيانيد ليست سامة للدرجة التي تفترض عادة ، وبالرغم من الحكايا
 التي يبتكرها مؤلفو القصص البوليسية ، فإذا قارناها مثلا بالكثير من
 الكيماويات الزراعية المعروفة ، فسنجد أننا نحتاج الى جرعات كبيرة
 حقا لكي نقضى على معظم الكائنات الحية . وعلى هذا يصبح من المشكوك
 فيه أن تكون السيانيدات قد وجدت بالتركيزات العالية اللازمة ، وعلى
 طول الفترة الزمنية الكافية لتسبب اذى خطيرا .

وأخيرا علينا أن نتأمل احتمال سقوط نيزك . يلزم النيزك كي يزد
 الأرض بالقدر اللازم من مادة التخوم أن يكون قطره ١٠ - ١١ كيلومترا
 وأن يزن ٢٥٠٠ بليون طن . ربما لا نستطيع أن نستبعد كل الاحتمالات
 الثلاثة الأخرى ، ولكن يبدو أن أصبح الاتهام تنجه على الأرجح الى النيزك .
 وسنناقش هذا بالتفصيل في الفصل الخامس .

ظهرت فيما بعد براهين اضافية تبين انه إما كانت الواقعة التي خلفت
 هذه العناصر فانها لابد وان كانت حادثة عنيفة ولدت قدرا هائلا من
 الحرارة . عاد سميث وزميل له آخر هو ج . كليفر (من نفس معهد
 الجيولوجيا بامستردام) مرة أخرى الى صلصال كارافاكا باسبانيا .
 وفي الطبقة السفلى من هذا الصلصال وجدا الكثير من كريات صغيرة
 جدا من مادة زجاجية تشبه التكتيكات التي تنتج عن انصهار الصخور .
 ومثل هذه الكريات توجد أحيانا قرب البراكين ، لكن التحليل الكيماوي
 لهذه الكريات قد بين أن تركيبها لا يشير الى أصل بركاني . اقترحا إذن
 (في مجلة نيتشر سنة ١٩٨١) أن هذه الكريات قد تكونت بسبب جسم
 اصطدم بالأرض ، جسم قد يكون نيزكا ، وقد يكون مذنبا ، والاحتمال
 الأخير أقل ترجيحا .

كان غرض البحث الأصلي للفارس في جوبيو هو أن يكتشف
 « توقيعا » كيماويا يمكن به تمييز صلصال التخوم بشكل سهل يعول عليه .
 كان امه أن يجد طريقة ملائمة لتحديد موضع التخوم في طبقات الصخر ،
 ثم وفي نفس الوقت تحديد عمر طبقات الصخور في جوار هذه التخوم بشكل
 أكثر دقة . أما أن يكون التوقيع الكيماوي في جوبيو ناتجا عن واقعة من
 خارج الأرض فقد كان امرا مثيرا وإن لم تكن له علاقة بالفرض الأصلي .
 ولم نعرف الا فيما بعد بأن التخوم قد نتجت عن واقعة رميئة هائلة الحجم،

لتدفع العلماء الى الاعتقاد بأن الواقعة لم تكن فقط متزامنة مع الانقراض
الذى حدث ما بين العصر الطباشيرى والعصر الثالث ، وانما كانت هى
ذاتها السبب فى الانقراض .

ان حقيقة وصول مقادير كبيرة من الايريديوم والأوسميوم عن مصدر
من خارج الأرض فى نفس الوقت الذى انقرض فيه الكثير من النباتات
والحيوان ، قد لا تكون بالطبع أكثر من مجرد توافق . وان الأدلة حتى
الآن أدلة استنتاجية . لكن ، هكذا الأمر أيضا مع مسدس يخرج من
فوهته الدخان .

كان قرار هيئة المحكمين العلمية ، المنعقدة فى أواخر عام ١٩٨٠ ،
هو ان هذه الأنواع قد انقرضت فجأة ، تحت ظروف توحى بفاعل من خارج
الأرض .

الفصل الثالث

فجأة ، أم بالتدريج ؟

يقولون ان لكل قضية جانبين ، لكن الواقع ان هذا صحيح فقط بالنسبة للقضايا التي تتألف من مقترح واحد ومقترح مضاد . سيكون هناك من يهاجم وسيكون هناك من يدافع ، مدع ومدعى عليه ، ثم هناك المحاكمة القضائية . لكن قضيتنا لم تصل بعد الى مثل هذه المرحلة البسيطة . ثمة بدائل متعددة ، كل يتطلب الفحص .

توصل المحكمون الى قرارهم ، لكن التحقيق لا يد وأن يستمر ، فريما كانت الأنواع قد انقرضت - فى طبقة العصر الطباشيرى العليا - بمقتضى ظروف طبيعية . فالأنواع تنقرض على أية حال . كيف نتأكد من أن زوالها كان تدريجيا ؟

ثمة آليتان محتملتان يمكن بهما أن ينقرض النوع بالتدريج : الأولى هى المنافسة مع أنواع موجودة فعلا لكنها أفضل فى التأقلم مع الظروف البيئية ، والثانية هى التغير داخل البيئة - تغير كبير فى المناخ أو تغير كيمائى أو ميكروبيولوجى - والآليتان ليستا متنافيتين ، فقد تعملان سويا - لتصبح الصورة أكثر تعقيدا .

من الخطأ أن نفترض أن التطور لا يعمل الا عن طريق اقلية الأنواع للظروف البيئية السائدة فعلا ، والتي لا سيطرة للأنواع عليها ، وأن التغير البيئى لا ينتج الا عن قوى فيزيقية وكيمائية تعمل مستقلة عن الكائنات الحية . هذه العوامل تعمل بالطبع ، لكن البيئة بالنسبة لى كائن حتى تشمل الكائنات الحية الأخرى ، التي يحور كل منها من بيئته المباشرة لدرجة تزيد أو تنقص . أصبح من الشائع أن نصف سلوك الانسان فى عصرنا هذا بأنه سلوك منحرف ، لأنه يغير وجه الأرض ، ولأنه يسبب تغيرات ضخمة فى النظام البيئى « الطبيعى » ، ولأنه يقلق فيزيقا وكيمياء

كوكبنا • نستطيع حقا أن نعتبر أن سلوكنا غير طبيعي ، ولكن ذلك انما يرجع الى المدى الذى يعمل فيه • تصور عالما تعداد حيوان القندس فيه - مثلا - هو نفس تعداد البشر الآن • أن ذلك بالتأكيد سيغير وجه هذا العالم بشكل هائل • ومثل القنادس كل الأنواع تقريبا • فالأفيال تسقط الأشجار اذا لم تتمكن بخراطيمها من أن تصل الى الأوراق العليا الصالحة لغذائها ، انها تستطيع أن تزيل غابات بهذه الطريقة ، بل ان أراضى المراعى قد نشأت بسبب ذلك • وكلاب البرارى تزيل الشجيرات حول مدخل أحبارها لتحرم المفترسات من الغطاء وتشجع - عرضيا - نمو النباتات المفضلة لغذائها •

ليست هذه سوى بعض من الأمثلة المثيرة للتحويل فى البيئة ، ولكن ، لما كان نمو نبات ما يعوق نمو نبات آخر فى نفس الموقع - وهو ما يعنى « النجاح » بالجنى الايكولوجى - ولما كان الحيوان لا يستطيع أن يتغذى الا باحداث تغيير ولو طفيف فى البيئة من حوله ، فان القائمة النهائية للأنواع التى تغير البيئة لابد وأن تكون هى نفس قائمة الأنواع بأكملها • وعلى هذا فان التأقلم للبيئة انما يعنى تغيير الظروف التى أقامت الكائنات الحية السابقة كما يعنى التأقلم للقوى الطبيعية غير الحية • ثمة أسباب وجيهة للفرض بأن وجه هذا الكوكب كله - من أعماق المحيطات حتى السماء الأعلى للغلاف الجوى - قد حورته الحياة نفسها لمدى واسع يسمح لنا أن نعتبر المحيط الحيوى كله نتاجا من صنع الحياة ، من صنع الكائنات الحية الدقيقة أساسا ، ومعها - لحد محدود - النباتات والحيوانات عديدة الخلايا •

من الممكن أن يتسبب النشاط البيولوجى فى تغيير المناخ ، ويكاد يكون من المؤكد أن هذا كان صحيحا فى الماضى • وهذا التغيير - ببيولوجيا كان أو غير بيولوجى - يمكن أن يؤدى الى ظروف تزدهر فيها أنواع معينة • ومن الجائز أيضا أن تكون التغيرات بين الأنواع نفسها - ربما فى عشائر كائنات دقيقة لم تترك خلفها سجلا حفريا ولا نستطيع أن نعرف عن أنشطتها الكثير ، وما نعرفه عن أنشطتها كله لا يمكن أن يأتى عن ملاحظات مباشرة - أن تكون هذه التغيرات قد خلقت ظروفًا جديدة تحملتها بعض الأنواع الأكبر ولم تحملها البعض الآخر •

ثمة تضخيد فى حالة طبقة العصر الطباشيرى العليا ، هو أن التفسيرات المحتملة للانقراض التى تستبعد غيرها بالضرورة عسدها محدود ، فقد ثبت فى النهاية أنه بالرغم مما قد يكون من ضخامة الأثر لواحد من الأسباب ، فان عددا غيره قد يعمل فى نفس الوقت ليوصلنا الى نفس الاستنتاج ، وبذا لا نستطيع أبدا أن نصل الى حل واضح •

دعنا نفحص أولا احتمال أن يكون انقراض أنواع الطبقة الطباشيرية العليا قد حدث بسبب التنافس مع أنواع أخرى . قيل على سبيل المثال أن الدينوصورات قد تطورت الى أحجام هائلة جدا ، وأنها كانت صعبة المأخذ ، بطيئة ، غبية ، غير مؤهلة لمواجهة أى تحد لا يمكنها معالجته بقوتها الباطشة . وأنه لو نشأت مجموعة جديدة من الحيوانات وكانت أقل تخصصا ، فلربما لم تجد صعوبة فى استغلال البيئة بشكل أكفأ من الدينوصورات ، وبالتالي على حسابها . فهل كان ثمة مجاميع من الحيوانات ؟ نعم ، كانت هناك مجموعتان : الطيور والثدييات . فإذا افترضنا أن الزواحف الكبيرة والطيور والثدييات كانت تتنافس سويا ، فلربما كان من المفيد أن نفحص القوة النسبية لكل من هذه الحيوانات خلال الجزء الأخير من العصر الطباشيرى .

يعتبر العصر الطباشيرى واحدا من أطول العصور فى التاريخ الجيولوجى للأرض ، لكن من الواجب أن نعامل هذه الجملة بحرص ، لأن أحداث الزمن الجيولوجى ليست سوى ابتكارات من صنع الحفريين والجيولوجيين . هى فى حد ذاتها ملائمة لنا ، لكنها اعتباطية لحد ما . والعصر الطباشيرى (وقد أعطاه اسمه الجيولوجى البلجيكى ج.ب.ج . أماليوس دالوى) يضم طبقات من الصخور الرسوبية ، والانقراض الذى نتحدث عنه يحدد نهاية هذا العصر . وفى هذا المعنى يمكن أن نصفه بأنه واحد من أطول العصور - التى يمكن ملاحظتها بوضوح - فى تاريخ كوكبنا .

وحقب ما قبل الكامبرى الذى شغل نحو خمسة أسداس تاريخ الأرض كله ، حقب أطول بكثير . فى هذا الحقب ظهرت الحياة لأول مرة على كوكبنا ، وحورت الكائنات الدقيقة من البحار ، والجو ، ومن بعض - على الأقل - من أسطح الأرض الجافة ، حورتها بطرق استغللتها الأشكال الحية فيما بعد . لكننا لا نعرف الا القليل عن هذه الكائنات الدقيقة ، فهى لم تترك من الأحافير الا القليل ، ولأن تأريخنا لتاريخ الأرض قد اعتمد بشدة فى الماضى على أنواع معينة من الأحافير التى توجد فى طبقات معينة من الصخور ، فقد افترض عادة أن غياب البقايا المتحجرة للأنواع عديدة الخلايا فى صخور ما قبل الكامبرى إنما يعنى غياب الحياة فى ذلك الحقب . لكننا عرفنا مؤخرا ليس فقط أن هذه الصبورة خاطئة - فقد عثر على أحافير دقيقة - وإنما أيضا أن هذا أمر غير معقول . لقد سبقت الكائنات الدقيقة الكائنات الكبيرة فى الظهور . ولقد شغلت الكائنات الدقيقة ، وحدها ، الأرض معظم تاريخ هذا الكوكب .

وفى اثناء احتلالها - وحدها - للأرض طيلة هذا الزمن ، قامت بتغيرات هائلة - فى كيمياء البحار وفى الجو على وجه الخصوص . فلقد نتج غاز الأكسجين - بكميات كبيرة تجمعت بالغلاف الجوى - كمنتج ثانوى لعملية التمثيل الضوئى التى تقوم بها النباتات وحيدة الخلية . ولقد كانت هذه الواقعة بلا أدنى شك هى أخطر « وقائع التلوث » التى عرفها العالم ، لأن الأكسجين غاز شديد التفاعل ، كما أنه سام جدا بالنسبة للكائنات التى لا تعرفه .

لا وليست هذه هى القصة الكاملة للأكسجين ، ذلك أنه لو ازدادت نسبته فى صورته الغازية فى أى وقت عن حد محدد ، فإن خصائصه المؤكسدة ستتقلب على ما اكتسبته الأنواع من مقاومة . يستضى أكسدة المادة الكربونية بسرعة كبيرة ، بمعنى أن ومضة واحدة فقط من ومضات البرق العشرة آلاف التى تحدث كل يوم قد تشعل نارا تقضى على كل الكائنات الحية على وجه الأرض ، لكن هذا لم يحدث ، وإن يحدث (كما نرجو) بسبب أنشطة الكائنات الدقيقة التى لا تعد ولا تحصى والتى تستعمل الأكسجين مباشرة وتأخذه من الجو ، أو التى تطلق الغازات (كغاز الميثان) التى تتأكسد فى الجو « فتحبس » الأكسجين .

لا يجوز لنا أن نغفل دور الكائنات الدقيقة فى تشكيل العالم الذى نعرفه ، بسبب غموض هذا الدور ، ولا يصح أن نهمل هذه الكائنات بسبب صغر حجمها . إن أهميتها فائقة . كما أن لها علاقة وثيقة بحكايتنا هذه . أن كل ما يسبب تغيرا كبيرا فى الكائنات الدقيقة على الأرض يمكن أن يقود بطريق غير مباشر الى تغيرات هائلة فى البيئة تؤثر على النباتات عديدة الخلايا وعلى الحيوانات . غير أننا لا نمتلك سجلا لمثل هذه التغيرات ، كما أن أثرها النهائى - ولكونه غير مباشر - قد يبدو وكأنه لا علاقة له بالسبب الأساسى الذى قد نعرف له سجلا . أن الكائنات الدقيقة توفر البنية التحتية التى تعتمد عليها الأنواع الأكبر ، والتغير فى هذه البنية قد يلعب دورا تطوريا أكبر من أى دور تنسيبه له .

ورغم ذلك فإن العصر الطباشيرى - إذا تركنا العصر قبل الكامبرى جانبا - عصر طويل حتى بالمقياس الذى يستخدمه الجيولوجيون فى قياس التاريخ ، فلقد امتد نحو ٧٠ مليون سنة . أن بدايته تبعد عن نهايته بقدر ما تبعد نهايته عن عصرنا الحاضر . وطبيعى أن تتم خلاله تغيرات كبيرة ، ومن بين هذه التغيرات هناك انقراض بعض الكائنات أو وشاكة انقراضها . غيرت عشيرة الزواحف البحرية تركيبها . كان الأكسور - كذلك الذى عثرت عليه مارى آننج - متلاصبا تماما للحياة فى البحر ، لكن يبدو

أن أعداده قد تناقصت بتقدم هذا العصر ، ليختفى تماما منذ ٦٥ مليون سنة مضت . ولقد تلاشى التمساح البحرى فى أوائل ذلك العصر . لكن البليسيوصور - وهو زاحف بحرى آخر - ازدهر ليصل عدد أجناسه فى نهاية العصر الى عشرين جنسا على الأقل ، لم تكن جميعا ضخمة ، وإن كان بعضها هكذا - فلقد كان طول جمجمة الكرونوصور ثلاثة أمتار . ولقد كيفت السلحفاة نفسها للحياة البحرية ، ومثلها أيضا بعض السحالي ، وتطورت الى الموزاصور الذى ازدهر أيضا فى نهاية هذا العصر الطباشيرى .

ومع ذلك فقد كان العصر الطباشيرى قبل كل شيء هو العصر الذى ازدهرت فيه الدينوصورات - تلك الزواحف الأرضية . كانت الدينوصورات قد وُلدت وجودها عند بداية هذا العصر ، فلقد ظهرت فى العصر الثلاثى (الترياسى) وتزايدت أعدادها فى العصر الجورائى ، هى إذن قد نشأت قبل بداية العصر الطباشيرى بنحو ٩٠ مليون سنة . كان الايجوانودون شائعا فى العصر الطباشيرى ، على الأقل فى بعض المناطق ، كما وجدت به أيضا كل المجموعات الرئيسية : الصربودات والكارنوصورات والكوليوروصورات والطير قدميات والصورات المجنحة . ولقد تزايدت أعداد الصربودات خلال هذا العصر ثم تدهورت ، ومن المحتمل أن تكون قد اختفت قبل نهاية هذا العصر . أما الاصطغورات فقد اختفت تماما قبل بداية العصر الطباشيرى لتحل محلها الانكيلوصورات - وهى حيوانات عشبية كانت تدافع عن نفسها بصفائح درعية تعطيها شكل دبابة حية .

ثمة مجموعتان كانتا تسيطران على الزواحف : مجموعة الأورنيثيشيانات (العشبية) ومجموعة الصوريثيانات (اللاحمة) ، وهما تشكلان الدينوصورات الحقيقية . ولقد تشعبت هاتان المجموعتان وأصبح الكثير من أنواعها ضخم الجثة . ولقد ظهرت فى نهاية العصر الطباشيرى أكبر لواحم هذه الأرض طرا : التيرانوصور ، ولم يكن نوعا واحدا وإنما كان جنسا يضم العديد من الأنواع ، كما كان هناك الكثير من الأقارب البعيدة التى تضارعه شكلا . أما الأورنيثيشيانات فقد أنتجت الهادروصورات ، وهى الدينوصورات التى تتميز بما يشبه منقار البط ، ولقد ظهر منها فى نهاية الأمر نحو عشرين جنسا ، كما أنتجت أيضا السيراتوبسيانات ، وهى الزواحف التى كانت تتميز فى المراحل الأولى من تطورها بوجود أهداب شعرية حول الرقبة ، وكان لها فى نهاية العصر قرون ضخمة . وتنتمى التيريسيراتوبات لهذه المجموعة . أما الصورات المجنحة فقد تدهورت خلال هذه الفترة ولم يبق منها فى نهاية العصر إلا بضعة مجاميع قليلة .

صحيح أن مجاميع الدينوصورات التي ازدهرت قد أنتجت بعضها من العماليق ، لكن الحقيقة هي أن الحيوانات الضخمة حقا - والتي تقفز الى الذهن عادة اذا ما سمعنا كلمة دينوصور - قد اختفت قبل بداية العصر الطباشيري . فلقد ازدهر الديلودوكس - وكان طوله ٢٦ مترا ، كان عملاقا بحق - في العصر الجوراي الحديث واندثر قبل منتصف الطباشيري بوقت طويل . أما الذراعصور - الذي كان طوله ١٢ مترا ويزن ٨٠ طنا - فقد اندثر في منتصف هذا العصر . أما الأباتوصور - وكان يسمى الربيثوتوصور - فقد كان نوعا جوراويا لم يستمر طويلا في العصر الطباشيري .

ان الصورة التي تبرز أمامنا خلال العصر الطباشيري تبين الدينوصورات في حالة صحية تماما ، من وجهة النظر التطورية . كان البعض منها كبير الحجم - وأبدا لم تكن كلها هكذا - ولكن الحجم على ما يبدو كان يعطيها ميزة . ولم يكن معمقا على الإطلاق . ومن الجائز فعلا أن تكون حقيقة أن الدينوصورات قد غدت ضخمة أولا ، ثم اندثرت - وهو ما حدث أيضا لمجاميع عديدة من اللافقاريات في أزمنة مختلفة - هي السبب في الاعتقاد القديم بأن الحجم لابد وأن يقضى الى الانقراض . علينا أن نضع نصب أعيننا دائما أن مجرد تعاقب ظاهرتين لا يعني بالضرورة وجود علاقة سببية بينهما . فلقد حدث أن سلك التطور الطريق ناحية الحجم الكبير مرات عديدة بين الزواحف القديمة ، وطبيعي أن بعض الأنواع قد انقرض . ونحن لا نتوقع شيئا غير هذا . لقد اختلف الكثير من أنواع الثدييات خلال الخمسة وستين مليون عام الأخيرة . وسنعود الى هذا الموضوع في الفصل التاسع عندما نتفحص المرحلة التي وصلها التطور على نهاية العصر الطباشيري .

وقبل نهاية العصر الطباشيري كانت الدينوصورات قد غدت عديدة ومتنوعة ، وليس لدينا من سبب على الإطلاق يدعونا للفرض بتعرضها لاية منافسة - الا اذا كانت فيما بينها . كانت الدينوصورات ناجحة تماما كما الثدييات الآن ، بل وربما كانت أكثر نجاحا ، فهي على أية حال قد ازدهرت فترة تقرب من مائة وخمسين مليون سنة .

وسنجد عموما أن النوع الذي يموت يفسح المجال أمام نوع آخر من نفس طائفته يحل محله . قد تبدو هذه الجملة فضفاضة ، لكنها في الواقع حقيقة بديهية . ثمة شواهد كثيرة من التاريخ الحديث . خذ مثلا الأرخص (بوص بريمييجينوس) ، الثور الأوروبي البري . لقد انقرض هذا الحيوان في القرن السابع عشر ، فلم يستطع أن ينافس الاتسنان الذي كان يصطاده للحم ، كما يقتله لأنه يتلف الحاصيل . انقرض النوع اذن لكن الجنس الذي يضمه لا يزال سليما مزدهرا - وأمامك

أقاربه من الأبقار المستأنسة • وهناك قائمة طويلة من أنواع الثدييات والطيور التي انقرضت حديثاً ، لكن الثدييات والطيور لا تزال مزدهرة •
ان فرضنا (المبرر) بأن أنواعاً معينة قد لا تستطيع أن تتلام مع تغير البيئة ، هذا الفرض لا يصح أن ينسحب الى فرض يختص بالملامة التطورية للثدييات والطيور • ان هاتين الطائفتين في الحق ناجحتان تماماً •

المهم هنا هو ان ما حل محل الزواحف التي انقرضت خلال العصر الطباشيري كان زواحف أخرى ، وبذا فليس من سبب يدعونا للفرض بأن بقاء الزواحف كملائمة قد هدد ، أو ان أنواع الدينوصورات المختلفة قد انتهت بسبب التقدم الطبيعي للطور •

كان من بين الأنواع التي اختفت من الأرض في هذا القرن نوعان من فئران البندقوط وفأر الكنغر ، وهى من الجرابيات الاسترالية المحلية • هذه الفئران لم تتحمل المنافسة مع الثدييات المشيمية التي أدخلت الى استراليا • فى مثل هذه الحالة ، التي قاسى فيها الكثير من الجرابيات بشدة من منافسة الثدييات ، قد نجد مبرراً لاستنباط عن الجرابيات ككل •
اننا لا نعرف بالتأكيد السبب فى أن تجد الجرابيات صعوبة فى منافسة المشيميات (ويبدو أن الفكرة القديمة بأنها أقل كفاءة من الناحية التناسلية فكرة خاطئة) • لكن تبقى حقيقة أنها وجدت المنافسة صعبة ، وربما خولت لنا هذه الحقيقة أن نستنبط أن الجرابيات أقل فى الكفاءة التطورية من المشيمات •

استبدل بالأرخص ، الثديى المشيمى ، ثديى مشيمى آخر هو سلالته المستأنسة ، وفى الحالة الأخرى استبدلت بجرابيات معينة أنواع من مجموعة أخرى • وما حدث فى العصر الطباشيري هو استبدال زواحف بالزواحف التي أندثرت ، وبذا فليس هناك ما يبرر الفرض بأن بقاء الزواحف - ككل - قد هدد ، أو أنها قد هلكت مع التقدم الطبيعى للتطور •

ومباشرة ستبدو فكرة الانقراض التدريجى وقد ضعفت ، لأنه بالرغم من أن الكثير من الأنواع أو الطوائف قد أندثرت خلال العصر الطباشيري ، فإن هذا لا يغير من حقيقة أن الكثير منها كان موجوداً فى نهاية العصر - ولكن ليس بعد ذلك • ويبدو فعلاً أن الزواحف فى الأزمنة الحديثة - وربما أيضاً منذ بداية الحقب الثالث - قد استمرت فى الاندحار أمام طوائف أخرى • وهذا يعنى - فى السياق التطورى - أنها لم تعد « قوية » •

ان وجود الثدييات بالعصر الجورائى أمر معروف • كانت ثدييات ذلك العصر بدائية ، ولكن كان منها العديد من الأنماط • غير أن السجل

الحفرى يقول ان الحيوانات نفسها كانت صغيرة وغير شائعة • ولقد ازدادت أعدادها خلال العصر الطباشيرى • وعلى نهاية هذا العصر ظهرت ارائل الجواييات والمشييمات آكلات الحشرات • كانت الحيوانات نفسها ما تزال صغيرة - كان اكبرها فى نحو حجم أوبوسوم فيرجينيا أو القطه المنزلية • وربما كانت قارته حقا ، وان كانت تميل الى الأغذية ذات الأصل الحيوانى • كانت بكل تأكيد تأكل الحشرات ويرقاتها ، ويبيضها فى بعض الأحيان ، كما كانت تأكل بيض الطيور ، والجيفة ، وما يمكنها اصطياده من الحيوانات الصغيرة • وحتى لو افترضنا أنها كانت أكثر عددا مما يقتصره السجل الحفرى ، فمن الصعب أن نتفهم نوع التهديد الذى تسببه للزواحف الكبيرة الراسخة •

ورغم الحكايات المعروفة عن الفيلة التى تخاف من الغثران (وان كانت تبدو بالفعل قلقة فى وجود الحيوانات الصغيرة سريعة الحركة ، ربما خوفا من أن تدخل خراطيمها) فان عشائر الحيوانات الكبيرة نادرا ما هددتها عشائر الحيوانات الصغيرة - ان كان ثمة تهديد على الإطلاق، ثمة غابة أوروبية حديثة متساقطة الأوراق قدرت فيها العشائر الحيوانية • اتضح أن الكتلة الحيوية (الوزن الكلى) للحيوانات الصغيرة - القوارض واللواحم وآكلات الحشرات - تفوق مثلثتها للثدييات الكبيرة - الخنزير البرى والغزال - بنسبة ٥ : ٢ • والخنازير عموما حيوانات قارته ، أما الغزال فهو عشبي متخصص • والتباين فى الثدييات الصغيرة أكبر بكثير، ولكنها لا تضايق الثدييات الكبيرة • ولم يقترح أحد أن الكتلة الحيوية للثدييات العصر الطباشيرى كانت تقترب حتى من الكتلة الحيوية للزواحف، وبذا فالثدييات على الأغلب لم تكن بالمنافس الخطير • وليس هناك أية شواهد توحي بأن ثدييات العصر الطباشيرى كانت تتكاثر بالمعدل الذى نتوقعه لو أنها احتلت مناطق كانت الزواحف تشغلها • على العكس ، فزيادتها لم تبدأ حقا الا فى الحقب الثالث عندما احتلت مواقع الزواحف التى انقرضت •

يبدو إذن أن علينا أن نهمل فكرة أن يكون تدهور الزواحف قد حدث نتيجة لنجاح الثدييات •

والشواهد بالنسبة للطيور أكثر غموضا ، ذلك لأن سجلها الحفرى أقل إرضاء من سجلات الطوائف الأخرى • والأرجح أن أنماط الطيور الحديثة قد ظهرت على نهاية العصر الطباشيرى • ومن الجائز أن تكون قد تناقست بنجاح مع الصورات المجنحة ، ويبدو أن نجاحها قد تم متواقتا مع تدهور هذه الصورات (وعلى الذكر ، لم تتطور الطيور عن الصورات

المنجحة وإنما عن مجموعة أخرى من الدينوصورات) ، لكن الحقيقة هي أنه حتى لو كانت الظاهرتان مرتبطتين سببياً - نعى أن نجاح الطيور كان بسبب تدهور الصورات المنجحة - فإن هذا لا يخدم الجدل ، لأن الطيور إنما تتنافس فقط في المناطق الصالحة للشكال الطائرة • والزواحف الكبيرة - أرضية كانت أو بحرية - لم تعتمد أبداً على غذاء لا يتاح إلا بالطيران ، وبذا فإن تأثيرها بهذا التغير لا يختلف عن تأثير الثدييات الحديثة الكبيرة ، الأرضية الغذاء - بتغير عشائر الطيور • أضف إلى ذلك أن تدهور الصورات المنجحة قد لوحظ على طول معظم العصر الطباشيري ، وقد تكون قد اختفت تماماً على نهايته • لكن سيفرينا دائماً أن ننصوّر أنها اختفت لأنها لم تتمكن من منافسة الطيور •

لكن هذا الجدل للأسف ليس مقنعاً حقاً • ويمكن توضيح هذا بمقارنة الطيور بالخفافيش ، وهذه رتبة من الثدييات • لقد عثر على بقايا أحافير الخفافيش في طبقات ترجع إلى الفترة الأيوسينية والعصر الثالث - وهي الفترة التي ابتدأت من ٥٤ أو ٦٠ مليون سنة مضت - ولكنها قد تكون قد ظهرت في وقت مبكر عن ذلك ، في الفترة الأولى من العصر الثالث المسمى بالعصر الباليوسيني • ويبدو أنها لم تسبب أية مضايقة محسوسة للطيور فإذا ما كان نجاح مجموعة يقود إلى اختفاء المنافسين ، فالمفروض أن يحدث هذا هنا • والخفافيش تنتمي إلى ما قد تكون أكثر رتب الثدييات نجاحاً (رتبة كيروبترا) وهي مكيفة تماماً للطيران ، ويمكنها حقاً أن تتفوق في المناورة على الطيور الصغيرة آكلة الحشرات التي تشاركها أجواء المساء •

وبالرغم من أن معظم الخفافيش والكثير من الطيور تتغذى على الحشرات ، فليس من سبب يدعونا للفرض بأن ظهور الخفافيش ، متأخراً عن الطيور بنحو ٦٠ أو ٧٠ مليون سنة ، قد أدى إلى اختفاء نوع واحد فقط من الطيور • لا ولا نستطيع أن نفترض أن الحياة الليلية للخفافيش كانت استجابة لمنافسة الطيور النهارية • لا شك أن حياتها الليلية قد سهلت ترسيخها ، لكن من المستبعد أن تكون قد اتخذت هذا السبيل لهذا السبب • والأغلب أن الخفافيش قد تطورت عن أنواع ليلية بينما تطورت الطيور عن أنواع نهارية •

الواضح أن الخفافيش لم تسبب أية مضايقات للطيور ، ولكن ، هل ضايقت الطيور الصورات المنجحة ؟ ربما يكون هذا قد حدث • لكن ليس هناك من سبب دامع يؤكد ذلك • لا بد أن الكثير من الصورات المنجحة كان يتغذى على الحشرات ، وربما قضى الكثير من أنواعها الكبيرة معظم

حياته فى الهواء ، تماما كطائر القادوس أو طائر السنونو الحديث . كانت أرجلها قصيرة ضعيفة . الشئ الذى يجعل من الصعب عليها أن تجثم أو أن تتحرك على الأرض أو أن تنطلق طائرة ثانية بعد وقوفها على الأرض ، بالرغم من أن البعض منها قد يكون قادرا على التوقف فوق سطح الماء وأن ينطلق طائرا منه ، تماما كطيور البحر الحديثة .

علينا فى النهاية أن نترك اختفاء الزواحف الطائرة كلفز ليس لدينا تبرير مقبول له . وكل ما نستطيع أن نقول هو أن هذه المجموعة ككل قد اختفت بالتدريج ، وأنها جميعا على الأغلب قد انتهت قبل نهاية العصر الطباشيرى بفترة ما ، وأن تدهورها قد توافق مع ترسيخ الطيور ونجاحها .

لا ولا يستتبع ذلك أننا إذا استطعنا أن ننسب تدهور مجموعة الى نجاح أخرى ، فإن هذا التدهور بالضرورة لابد أن يكون تدريجيا . فإذا اعتبرنا أن مصير الأنواع التى اختفت فى الأزمنة الحديثة كان بسبب كفاح الإنسان كى يهيئ لنفسه البيئة التى يرغبها ، فسنجد أن بعض الأنواع قد انقرض فجأة . ففى خلال بضعة قرون لا أكثر - وهذه فترة أقصر من أن يقيسها الحفرى - اختفى أكثر من مائتى نوع من الطيور والثدييات . وبالرغم من أن حجم هذا الانقراض لا يمكن أن يقارن بما حدث فى نهاية العصر الطباشيرى ، إلا أنه كان فجائيا تماما . صحيح أن سببه كان هو نفس التنافس بين الأنواع الذى نفترض له أن يعمل بالتدريج ، لكنه لم يكن كذلك ، أو هو على الأقل لم يكن كذلك فى كل الحالات .

اقترح أن الزواحف البحرية قد فشلت فى المنافسة أمام الأسماك كاملات العظام التى ظهرت خلال العصر الطباشيرى (وهذه تحت طائلة من الأسماك العظمية تضم معظم الأسماك الحديثة) . من الواضح أن الأسماك الأكثر تطورا قد حلت محل بعض (وليس كل) منافسيها من الأسماك الأكثر بدائية ، لكن من الصعب أن نتخيلها كتهديد أيكولوجى للزواحف ، إنما الأرجح أن تأكل الزواحف هذه الأسماك الجديدة . فإذا كانت المنافسة هى التى أدت الى تدهور الاكسوروات مثلا ، فمن الممكن أن يفسر هذا ببساطة وبشكل أكثر قبولا عن طريق التطوير الذى حدث للبلصورات التى يبدو أنها كانت حيوانات صيد على درجة عالية من الكفاءة . وكما حدث بالنسبة للصورات الطائرة ، فلا يمكننا أن نقول بالنسبة للزواحف البحرية التى اختفت خلال العصر الطباشيرى سوى أن انقراضها قد حدث على ما يبدو تدريجيا ، وأنه قد تم قبل نهاية هذا العصر ، وأنه ليس أمامنا إلا أن نتركه دون تبرير .

عندما وضعنا فى الاعتبار امكان اهمال المنافسة بين الأنواع كسبب هام لانقراض الأنواع ، توصلنا الى دليل قد يكون هاما • فى اشارتنا الى الغاية الأوروبية الحديثة (ص) اغفلنا أن نبرز تهديدا أكثر معنوية بالنسبة للتدييات الكبيرة: هو تحطيم موطن حياتها • كان الانسان هو الفاعل فى هذه الواقعة ، لكنها واقعة خاصة • فالنوع المستول – أو المجموعة المستولة فى تقسيم أعلى – لا يلزم أن تنافس ، بل الواقع انه من المستبعد أن تنافس الأنواع المهددة ، فى نفس الغذاء أو نفس نمط موقع المأوى ، منافسة مباشرة •

وحيثما حدث هذا – وربما كان هذا هو أكثر الظواهر الايكولوجية توفيقا – كانت الحيوانات الكبيرة الحجم – بلا استثناء – هى الأكثر تأثرا • كثيرا ما تكون هذه الحيوانات نوعية جدا فى غذائها ، وبذا لا تستطيع النجاة اذا ما اختفت أنواع النباتات التى تعتمد عليها فى طعامها • كما انها تفقد أماكن إيوائها وتقاسى من قلق لا تستطيع تحمله بسببه وجود أنواع أخرى ، بالرغم من أن هذه الأنواع الأخيرة لا تبغى لها فى الحقيقة ضرا • هناك بالطبع الكثير من الحيوانات الصغيرة – لا سيما من الحشرات – النوعية فى غذائها ، وهى فى مثل هذه الحالات عادة ما تختفى أيضا • لكن هذه الانماط المتخصصة عادة ما تكون تحويلات عن أنماط أقل تخصصا أو مختلفة التخصص تبقى ولا تندثر • ان تحطيم غابات المطر الاستوائية قد يسبب انقراض الكثير من الفراشات وأبى دقيقات – مثلا – وهى حيوانات تعتمد تماما على عشائر النباتات التى تحيا عليها • لكن اختفاءها لا يعنى اختفاء كل الفراشات وأبى دقيقات فى كل انحاء العالم • ومعظم التدييات الصغيرة عالية التعلق عموما ، وهى قد تزدهر أحيانا كما ازدهرت القوارض والثعالب ومجموعات أخرى عديدة عندما تحولت غابات المناطق المعتدلة الى أراض زراعية •

لا بد لنا إذن أن نعالج احتمال حدوث تحول ايكولوجى عظيم تسبب فى أن تواجه الحيوانات الأكثر تطورا والأكثر تخصصا ظروفا لم تستطع أن تتغلب عليها • وعلينا أن نقتصر فى المرحلة الحالية على أنواع التغير التدريجى ، والتغيرات المفاجئة التى تنجم عن أسباب من خارج الأرض ليست بالقل ايكولوجية أو طبيعية •

الأغلب أن تظهر مثل هذه التغيرات أولا كتحويل فى الأساس الغذائى للنظام البيئى – نقصد البعض المعين من الكائنات الدقيقة والنباتات الخضراء التى تحول المركبات البسيطة الى مواد أكثر تعقيدا تحتاجها الكائنات العنصرية للتغذية (تسمى الكائنات التى تستطيع أن تصنع الغذاء الذى تحتاجه من المركبات البسيطة التى تحصل عليها من التربة

أو الماء أو الهواء باسم الكائنات بدائية التغذية ، أما الكائنات التي لا تمتلك هذه القدرة ويلزمها أن تتغذى على الكائنات الأخرى فتسمى الكائنات عضوية التغذية) • وقد يحدث التغير أيضا نتيجة حوادث في مواقع أخرى من دورة التغذية • فمثلا ، قد تتغير الكائنات الحية الدقيقة التي تحصل البقايا العضوية وتعيدها إلى جذور النباتات كمركبات بسيطة ، وقد تتدهور بعض المجاميع في الوقت الذي تزدهر فيه مجاميع أخرى ذات أنشطة بيوكيميائية مختلفة ، وقد يؤثر مثل هذا التغير في كيمياء المحاليل المائية للتربة الذي تعتمد عليه النباتات الخضراء ومعها كل الحيوانات ، أو قد يؤثر في تركيب الغازات التي تطلق إلى الجو • إننا نعرف أن مثل هذه التغيرات قد حدثت في الماضي ، فبين أيدينا سجلات عن آثارها • ولكن ، دعنا الآن نهتم فقط بالتغيرات بين النباتات الخضراء نفسها •

إذا ما فكرنا في التطور فإن تفكيرنا عادة ما ينصب فقط على تاريخ الحيوانات • فلأننا نحن من الحيوانات فإن اهتمامنا يتركز على أسلافنا • وإذا تصورنا شجرة تحاضر في مادة التطور ، فسيختلف الأمر ! يجب ألا ننسى أن النباتات قد تطورت ، وأنها لا تزال تتطور ، تماما كالحيوانات • وفي خلال العصر الطباشيري ، تميز التغير الأساسي في نباتات العالم ببزوغ وانتشار النباتات الزهرية الكاسيات البذور •

قد تظهر أنواع من النباتات جديدة خلال طريق التطور الطبيعي ، ولكن يصعب أن نتصور أنه ما أن ترسخ هذه الأنواع الجديدة في منطقة معينة حتى تنتشر بسرعة إلى المناطق المجاورة التي يسودها نباتات من أنماط جديدة • كل ما نحتاجه هو أن نفترض وجود ميزة واضحة بهذه النباتات الجديدة ، بجانب نوع من « قوة الدفع » الأيكولوجية ، يمكنها من أن تفرض نفسها • وهذا ليس بالأمر الصعب •

من بين أنواع كاسيات البذور نفسها يمكننا أن نفكر أولا في تطور تباينات في المسالك البيوكيميائية للمثيل الضوئي • مثل هذه التباينات ترتبط أساسا بمدى استفادة النباتات من طاقة الضوء في التنفس • ثمة نباتات تسمى نباتات (سي ٤) لا تقوم بالتنفس الضوئي (لا تستخدم طاقة الضوء في التنفس) ولكنها تستطيع – بشكل أسرع من تلك التي تقوم بالتنفس الضوئي ، على درجات الحرارة العالية وشدة الضوء العالية – أن تقوم بالمثيل الضوئي ، وبذا تنمو بشكل أسرع • وتوجد مثل هذه النباتات أساسا بين الحشائش الاستوائية – الذرة والذرة الصفية وقصب السكر مثلا – ولكن ، لأننا نعتقد أن مواقع التنفس هو بعض الخمائر المؤكسدة والحافزة بجسيمات مرتبطة بالغشاء (تسمى ببيروكسيومات) داخل السيتوبلازم بخلايا النباتات ، ولأن البيروكسيومات توجد في بعض

اعضاء بعض العائلات دون البعض الآخر ، بل وحتى في بعض الأنواع وليس في أنواع أخرى تابعة لنفس الجنس - مثلا الترييلكس والباينيكوم (دغل الملح ، و جنس الأعشاب الذي يضم الدخن والكثير غيره من الأعشاب الاستوائية) - لهذا نستطيع أن نقول انه من الجائز أن تكون هذه النباتات أكثر انتشارا . وإذا كان هذا صحيحا فإن تحول الجو الى الدفء سيهايبها ، ويسمح لها بأن تمت تخومها على حساب منافسيها من النباتات .

هناك « مداخل » في حياة النباتات يمكن أن تصبح « عتلة » للتوسع . فالجفاف قد يزيل النباتات الموجودة على السطح ، كما يحدث في المناطق نصف الجافة الآن ، ومثله أيضا البرد الطويل أو الغمر الطويل بالماء . فلو أن أنواعا تطورت يمكنها أن تستغل مثل هذه المساحات المصابة عندما تتحسن الظروف ، بصورة أسرع من الأنواع « التقليدية » ، فربما أمكنها أن تشكل حاجزا كثيفا يستبعد منافسيها . إذا كان هذا ممكنا ، فكل ما نحتاجه هو فقط أن نفترض وجود مثل هذه الأنواع على مقربة ، بجانب فرصة ملائمة للاستعمار ، لكي يتغير نمط النباتات فوق المنطقة المصابة تغيرا جذريا ، وبسرعة كبيرة .

والحرائق التي تحدث طبيعيا في النباتات الجافة تزيل تقريبا كل النباتات الموجودة بالمنطقة التي تتأثر بها . وتحدث إعادة استعمار هذه المناطق عادة على مراحل ، الى أن يظهر من جديد شيء قريب الشبه بالعشائر الأصلية . وحيثما تحدث الحرائق بانتظام - على فترات بينها عقد من السنين أو أقل - فإن التغير الايكولوجي قد يفيد نجاح تلك الأنواع الأكثر مقاومة للنار . وعلى سبيل المثال ، فقد شكلت أشجار الصنوبر الطويلة حاجزا كبيرا بهذه الطريقة ، فالشجرة نفسها تتكون من خشب كثيف مقاوم للنار ، كما أن بذورها هي الأخرى تعتبر مقاومة أيضا . بل ان هناك أنواعا من الأشجار تستغل ميزة تحملها للنار ، بأن تنتج نثارا وفيرا من الأوراق والأغصان ، شديد القابلية للاشتعال ، يكون عرضة للاشتعال تلقائيا تحت الظروف الجافة ، لتقوم النيران التي تشب بتخليصها من منافساتها . أيجوز إذن أن تكون بعض الأنواع قد أسرعت من تقدم كاسيات البزور ؟

دعنا نمضي مع هذا التأمل خطوة أبعد : هل من الممكن أن يكون ازدهار كاسيات البزور قد خلق ظروفًا تجعل الحرائق أكثر شيوعا ؟ ان هذا قد يحدث إذا كان لتركيز الأوكسيجين في الجو أن يزداد ، حتى ولو بنسبة ضئيلة . وهو قد يزيد إذا مضى التمثيل الضوئي بمعدل أعلى - ربما أثناء بزوغ النباتات الكاسيات البذور - وكذا إذا ما دفن الكربون

بدلا من أكسدته بالتحلل الطبيعي . فى اثناء تكوين الفحم يدفن الكربون بهذه الطريقة ، وفى مثل هذه الأوقات يزداد بالفعل تركيز الأكسجين بالجو ، وكلما ازداد الأكسجين فى الجو كلما ازدادت سهولة وحرارة احتراق المواد العضوية .

ازدادت بالفعل كمية الأكسجين فى الجو خلال جزء من العصر الطباشيرى . ولقد تركت النباتات المورقة سجلات تفصح عنها فى صورة حقول شاسعة من الفحم . وهذا أمر معقول من ناحية علم الحفريات . وقد يكون لما أنتجت من زيادة فى تركيز الأكسجين بالجو أثر فى زيادة خطر اشتعال النيران .

وهذا أمر مهم أيضا من الناحية المناخية ، فعملية دفن الكربون تمنع التحلل المؤكسد الذى يعيد ثانى أكسيد الكربون الى الهواء . يقلقنا الآن احتمال أن يؤدى حرق الوقود الحفري - وبعضه نشأ خلال العصر الطباشيرى - الى اعادة ثانى أكسيد الكربون هذا مرة أخرى الى الجو ، الشيء الذى سيؤدى الى ارتفاع حرارة الجو من خلال ما يسمى بظاهرة الصوبة (وسنقوم بشرحها فى الفصل السابع) . وليس هناك من سبب جدى يدعونا للشك فى أن لكمية ثانى أكسيد الكربون فى الجو اثرا مباشرا على المناخ . والواقع أن فى مقدورنا أن نحسب تركيز ثانى أكسيد الكربون فى الجو السائد فى أى زمن نريده فى الماضى ، ويمكننا بفحص نظائر الأكسجين أن نحسب درجة الحرارة . تحتوى الصخور الرسوبية على مركبات أكسجينية ، ويمكننا أن نأخذ منها العينات اللازمة ، كما نستطيع أن نأخذ بعضا من لب الصخور ونقدر عمره ومنه يمكن حساب عمر العينات . وتبين نتائج مثل هذه القياسات والحسابات أن درجة حرارة الهواء ترتبط ارتباطا مباشرا بمربع تركيز ثانى أكسيد الكربون . وعلى هذا نستطيع أن نقول أن دفن الأكسجين فى العصر الطباشيرى قد تسبب فى تدهور فى المناخ . وسنعود فيما بعد الى قضية أثر التغير فى الجو . علينا أولا أن نفحص ما اذا كان حدوث تغير كبير فى أنماط النباتات سيؤثر فى الحيوانات التى تعتمد عليها فى التغذية .

فى بداية العصر الطباشيرى كانت النباتات السائدة تشمل الصنوبريات والسرخس والسيكاس والجنجو وغيرها من عاريات البذور . ولقد اختفى الكثير من هذه النباتات الآن ، ولكنها كانت قد رسخت تماما على الأرض منذ الفترة الأخيرة من الحقب الباليوزوى . كانت قد أصبحت سائدة فى العصرين الترياسى والجوراسى ، وظلت هكذا طيلة معظم العصر الطباشيرى . بمعنى آخر : كانت الحياة الحيوانية فى العصر الطباشيرى قد تطورت فى عالم يزدها بغذاء من عاريات البذور .

أما النباتات الزهرية الحقيقية (مغطاة البذور) فقد كانت موجودة في بداية العصر الطباشيري - ويبدو أنها ظهرت أول ما ظهرت في منتصف العصر الجوراسي ، وربما في بدايته ، لكنها لم تكن شائعة . وهي لم تصبح شائعة إلا في منتصف هذا العصر ، وعلى نهاية العصر الطباشيري غنت هي السائدة في كل القارات ، وما زالت هكذا حتى الآن . هل من الممكن أن يكون التغيير قد حدث فجأة ؟ *

إن الفارق الأساسي بين عاريات البذور ومغطاة البذور يكمن في طريقة التكاثر . فعاريات البذور تعطي مبايض كبيرة عارية وبذورا عارية ومغطاة البذور تعطي بويضات صغيرة محمية داخل مبيض ، وبذورا داخل ثمرة . ببساطة : تتكاثر مغطاة البذور بشكل أكثر كفاءة . ونجاحها أمر لا شك فيه ، بغض النظر عما إذا كان هذا هو السبب . ولقد انتشرت بسرعة : فبعد أن كانت نادرة في بدء العصر ، أصبحت شائعة بعض الشيء على منتصفه ، ثم - وفي الخمسة عشر أو العشرين مليون سنة الأخيرة منه - احتلت تقريبا كل مواطن النباتات المتاحة . كان نجاح مغطاة البذور نجاحا ساحقا ، وكان بالمعيار الجيولوجي نجاحا مفاجئا . سمح تمييزها الأول لها بأن تحتل المواقع المرتفعة ، ولكنها في نهاية العصر كانت موجودة في الوديان أيضا ، بل وسيطرت عليها .

أمن الممكن أن يكون لهذا التغيير أثر معاكس على حياة الحيوان ؟ يمكن بالتأكيد . أننا نعرف اليوم أن عشيرة الثدييات ، وهي المتعددة الكفاءات تختلف كثيرا بغابات الصنوبريات (العارية البذور) عنها بغابات عريضة الأوراق (المغطاة البذور) . ولا يحتاج الأمر من الحيوانات الكثير من التخصص لتحصل على غذائها من نوع من النبات ولتجد نباتات أخرى غير مستساغة ، أو حتى سامة . ونحن البشر الذين تطورنا بين النباتات مغطاة البذور - نأكل مغطاة البذور ، ونأكلها أيضا حيواناتنا الزراعية ، أما عاريات البذور فتزودنا بالأخشاب ، وبالمقاييل جدا مما يمكننا أكله . ماذا نفترض أن الحيوانات أكلة الأعشاب في العصر الطباشيري كانت أفضل منا كفاءة في هذا المضمار ؟ وإذا ما كان نمط النباتات قد قلل من أعداد أكلات الأعشاب ، فأننا نتوقع أيضا أن تنخفض أعداد اللاحمات ، بسبب اختفاء غذائها .

أننا نعرف أن النمط النباتي قد تغير ، وأنه قد تغير بسرعة . والسؤال الذي يلزم أن نطرحه هو ما إذا كان هذا التغير قد تم سريعا بحيث يفكر كل هذا الانقراض العظيم الذي حدث في النهاية الأخيرة للعصر الطباشيري ، أن هذا يبدو بعيد الاحتمال . فحتى لو كان هذا التغير هو

السبب ، أو كان يشكل جزءا هاما من السبب ، فإنه يترك دون تحليل
اختفاء الأحياء البحرية التي لم تكن تعتمد على النباتات الأرضية .

ربما تكون تغيرات المناخ قد سهلت - ولو جزئيا - نجاح النباتات
المغطاة البذور . ولقد كان العصر الطباشيري عموما فترة أجواء
معتدلة . كان وجود الجليد - بفرض وجوده - أمرا غير شائع . لم تكن
ثمة قمم جليدية قطبية ، لم تكن ثمة أنهر جليدية . كان متوسط درجات
الحرارة في المناطق بين ٤٠ و ٥٠ درجة من خط الاستواء يزيد عن ١٠
درجات مئوية معظم هذا العصر . كانت نباتات جرينلاند والاسكا هي
النباتات النموذجية التي تربطها بالمناطق الباردة والتحت استوائية . كان
الجو في بدء العصر أبرد حقا ، ثم أن درجة الحرارة قد انخفضت عند
نهايته ، لكنها بالرغم من ذلك لم تنخفض أبدا عن الحرارة التي تعودنا
عليها اليوم . جاءت العصور الجليدية فيما بعد . ازدهرت الغابات
الكبرى ، ثم سقطت في المستنقعات ، وضغطت لتكون حقول الفحم . وهذا
يعني أن المناخ كان رطباً على العموم .

كانت الظروف إذن مثالية لظهور غطاء أخضر وافر للنماء ،
ولنجاح الحيوانات التي تتغذى عليه . كان المناخ المعتدل ملائماً على
وجه الخصوص للحيوانات متغيرة درجة الحرارة ، فالحرارة لا تنخفض
أبداً إلى الدرجة التي تتطلب تدابير خاصة لضمان البقاء - كالبيات
الشتوي أو الهجرة - وهي أن ارتفعت للحد الذي يضايق ، فثمة ظلال
كثيرة بين النباتات ، وثمة مياه وفيرة للاستحمام .

بعد أن ذكرنا هذا ، يصبح من الضروري أن نقيده ببعض من
الحرص . ذلك لأن فكرة «متوسط درجة الحرارة السنوي» قد تكون فكرة
مضللة . فثمة مكان بداخله لتباينات محلية هائلة ، ومن الممكن داخل هذا
التباين أن يتدهور المناخ في المناطق بعينها فجأة وبحدة في الوقت الذي
يكون فيه الأثر بسيطاً على المناخ ككل . وهناك من الأسباب ما يسمح لنا
بالفرض بحدوث مثل هذه الوقائع المحلية .

ما زالت القارات على العموم تحتل تقريبا نفس مواقعها على خطوط
العرض التي كانت عليها في العصر الطباشيري (كان التزحزح أساساً إلى
الشرق والغرب) . وكانت مساحة الأراضي الجافة في أوائل هذا العصر
أكبر منها الآن . ورويدا وريداً طغى البحر على الأرض فنقصت المساحة
الكليّة للأرض الجافة على نهاية العصر . ولقد أدى المناخ المعتدل الرطب
إلى تآكل الجبال التي تكونت في العصر الجوراي . وتكونت جبال
جديدة في بعض المناطق في أوائل الطباشيري بشمال أمريكا الغربي

وأوروبا واليابان ، وحدث ذلك أيضا ويشكل أكثر اثاره على نهاية العصر ، اثناء ثورة حركات تكوين الجبال قرب بداية الحقب الحديث (الميوزوي) تلك الثورة التي نتجت عن التحركات الكبيرة لقشرة الارض لتنتشأ عنها جبال روكى ، ولقد صحبها أيضا رفع عام للأرض بمناطق مختلفة وتكوين سلاسل جبلية أخرى . كان المحيط الأطلسى فى سبيله الى الانفتاح خلال العصر الطباشيرى وبذا كانت البحار فى سبيلها الى التغير أيضا ولعل أهم ما حدث فى نهاية هذا العصر هو انفتاح بحر طويل ضحل فى قلب أمريكا الشمالية يربط خليج المكسيك بالمحيط المتجمد الشمالى ، وكذا انفتاح ذراع بحرى ضحل امتد فى قلب إفريقيا ليربط بحر تيثيز (بقايا المحيط الذى كان ينصل يوما القارات الشمالية عن الجنوبية) بجنوب المحيط الأطلسى .

لأبد أن مثل هذه التغيرات قد أثرت فى المناخ محليا ببعض المناطق . ان التغير فى تيارات المحيط عندما انفتحت اذرع جديدة تربط بحارا كانت قبل منفصلة لابد أن يتسبب فى وصول تيارات باردة ودافئة الى مناطق لم تتعود عليها ، ولما كانت ملوحة البحار جميعا ليست واحدة ، فربما تغيرت الملوحة أيضا ، الشيء الذى قد يؤثر فى الكائنات البحرية . ان علماء المناخ - حتى فى أيامنا هذه - لا يستطيعون أن يحسبوا بدقة ويتفصيل الأثر الذى تسببه حرارة المحيطات على كتل الهواء ، وبالتالى على المناخ . لا أحد يشك فى وجود مثل هذا الأثر وفى أن له أهمية قصوى . اذا ما تغير توزيع الماء البارد والدافئ فلا بد أن يتبعه تغيرات فى المناخ - وان كان علينا أن نتذكر أن الفارق بين حرارة الماء الدافئ والبارد فى العصر الطباشيرى المعتدل الخالى من الجليد ، كان اقل منه اليوم .

يؤثر ظهور الجبال على المناخ بطرق ثلاث . فلأن تكوين الجبال يعنى رفع ارض فوق المستوى الذى كانت تشغله من قبل ، فانه يتسبب فى نشأة اوضاع جديدة . فالجبال نفسها ستؤثر فى حركة الكتل الهوائية ، لتخلق أماكن مستورة عن المطر ، على جوانبها المحجوبة عن الريح ، وظروفا أكثر رطوبة على جوانبها الأخرى . كما أن عملية بناء الجبال نفسها لابد أن يصحبها نشاط بركانى متزايد ، الشيء الذى ينتج عنه تطاير الغبار والجسيمات الصغيرة فى الغلاف الجوى ، مما قد يسبب خفضا فى الحرارة ، وان كان الأغلب أن يتسبب فى زيادة الحرارة . وربما كانت مثل هذه التغيرات هى السبب فى تدهور المناخ الذى وسسم الجزء الأخير من العصر الطباشيرى ، أو ربما ساهمت فى ذلك . ولقد رأينا أن هذا التدهور فى حد ذاته لم يكن خطيرا ، فالتدهور الحقيقى قد حدث بعد ذلك بفترة طويلة .

فى مناقشتنا لأثر التغير فى المناخ على الكائنات الحية ، لا يصح أن نغفل الأسباب المحتملة للتغير المناخى ذاته . فنحن لا نستطيع أن ندعى بالا علاقة لها بالموضوع ، ذلك انه من المحتمل أن تكون الواقعة الفجائية نفسها - والتي نفترضها كبديل معقول للتغير التدريجى الذى يؤدى الى الانقراض - أن تكون قد أحدثت تغيرا فى المناخ - فجائيا .

وليس تغيرات المناخ هى السبب الوحيد الممكن لتدهور الموطن ، فإذا ما كانت مساحات البحار قد ازدادت ، فلنا أن نفترض أن هذا قد تم بإغراق الأراضى الرطبة ، التى قد يكون معظمها مستنقعات . ومثل هذه العملية قد تحطم مواطن الكائنات التى تفضل العيش بالمستنقعات ، كما ستختفى مواطن أخرى بازدياد تعدى البحر على اليابسة .

هل أدى تحطيم الموطن الى الانقراض ؟ من المحتمل انه قد أدى فعلا الى بعض الانقراض ، فقد تقاسى الحيوانات التى تقضى جزءا من حياتها فى المياه الضحلة . لكن هذا لا يحدث الا اذا افترضنا أن تعدى البحر كان مفاجئا ، وأنه وصل بسرعة الى أراض شديدة الانحدار ، بحيث تختفى المياه الضحلة تماما ، ولا تتمرك تدريجيا من موقع الى آخر . ربما حدث مثل هذا التحطيم السريع فى بعض المواقع ، لكن الأغلب انه كان تدريجيا فى معظم المناطق .

حدث رفع الأرض - هو الآخر - تدريجيا . ونحن نعرف ذلك من خبرتنا . فجبال أواسط آسيا - كجبال كاراكورام - ما تزال تدفع الى أعلى ، لتضم الأراضى الى جنوبها الى كتلة الأراضى الآسيوية الرئيسية . وعملية بناء الجبال هذه مستمرة منذ ملايين السنين . وقد يكون هذا أمرا فجائيا بالمصطلحات الجيولوجية ، ولكنه بمصطلحات الكائنات الحية أمر تدريجى ، أبداً من أن يلاحظ . كيف تستجيب الحيوانات طبيعيا للتدهور البطيء فى ظروف حياتها ؟ بالهجرة ، بحثا عن ظروف أفضل فى مواقع أخرى . ومثل هذه الهجرة - بالطبع - ليست بحثا متعمدا ، إذ تنحو الأفراد ومجاميع الأفراد الى التركز فى أفضل المناطق المجاورة ظروفًا ، لتوسع من مواقعها حيث تسمح الظروف . انها لا تنقرض الا اذا اختلت منطقة الموطن ولم تجد فى جوارها مكانا ملائما . أن المفتاح يكمن فى المعدل الذى تتغير به البيئة .

وحتى هذا ، يصعب علينا منه أن نتخيل العملية قادرة على أحداث الانقراض فى مجموعة كاملة من الأنواع . أن تحطيم موطن معين قد يزيل الأنواع التى تعيش به ، فإذا لم نفترض أن هذه الأنواع محصورة تماما داخل هذه المنطقة الجغرافية وحدها ، فسيستمر بقاؤها فى مواطن

أخرى بمواقع أخرى من العالم . قد نتصور مثلاً أن تجفيف الأراضي الساحلية المبتلة في ماليزيا سيحطم غابات المنجروف ، وبالتالي ستفقد الأنواع التي تعتمد على ظروف هذه الغابات . فهل الآلية التي ستجفف هذه الأراضي المبتلة ستجفف أيضاً الأراضي الساحلية المبتلة في كل آسيا الاستوائية ؟ هل ستجفف الأراضي الساحلية المبتلة التي تهيء ظروفاً مشابهة في أفريقيا الاستوائية وأمريكا الاستوائية ؟ إذا كان لأشجار ابن سينا (المنجروفية) أن تندثر فلا بد أن تعمل العوامل المسببة لانقراضها على مستوى الكرة الأرضية لتعطى نفس النتائج في كل مكان . إن أكبر تغير نعرفه في المناخ – غير العصر الطباشيري ، طبعاً – هو التحولات الرئيسية إلى الجليد ، ولكن ، حتى هذه لم تسبب ذلك . لقد قضت على أنواع عديدة من مناطق شاسعة على خطوط العرض العليا ، لكن هذه الأنواع استمرت باقية ، بالرغم من صغر عددها ، على خطوط عرض أدنى ، لتعود وتستعمر مناطقها الأصلية عندما تراجع الجليد .

غير أن التغير السريع محتمل . ولقد رأينا أن ثمة تغيراً سريعاً يحدث في وقتنا الحالي – أساساً نتيجة للنشاط البشري ، بمعدل سيعتبره بعض علماء الحفريات في المستقبل معدلاً فورياً . وسيكتشف الحفري أيضاً التغيرات البيئية الهائلة التي سببت الانقراض . أما في حالة الانقراضات التي حدثت بالعصر الطباشيري فسنواجه بأدلة هي على أفضل الحالات غامضة . ربما كان هناك انقراض بسبب التناقضات . والمؤكد أن قد حدثت تغيرات بيئية . المؤكد أن المناخ قد تغير ، حتى ولو كان التغير ضئيلاً على مستوى الكرة الأرضية . لكننا بعد ما نجد التبريرات المعقولة للانقراضات التي حدثت على طول العصر الطباشيري، سيظل الانقراض الفجائي باقياً أمامنا دونما تبرير .

على أننا في النهاية لابد أن نعالج احتمال حدوث تغير بيئي ضخم كان سريعاً وقصيراً – ربما اصطحب معه تغيرات مناخية . دعنا نفترض مثلاً أن شدة الإشعاع الشمسي الذي يتلقاه سطح الأرض قد انخفض فجأة قليلاً ، لمدة عشر سنين أو حتى أقل . سينتج عن هذا انخفاض هائل في السمثيل الضوئي ، ونحن نعرف أن الانخفاض الطفيف في درجة الحرارة الذي حدث في نصف الكرة الشمالي بين الأريمنات والسيتينات من هذا القرن قد قلل نحو عشرة أيام من طول موسم نمو نباتات الحاصل على خطوط العرض العليا . فإذا ما افترضنا ظلماً أطول كثيراً ، فإننا نتوقع أن يتزايد الأثر بالتناسب . سيموت الكثير من النباتات لقلة الطاقة .

فإذا استمر الاظلام فترة كافية ، فستموت البذور الساقطة على الأرض •
قد تنقرض نباتات • ويكاد يكون من المؤكد أن العواشب الكبيرة – التي
تحيا على هذه النباتات – ستقاسى ، ومن خلال هذه الحيوانات ستقاسى
بدورها اللواحم •

لكن هذا الجدل يخلق لنا صعوبة طفيفة هنا • ان مغطاة البذور
الحديثة توجد على طول العالم وعرضه ، ولكن عاريات البذور الباقية
تتعرض أكثر ما تتعرض فى الغابات الصنوبرية بخطوط العرض العالية،
حيث الشتاء طويل وبارد • وفى اثناء عصور التلج رسخت الغابات
الصنوبرية على خطوط العرض الدنيا ، لتمتد أحيانا حتى المناطق
الاستوائية • ولذا فريما توقعنا أن نرى انخفاض واضح فى شدة ضوء
الشمس سيؤدى الى محابة عاريات البذور • غير أن مغطاة البذور هى
التي بقيت • أضف الى ذلك أنه إذا ما كانت حيوانات العصر الطباشيرى
مكيفة أساسا لكل النباتات عارية البذور – ولا بد وأن كانت كذلك – فإن
عودة تلك النباتات نفسها سيكون فى صالح الحيوانات • كان المفروض
أن تنقرض الثدييات !

ربما استطعنا أن ننقذ أنفسنا من هذه الورطة • لو أن انخفاض
شدة ضوء الشمس كان هائلا فعلا ولكنه كان قصيرا ، إذن لتمكنت بذور
مغطاة البذور من البقاء حية لتثبت عندما يتحسن الجو ، بينما لا تجد
بذور العاريات أى ميزة ، لأن هذه الظروف المؤقتة ستكون مستحيلة تماما
بالنسبة لنمو النباتات •

لكننا مع هذا نفترض آلية عن طريقها تنتثر فى الغلاف الجوى كميات
هائلة من الجسيمات • اننا نفترض فى الحقيقة وقوع حادثة رهيبه كانت
لها آثار الكارثة • لقد هجرنا النظرية التدريجية •

ان نظريات التدرجيين المرتكزة على تغيرات المناخ وما يتبعها من
اضطراب ايكولوجى تنهار فى النهاية امام حقيقة أن العصر الطباشيرى
كان خاليا من التلج • من الجائز أن يكون المناخ قد تدهور ، لكن التدهور
الحقيقى الخطير لابد أن يتضمن تحول مقادير ضخمة من الماء من الحالة
السائلة الى الحالة الجامدة : من السائل الى الثلج • وهذه ظاهرة لها
قوة استرجاعية ايجابية • تعكس الثلج ضوء الشمس ، فلها إذن اثر
مبرد ، يؤدى الى زيادة كمية ما يتكثف ويسقط كتلج ، وهذا بدوره يزيد
من المساحات التى تعكس أشعة الشمس ، فتتسارع بذلك العملية • اننا
نعرف الكثير عن آثار التلج الحديثة • فإذا كان ثمة اثر للمناخ يؤدى
الى الانقراض فلا بد أن يعود الى هذه التلجات لأنها أكثر التغيرات المناخية
الطبيعية اثرا وسرعة • والحقيقة أن عدد الأنواع التى انقرضت كان

محدودا جدا ، بالرغم من أن الكثير قد دفع بعيدا عن المناطق التي يحيا بها ، من موت أعداد كبيرة من الأفراد ، لأن المناخ الدافئ كان مقصورا على خطوط العرض الصغرى • فإذا لم نفترض بأن الثلج قد مضى ليصل حتى خط الاستواء ، فستوفر المناطق الاستوائية مواطننا تكفى لايواء عشائر من معظم الأنواع ، فإذا ما تحسنت الظروف مرة أخرى فيما بعد ، فستعمل هذه العشائر كنوايا للتكاثر ، تنتشر لتستعمر مواطن جديدة •

يبدو إذن أنه بينما نستطيع أن نعزو الكثير من الانقراضات التي حدثت خلال العصر الطباشيري الى أسباب تدريجية ، إلا أن مثل هذه الأسباب لا يمكنها أن تفسر على نحو مرض كل ما حدث من انقراضات ، وعلى وجه الخصوص فهي لا تستطيع أن تفسر الانقراضات الجماعية التي حدثت في نهاية العصر وتحدده – وتذكر أنها لم تكن مجرد انقراض للزواحف وإنما انقراض كثير من الأنواع •

وأخيرا فإن التفسيرات التدريجية تعجز عن تبرير الشذوذ الكيماوي في صلصال التخوم • والحقيقة أنه لا يلزمها أن تبرره ، لأنه إذا ما ثبتت صحة التفسير التدريجي ، فمن الممكن أن نفترض آلية تبرر ترسيب المواد بكميات وفيرة ، من مصدر من خارج الأرض لم يسبب أية كارثة • لو أن جسما تحلل مثلا في المناطق العليا من الغلاف الجوي الأعلى ، فريما كان في مقدوره أن يضع الكمية المطلوبة من المادة في الغلاف الجوي لتسقط – ربما بسرعة – وتكون طبقة متميزة على سطح الأرض ، وتغوص في البحار لتكون طبقة متميزة مشابهة في رسابة قاع البحر •

ثمة حلقة واحدة أخيرة – مدمرة ، يصعب على جدل التدريجين أن يبررونها • إذا ما انقرض نوع فإنا نتوقع إما أن تختفي تماما المناطق التي كان يحيا بها، فلا تحتلها أنواع أخرى، أو أن يحدث فراغ إيكولوجي، يمتلئ بزيادة الأنواع الموجودة أو بأنواع جديدة التكوين • ولقد تكونت أنواع جديدة حلت محل القديمة في حالة الانقراضات التي حدثت بالعصر الطباشيري • ولابد أن يتوازى معدل الاستبدال – تقريبا – مع معدل اختفاء الأنواع القديمة • ولقد نفترض بأن الوضع قد مضى هكذا في نهاية العصر الطباشيري وبداية الحقب الثالث • لكن ما نلاحظه عند فحص الشواهد هو تدهور سريع في أعداد الأنواع عند النهاية الأخيرة للعصر الطباشيري ، يتلوها تزايد له نفس السرعة في عدد الأنواع الجديدة في مطلع الحقب الثالث •

أن هذا يقترح بقوة أن الانقراضات الطباشيرية كانت هائلة ، فجائية، سببتها حادثة عارضة وقعت ، أعادت المناطق التي فرغتها من الكائنات لتمتلئ ثانية • إننا نتفحص في الحقيقة نتائج كارثة •

الفصل الرابع

السحب والمذنبات والنيازك

هل خدعنا انفسنا ؟ هل من الممكن أن يكون انقراض كل هذه الأعداد الغفيرة من الأنواع بـنهاية العصر الطباشيري قد حدث نتيجة عملية تدريجية ؟ لا يجب أن نخطئ فنفترض أن الأسباب التدريجية لا تستطيع أن تنتج آثارا فجائية ، فالحقيقة أن في مقدور دارسي نظرية الكارثة أن يقدموا المثال تلو الآخر يثبتون به عكس هذا •

يمكن أن نلخص كل أمثلتهم – بطريقة غير علمية على الإطلاق – بقصة القشة التي قصمت ظهر البعير • لعلك تتذكر القصة ، كان الحيوان الصبور محملا بأثقال فوق الأقال – وكان الحمل يتزايد تدريجيا بمقادير ضئيلة ، إلى أن وصلنا مرحلة كانت إضافة قشة واحدة – ووزنها أقل من أي مما حزم فوقه – كافية كي تقصم الظهر • لم تتغير العملية التدريجية، لم تتغير شدتها ، ورغم ذلك فقد تسببت بعسد مرحلة معينة في كارثة مفاجئة • ربما كان هذا المثال خياليا ، لكن العالم من حولنا يقدم من الأمثلة الكثير مما هو ليس كذلك • أن انهيار جسر نتيجة إجهاد تحمله صابرا سنين طويلة لا يختلف عن انهيار الجمل التعميس • أن هذا يمكن أن يحدث • بل أنه يحدث •

هل حدث هذا على نهاية العصر الطباشيري ؟ اننا لا نعتقد ذلك • اننا نعتقد أن الآثار الفجائية قد نجم عن مسبب فجائي • أما سبب اعتقادنا هذا فلا يرجع إلى أننا لا نحب أن نعزو الآثار الفجائية للأسباب التدريجية، وانما لأننا لا نجد آلية تدريجية يمكن أن تكون فعالة في ذلك الوقت وتكفي كي تبرر النتيجة تبريرا معقولا • ربما لم يكن هذا وحده سببا كافيا لاقتناعنا – فنحن على أية حال لا نستطيع أن نعرف كل ما كان يحدث في العالم منذ ملايين عديدة من السنين • أن الذي دفعنا إلى أن نهمل النظرية التدريجية في النهاية هو أن الأسباب الفجائية تبدو أكثر معقولة •

لا ولا نحن نفترض أن الجميع يشاركوننا هذا الاقتناع ، بل وليس هناك حتى إجماع عام بين الحفريين على حدوث عدد كبير من الانقراضات على نهاية العصر الطباشيري . ثمة اضافات يلزم أن نذكرها عن شواهد الأحافير .

يصر بعض الحفريين على أن الشواهد على الانقراض الفجائي هي مجرد شواهد عرضية واهية . ولقد لخص هذه النظرة توماس ج ٢٠٠ شريف (سنة ١٩٨٠) وهو واحد من كبار الثقة في هذا الموضوع ، كما يعرضاها ج ٢٠٠ دافيد أرشيبولد (سنة ١٩٨١) . هم يقولون أن الحيوانات البحرية التي تأثرت كانت هي تلك التي تعيش في المياه العليا ، قريبا من السطح ، وأن الانقراض كان أقسى ما يكون في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية ، مقارنة بالمناطق المعتدلة . وهذا يشير إلى أن الأنواع البحرية قد تطلعت بسبب تغير ضخم في المياه السطحية في تلك المناطق . ولقد كان الكثير من هذه الأنواع - كالامونايت - يتدهور منذ فترة ، وبذا تصبح حقيقة حدوث الانقراض في العصر الطباشيري الحديث - وليس في طبقات الحقب الثالث القديم - تصبح ولا علاقة لها بالموضوع : فلا بد وأنها كانت ستقترض في نهاية الأمر . وعلى أية حال فإن حقيقة عدم عثورنا على أية أحافير للامونايت بعد العصر الطباشيري لا تثبت عدم وجودها بعد نهايته منذ ٦٥ مليون سنة مضت ، فريما لم تحفظ بقاها ، وربما حفظت في صخور لم نفحصها بعد . صحيح بالطبع أن غياب الامونايت في طبقات الحقب الثالث لا تثبت أنها لم تحيا بعد العصر الطباشيري ، إلا أنها لا تثبت أيضا أنها قد عاشت بعده .

أما بالنسبة للزواحف الأرضية فالمعتقد أن الانقراضات كانت قاصرة على مناطق النهر وسهول الفيضان ، قريبا من النهر الضحل الذي كان يقسم شمال أمريكا ، إذ يفترض أن مستوى النهر قد انخفض نحو مائة متر ، الشيء الذي تسبب في تجفيف المواطن المبتلة لمحدث تغيرات واسعة - وأن كانت محلية في المجتمعات النباتية (الفلورة) ، ولجعل المناخ موسميا بشكل أوضح . فيجتمع هذا كله ضد الحيوانات الضخمة التي تحتاج مساحات شاسعة من الأرض كيما تقيم حياة عشيرة تكاثرها . وعلى هذا ، فمن هنا نتعامل مع لا شيء أكثر من اندثار عشرين نوعا أو نحو ذلك ، كانت على أية حال حييسة منطقة يعيشها .

لكن جدل التدرجيين يعجز عن الاقتناع . أن التغير الكبير في المستويات العليا من البحار الاستوائية وشبه الاستوائية يحتاج إلى تبرير . والواضح أن هذا التغير قد حدث فجأة . والحق أنه يتوافق جيدا مع

الأثر الذى نتوقعه من زيادة فجائية فى شدة الاشعاع المؤين أو الفوق بنفسجى (الاشعاع المؤين اشعاع كهرومغناطيسى - يشبه الضوء أو الحرارة - به من الطاقة ما يكفى لاقلاق تركيب الذرات فتتقد أو تكتسب بعض الالكترونات ، لتكتسب بذلك شحنة موجبة أو سالبة ، وهذا يسرع من تفاعل الذرات مع بعضها ، وقد يثلف كيميائ الخلايا الحية) • هذا الاشعاع قد يحطم اذن البلاكتون النباتى أو الفيتوبلانكتون (النباتات المعلقة فى الماء) التى تعيش قرب السطح - وربما معها أيضا الكثير من البلاكتونات (النباتات والحيوانات الصغيرة التى تعيش بالطبقات العليا من البحار والبحيرات) • وكل ما يقتل البلاكتون النباتى على نطاق واسع سيظهر صداه خلال شبكة الغذاء المائى كله ، وسيحدث الصدى بسرعة رهيبه حقا •

والبلاكتون النباتى على أية حال هو النباتات الخضراء التى تحيا بالماء ، وتتغذى عليها العواشب ، لتغذى بدورها للواعم من كل صنف فى مجموعة من العلاقات هى أكثر نشاطا فى البحر عنها فى أى مكان على اليابسة • وتكتمل الشبكة بأنواع أعماق المحيط التى تحيا نحت المستوى الذى ينفذ اليه الضوء • وشبكات غذائها تعتمد على ما يصل فى صورة مواد تتدفق من طبقات الماء العليا • ثمة آثار موازية قد تحدث بين الأنواع التى تعيش على اليابسة •

إننا نتوقع آثارا جانبية لأية واقعة تكون نتائجها من العنف بحيث تؤدي الى انقراض الكثير من الأنواع • من بين هذه الآثار الجانبية هناك التغير فى التوازن بين الاكسيجين وثانى اكسيد الكربون فى الجو • لو أن موت البلاكتون النباتى قد صاحبه موت الكائنات الدقيقة التى تحلل المادة العضوية بالاكسدة ، أو لو أن هذه الكائنات قد نجت فى بادئ الامر ثم غمرها حجم المواد التى تواجهها فتزايدت أعدادها حتى لتصبح المياه التى تحيا بها وقد نضب منها الاكسيجين ، اذن لمكانت النتيجة هى أن ينفن الكربون لتتزايد نتيجة لذلك كمية الاكسيجين فى الهواء • سيكون لهذا آثاره على المناخ ، كما رأينا •

علينا ألا ننسى أبدا أننا سنجد فى بحثنا عن حلول لحوادث تؤثر فى النباتات والحيوانات عديدة الخلايا ، أن الكائنات وحيدة الخلية هى - فى التحليل الأخير - من ينظم البيئة • هى قد لا تترك سجلات خلفها ، لكن هذا لا يقلل من أهميتها ، أما الآثار التى يمكن ملاحظتها فقد تكون ناتجة عن تغيرات بين العشائر الدقيقة نجمت عن أسباب قديمة فإتينا أن نلاحظها •

لو أن الزواحف الكبيرة عاشت وانقرضت فقط فى جزء من شمال أمريكا ، إذن لمضد جدل التدرجيين • لكن ، هل هذا صحيح ؟ يقول «س • رومر فى كتابه « علم حفريات الفقاريات » سنة ١٩٦٦ (الذى يعتبر المرجع الرئيسى فى هذا الموضوع) يقول انه من بين الكارنوصورات التى عثر على بقاياها فى طبقات العصر الطباشيرى الحديث هناك أجناس عديدة عثر عليها فى شمال أفريقيا وفى شرق آسيا وجنوبها وجنوب أمريكا • والكثير من هذه الأجناس قد عثر عليه أيضا فى شمال أمريكا • لكن ليس ثمة من سبب يدعونا للمفرض بأن وجودها كان يقتصر على هذه القارة • ولا يحتاج الأمر منا أن نفحص مجاميع أخرى من الزواحف ، لأن وجود الكثير من اللواحم الرئيسية انما يعنى وجود العواشب التى عليها تتغذى •

علينا أن نتفحص مختلف الأسباب المحتملة لواقعة فجائية • ثمة أسباب عديدة ، لكل منها - فى الأوقات المختلفة - حوادث ملازمة • وكلها يتطلب تدخلًا من خارج الأرض ، الا واحدا قد يبدو أنه لا يتطلب مثل هذا التدخل • وسنفحص هذا أولا •

من المعتقد أن اللب الداخلى للأرض يتكون من حديد مصمت مع بعض النيكل ، أما اللب الخارجى الذى يغلفه فهو مكون أساسا من الحديد • واللب الخارجى أقل كثافة من الداخلى ويعتقد أنه مصهور - وأن كان الفارق بين الكثافتين أكبر من أن يعزى الى مجرد الاختلاف بين كثافتى المعدن المصهور والمصمت • تتسبب الحرارة المولدة داخل اللب فى تحركات معقدة للحمل الحرارى باللب الخارجى ، يغذيها دوران الأرض • كما تسبب مباشرة الأرض تحركات دوارة فى اللب الخارجى • وإذا ما كانت الأسباب معقدة فإن التحركات - التى لا نستطيع أن نلاحظها ملاحظة مباشرة - ستكون بالطبع أكثر تعقيدا - وإن كنا نعرف آثارها • من المعتقد أن اللب الداخلى والخارجى سويا يكونان نوعا من الدينامو الذاتى التشطيط ، ينتج مجالًا مغنطيسيا • لكن الأرض ليست مغنطيسيا مستديما ، وهى لا يمكن أن تكون كذلك ، لأن الحرارة داخل اللب تتعدى نقطة كورى - وهى درجة الحرارة التى يفقد عندها المعدن خصائصه المغنطيسية • والمجال المغنطيسى الذى تصدئه يتباين كثيرا فى الشدة والاتجاه على المدى الزمنى الطويل • كما أن شدته على السطح تختلف من مكان الى آخر •

عندما تصل الى السطح مادة الوشاح (وهى المنطقة تحت قشرة الأرض) وتتصلب لتكوين الصخور النارية ، فإنها تسجل اتجاه المجال المغنطيسى للأرض عند التصلب • فالحرارة فى باطن الوشاح تحفظ على

درجة أعلى بكثير من نقطة كوري الخاصة بها - وهذه في حالة الصخر المغنطيسي منخفضة فعلا . فإذا ما وصلت سطح الأرض بردت وتصلبت ، ويتقدم تبريد الصخر الصلب تصل الحرارة الى نقطة كوري فتصف الذرات نفسها داخل الصخر تبعاً للمجال المغنطيسي الذي تجسد نفسها فيه . وبازدياد برودة الصخر تفقد الذرات بالتدريج حرية الحركة ليحتفظ الصخر في النهاية بترتيب الذرات داخله ، مسجلاً بذلك اتجاه المجال المغنطيسي وقت التبريد . ومن الممكن تحديد هذا الترتيب بفحص الصخور، اذا وضعنا في الاعتبار تحركات القشرة التي قد تغير من المواقع الأصلية التي كانت بها الصخور عندما بردت .

من سنين قليلة مضت كان الجيولوجيون يفحصون الصخور في وسط الاطلنطي ليدرسوا الطريقة التي يتسع بها قاع البحر ، فاكتشفوا أن الترتيب المغنطيسي داخل الصخور يختلف باختلاف بعدها عن الحيد المرجزي ، ثم توصلوا الى أن قطبية المجال المغنطيسي للأرض كانت تنقلب على فترات غير منتظمة في تاريخ الأرض : فيصبح الشمال المغنطيسي جنوباً والجنوب شمالاً . في مقدورنا أن نحدد عمر الصخر بالراديو متر (اندي يقيس نسبة عناصر مشعة معينة الى ما تتول الىه - عند الاضمحلال - من عناصر) وبذا أصبح من الممكن أن نعرف تاريخ الانقلابات في المجال المغنطيسي . والانقلابات نفسها ليست فورية - فالمغنطيس لا « يتشعل » - ولكنها تتم بسرعة كبيرة ، خلال فترة تبلغ ألف سنة أو الفين .

لكن معظم الأبحاث المفصلة على انقلاب المجال المغنطيسي قد تمت باستخدام عينات من صخور عمرها أقل من ٦٥ مليون سنة ، وبذا فهي لا تخدمنا كثيراً . غير أنه قد أمكن كشف صورة عامة لتاريخ الأرض المغنطيسي تشير الى أن هذه الانقلابات تحدث دائماً في دفعات ، إذ يحدث البعض منها على فترات بينية قصيرة (جيولوجيا) ، ثم يمر وقت طويل دونما انقلاب . والمعتقد أن أواخر العصر الطباشيري كانت فترة انقلابات، لكن فحص صلصال التخوم وصخورها - على كلا الجانبين - يشير الى عدم حدوث انقلاب على نهاية العصر الطباشيري بالتحديد .

ما هي النتائج على سطح الأرض التي قد يؤدي اليها انقلاب المجال المغنطيسي ؟ يتلشى المجال المغنطيسي تماماً أثناء حدوث الانقلاب ، والمفترض أن يتم هذا التلشى بسرعة ليقيم نفسه مرة ثانية بسرعة . يفترض البعض أن المجال المغنطيسي يشكل حاجزاً يحمي سطح الأرض من وابل يسقط عليها من الجسيمات الكونية المشحونة - من الرياح الشمسية - وأنه في غياب هذا المجال قد يصبح هذا الواابل كثيفاً .

غير أن الحقيقة هي أن أثر المجال المغنطيسي - الذي يمتد بعيدا في الفضاء ليشكل المغنيطوسفير - أثر أكثر تعقيدا ، كما أن معظم الوقاية من الرياح الشمسية إنما تأتي من الغلاف الجوي العاصي الذي يوجد بعيدا تحت المغنيطوسفير ، وليس عن المغنيطوسفير نفسه . وسواء انحرف الجسم المشحون بسبب المجال المغنطيسي أو لم ينحرف ، فإنه من الضروري كى يصل إلى سطح الأرض أن يكون منطلقا بسرعة رهيبية للغاية . ولابد قبل أن يصل سطح الأرض أن يصطدم بالكثير من جزيئات الغاز ، مرتدا من واحد منها الآخر ، حتى لو كان منطلقا بسرعة أكثر تواضعا ، ليفقد قدرته على إتلاف الخلايا الحية . وعلى هذا يبدو أن فقدان المجال المغنطيسي لن يكون له إلا أثر معاكس ضعيف على كوكب يغلفه غلاف جوى (لن يكون الأمر كذلك بالنسبة لكوكب بلا غلاف جوى) .

اقترح مرة أن من بين آثار فقد المجال المغنطيسي استنزاف طبقة الأوزون في المناطق العليا من الغلاف الجوي ، إذ أن هذا يسمح بزيادة تشعيع سطح الأرض بالأشعاع فوق البنفسجي . والأشعاع فوق البنفسجي - الموجود على النهاية ذات التردد العالي من الطيف - أشعاع خطر بالنسبة للحياة لأنه يتلف الخلايا الحية . لكن معظم العلماء قد تخلوا عن هذه الفكرة لسببين .

أولهما : أنه بتحسّن تفهمنا لكيمياء الستراتوسفير (الطبقة العليا من الغلاف الجوي) أصبح من الواضح أن وهج الانفجارات الشمسية ليس له إلا أثر ضعيف على التفاعلات التي تتضمن تكوين وتحطيم الأوزون .

وثانيهما : أن الآثار البيولوجية للأشعاع فوق البنفسجي قد بولغ فيها كثيرا . فنحن نعتقد مثلا أن الكائنات الحية في التاريخ المبكر للأرض، قبل أن يثرى غلافها الجوي بالأكسجين - أي قبل أن تتكون طبقة الأوزون بنفعا لتتضمن الأكسجين - كانت تستعمر أجزاء من سطح الأرض ، كما كانت الحياة وفيرة في الطبقات العليا من مياه البحر . أن قدرة الأشعاع فوق البنفسجي على الاختراق ضعيفة ، خصوصا في الماء ، ولكن يبدو أنها لم تسبب أي اطلاق كبير للكائنات وحيدة الخلية التي كانت تعيش آنذ في مناطق لا بد وأنها كانت معرضة لها ، وأن ثمة مركبات معينة - كانت موجودة بوفرة في ماء البحر - كانت تمتص هذه الأشعاعات بكفاءة .

إذا كان في استطاعة الكائنات الحية أن تحمي نفسها من الآثار الضارة للأشعاع فوق البنفسجي ، أفلا يمكن أن يكون هذا الأشعاع برغم ذلك مؤذيا للنباتات والحيوانات عديدة الخلايا ؟ أفلا يمكن مثلا أن يخفض

من انتاجية البلانكتون النباتى البحرى أو النباتات على اليابسة؟ بصراحة، نحن لا نعرف ، ولكن ذلك محتمل . فبالرغم من وجود « حدود امان » للكائنات الحية تسمح لها بتحمل تغيرات البيئة التى تتجاوز المقادير الصغيرة من التقلبات المألوفة ، فليس هناك من سبب يدعونا للفرض بانها تستطيع تحمل التغيرات الضخمة التى لم يسبق أن تعرضت لمثلها اثناء خبرتها التطورية . وعلى هذا فان الزيادة الطفيفة فى شدة الأشعة فوق البنفسجية قد لا تسبب ضررا خطيرا ، كما أن زيادة اكبر قد تسبب ايضا اذى محدودا اذا ما استمرت فترة قصيرة جدا من الزمن ، لكن زيادة كبيرة طويلة المدى قد تكون مدمرة حقا . واذًا ما حدث مثل هذا الدمار فى النباتات ، فأننا لا نحتاج الى الاهتمام بالآثر المباشر لتعرض الحيوانات للأشعاع ، فحتى لو نجت من الأثر المباشر فلن يمكنها تجنب نتائج تغير كبير فى قدر الغذاء المتاح .

ونحن نقلل من أهمية هذا الخطر لا بسبب أنه ليس ثمة ظروف يكون فيها الإشعاع فوق البنفسجى ضارا ، وانما اساسا لاقتناعنا بأن الآلية التى يفترض أن تصل بها الأشعة الى سطح الأرض ليست مقبولة : فهذه الآلية لا تتوافق مع الطريقة التى تعمل بها تفاعلات الاستراتفير كما نفهمها الآن .

على أنه يلزم أن نخفف من هذه الجملة ، ذلك أنه بالرغم من أنها معقولة طالما افترضنا أن المصدر الأصلى للأشعة فوق البنفسجية هو الشمس ، الا أن الصورة تتبدل اذا لم تكن الشمس هى المصدر الوحيد . ان واحدا من انفجارات السوبرنوفا على مقربة من مجرتنا ، مثلا ، يمكنه أن يفرق الأرض بمقادير من الإشعاع ، تغمر كل آليات الحماية على كل المستويات .

هل من المحتمل أن يكون انقلاب المجال المغنطيسى مرتبطا بتغير فى المناخ ؟ هذا محتمل . فى سنة ١٩٧٨ اكتشف عالم بجامعة اريزونا علاقة عكسية بين شدة مجال الأرض المغنطيسى وكمية كربون ١٤ فى الغلاف الجوى ، وهذا يعنى زيادة فى الإشعاع الشمسى لأن الكربون ١٤ يتكون فى الجو بسبب القذف الاشعاعى للنيتروجين . وفى نفس الوقت تقريبا وجد عالم آخر - فى مرصد لامونت - دوهيرتى الجيولوجى - أدلة تقول ان لشدة المجال المغنطيسى علاقة عكسية مع درجة الحرارة : فكلما ضعف المجال كان الجو أدفا ، وليس هناك بالطبع من يقترح وجود علاقة سببية بين الظاهرتين . كان المناخ يتدهور فى نهاية العصر الطباشيرى ، هكذا تقول وجهة النظر المقبولة الآن ، صحيح أننا لا نستبعد احتمال حدوث فترة قصيرة يتحسن فيها المناخ - وفترة تبلغ ألف سنة أو ألفين تعتبر قصيرة

بالمقياس الجيولوجى الزمنى - غير أنه من الصعب أن يكون هذا سببا لانقراض عدد كبير من الأنواع .

إننا لا نستطيع أن نقبل انقلاب المجال المغنطيسى فى حد ذاته سببا فى الانقراض . لكن مثل هذا الانقلاب ربما كان قد حدث فى ذلك الوقت، وبذا ترتبط الواقعتان . ربما كانت ثمة حادثة سببت الانقراض ومعهما انقلاب المجال المغنطيسى .

أية حادثة يمكنها أن تفعل هذا ؟ اقترح أن قطبية المجال المغنطيسى قد تنقلب إذا ما اصطدم جسم ضخم (نيزك مثلا) بسطح الأرض مسببا اضطرابا هائلا فى لب الأرض . أن هذا أمر معقول يتوافق مع الصورة التى نراها ، لأن صدمة مثل هذه هائلة تسبب مثل هذا الاضطراب ، ستكون لها بلا شك آثار رهيبية للغاية على السطح !

دعنا ننحى الآن جانبا هذه الصدمة الهائلة ، لأن هناك آليتين يمكن من طريقهما أن ينقلب المجال المغنطيسى ، واحدة منهما تتضمن جسما سماويا ، وإنما قبل الاصطدام . دعنا نفترض أن جسما ضخما سيدخل الغلاف الجوى بسرعة رهيبية جدا وهو يلف بسرعة شديدة جدا . هذا أمر ليس مستحيلا - فلا يجب أن نفترض أن الكواكب وحدها هى التى تدور حول محاورها ! عندما يلاقى هذا الجسم الهواء فإنه يؤين ذرات الغازات التى يرتطم بها ، بينما تؤين هذه ، الذرات على سطحه ، وبذا يصبح الجسم وقد غلفته سحابة تلف من الجسيمات المتأينة : سحابة بلازمية . تعمل هذه السحابة كدينامو فائق تغطى مجالا مغنطيسيا قويا جدا - وأن كان قصير العمر ، فهو لا يبقى بعد الارتطام . ومن المحتمل جدا أن تتسبب هذه الصدمة المغنطيسية العنيفة فى تغير مجال الأرض المغنطيسى ، وربما أيضا فى تغيير القطبية .

وانفجار سوبرنوفا فى جوار الأرض يسبب هو الآخر صدمة مغنطيسية هائلة تمزق مجال الأرض المغنطيسى ، ويمكن أن تقلبه .

نخلص من هذا إذن الى أنه بالرغم من عدم وجود أدلة فى الوقت الحاضر تقودنا الى الاعتقاد بأن مجال الأرض المغنطيسى قد عكس قطبيته منذ ٦٥ مليون سنة ، فإن هذا الاحتمال لا يمكن رفضه . ليس هناك من سبب يدعونا للاعتقاد بأن الانقلاب فى حد ذاته سيسبب آثارا مؤذية ، أو أنه سيتسبب فى أى انقراض . والحقيقة أنه ربما يكون قد اصطحب معه تحسنا مؤقتا فى المناخ ، لكن ، بينما يصعب أن يؤدى الانقلاب الى أية آثار بيولوجية خطيرة ، فإن سببه قد يقود الى هذا ، لأن هذا السبب قد يكون هو مرور جسم ضخم - فى الغلاف الجوى - يتحرك بسرعة رهيبية،

أو هو انفجار لسوبرنوبا على مقربة • ها نحن ذا نتجه ثانية الى اقتحام
من خارج الأرض •

ماذا يا ترى يكون السبب في مثل هذا الاقتحام ؟ ومم يتركب ؟ ربما
كان اقرب المشتبه فيهم : سحابة غبار ، أو انفجار سوبرنوبا ، أو تمارس
قريب من جسم ضخم ، أو اصطدام •

رأينا فيما سبق أنه من الممكن أن تسبب سحابة الغبار أثارا على
سطح الأرض ، غير أن السحابة المطلوبة ، التي ترسب طبقة من المعادن
النيبينية فوق معظم سطح الأرض ، لابد أن تكون ذات مواصفات خاصة ،
اذ يلزم أن يكون لها حجم معين وكثافة معينة • وليس هناك بمجرتنا في
المنطقة من حولنا سحابة تفي بالمواصفات المطلوبة • قد لا يكون هذا مهما •
فربما تحركت السحابة بعيدا بعد وقوع الحادثة واختفت الآن بعيدا عنا •
ان النظام الشمسى يتحرك داخل المجرة • فهل لا تزال السحابة القديمة
نتتظرنا في موقع ما بعيد ، ليتجدد لقاءنا بها مرة أخرى فيما بعد ؟ أم
يا ترى قد تسببت ملاقاتها بالأرض في استنزاف مادتها لتصبح اصغر مما
كانته وأكثر انتشارا ؟ سنعود مرة أخرى الى قضية هجرة النظام الشمسى
خلال المجرة فى الفصل العاشر •

لأسباب سنشرحها حالا ، لابد وأن هذه السحابة كانت باردة ، كما
انها لا يمكن أن تكون قد تشكلت عن حادثة وقعت فى جوارنا •

اكتشف جاناپاى (مجلة ساينس سنة ١٩٨٠) فى قصصه لصلصال
التخوم وجود نظيرين للأوسميوم (أوسميوم ١٨٤ وأوسميوم ١٩٠)
بنسبة مميزة للمواد التى نشأت داخل النظام الشمسى • نحن نعلم أن
الأوسميوم يمكن أن يتشكل فقط اثناء انفجار سوبرنوبا • وقد اقترح
جاناپاى أن نسبة النظيرين عند تشكيل الأوسميوم تكون مميزة للظروف
الخاصة المحيطة ، نعى أن نسبة هذين النظيرين هى نسبة نمطية لواقعة
سوبرنوبا معينة ، والحق أنها بصمة الواقعة • ولما لم يكن لدينا سبب
واضح لاختلاف النسب ، فان احتمال أن يكون لاثنتين من هذه الانفجارات
نفس البصمة سيغدو أمرا مستبعدا جدا ، وعلى هذا فهو يعتقد أن النسبة
بين النظيرين فى صلصال التخوم تشير الى أن الأوسميوم بها قد نشأ
فى نفس انفجار السوبرنوبا الذى نتج عنه الأوسميوم الموجود بالأرض •
بل وأيضا كل الأوسميوم الموجود فى كل مكان بالنظام الشمسى •

جدله مقنع • ولكنه لا يرقى الى مرتبة البرهان • نحن لا نستطيع أن
نلاحظ تكوين الأوسميوم ملاحظة مباشرة ، وليس فى وسعنا إذن أن نعرف

ما اذا كانت نسب النظائر تحددها آلية ما تعمل كونيًا • هو يفترض أن النسبة تعطينا بصمة السوبرنوفا ، ولكنه قد يكون مخطئا • غير أنا لا نستطيع أن نرفض فكرة السوبرنوفا بناء على هذا الأساس وحده •

لا ولا نستطيع أن نرفض احتمال وقوع حادثة سوبرنوفا في منطقتنا من المجرة • أن هذه الظواهر قصيرة العمر ، ولكنها بمعيار المجرة ليست استثنائية • ثمة خمس منها حدثت في مجرتنا خلال الألف سنة الماضية ، فمن المعتقد أن سديم السرطان هو نتيجة واقعة سوبرنوفا شاهدها الفلكيون الصينيون يوم ٤ يوليو سنة ١٠٥٤ • ولقد يصل تالقي النجم المنفجر خلال اسبوع الى عشرة ملايين ضعف تالقي شمسنا ، ليصبح ليه غير معنوي كما رأينا • يبقى حطام السوبرنوفا فترة يمكننا فيها ملاحظته عن طريق الفلك الاشعاعي أساسا ، ولحد ما عن طريق ما ييثه من ضوء مرئي ومن اشعة اكس واشعة جاما • ثمة ما يقرب من مائة من مثل هذه المصادر في مجرتنا • وهي تتلاشى في نهاية الأمر عندما تنتشر جسيمات السحابات وتبرد (وأن كانت قد تسخن أحيانا لأسباب ما تزال غير مفهومة جيدا) • ويكاد يكون من المؤكد أننا لن نجد اثرا يمكن ملاحظته الآن لواقعة حدثت منذ ٦٥ مليون سنة •

لو أن حادثة كهذه وقعت بالمجرة في جوارنا مباشرة ، فهل يمكن يا ترى أن تقذف بكميات ضخمة من المادة في اتجاهنا ؟ هل يجوز أن تكون هذه الواقعة قد كونت سحابة غبار ضخمة تحركت خلال النظام الشمسي ، لتعمر على الأرض في تحركها ، ثم تتركها سابعة الى الفضاء البعيد ؟ ستكون هذه السحابة على الأغلب نشطة اشعاعيا ، فهل يا ترى تسبب آثارا خطيرة ؟ برغم جمال هذه الفكرة الا انها للأسف ليست مقبولة • صحيح بالطبع أن ما طرحه القشرة أثناء حادثة السوبرنوفا يتكون من جسيمات غبار وغاز ، وأن هذه يمكن أن تشكل سحابة بين نجمية ، لكننا لابد أن نتذكر أن القشرة سيقتذف بها في صورة جسم كروي يتضخم - أشبه ما يكون ببالونة ينفخ فيها • وهي تصوى طاقة هائلة • تقذف القشرة بسرعة تبلغ ستة آلاف متر في الثانية ، غير انها في ابتعادها عن بؤرة الانفجار تصبح أكثر انتشارا • أما أن تمر خلال النظام الشمسي وهي لا تزال كثيفة لتعطي الآثار التي تحتاجها ، فمعناه أن يكون الانفجار نفسه قريبا جدا ، وهذا يجعل موجات الصدمة الأولى تحطم كل شيء • والمؤكد أن هذا يبرر الانقراض ، ولكنه لم يكن ليسمح ببقاء أية حياة على الإطلاق ، إذ سيحترق الكوكب بأكمله ويتحول الى رماد ! أما اذا كانت السوبرنوفا بعيدة ، فربما أعطت اثرا أكثر تواضعا - يكفي لقتل الكثير

من الانواع ليترك البعض الآخر - لكن السحابة عندئذ تصبح ولا علاقة لها بالموضوع !

يبقى لنا من بين المشتبه في أمرهم موضوع ملاقات جسم صلب . ولنترك الآن قضية ما اذا كان هذا الجسم قد ارتطم بسطح الأرض مباشرة أم أنه مر عليها مروراً عابراً . علينا أن نعين قدرة المشتبه فيه على اقتراف الجريمة قبل أن نتحول الى طريقة العمل . ثمة صنفان من المرشحين : المذنبات ، والنيازك . علينا أن نعاملها بحذر لأن ثمة أخطاراً في اتهام أى منهما بالتسبب في كارثة هائلة . ان لدينا أفكاراً مسبقة عنهما تجمعت خلال آلاف السنين من ثقافات كل حضارات الأرض .

اثارت المذنبات اهتمام الناس من قديم الزمن ، لأنها ساطعة مثيرة ويمكن رؤيتها أياً ما بطولها ، وكثيراً ما ألقيت عليها مسئولية ظهور الطاعون وانخفاض المحصول وغير ذلك من الكوارث . ولقد اتهمت النيازك هي الأخرى بأنها صواعق يقذف بها كبار الآلهة : زيوس ، وجوبيتر ، وثور ، وبركوناس ، وبيرون ، وترانس ، ويهوه ، وغيرهم كثير من الآلهة الأقل شهرة ، يقذفون بها لمعاوية الأثمين . ربما كان الاتهام ظالماً ، كانت الصواعق الحقيقية سلاحاً سحرياً خفياً يسبب الدمار المادى الذى يلحق عقب وقوعها . على أية حال علينا أن ننتبه حتى لا يتحول جدلنا المنطقي ليصبح هو الآخر مجرد أساطير .

قد نحسب أن نعتقد ان أسلافنا كانوا من الحمقى المؤمنين بالخرافات ، لكن الحقيقة أنهم في موضوع الصواعق لم يكونوا خاطئين كما نتصور ، لأن الصواعق تحدث بالفعل . انها تحدث اثناء العواصف الرعدية العنيفة عندما تمتد جبال السحب حتى تصل الستراتوسفير . في مثل هذه الظروف قد يشتعل وميض البرق من أعلى قمم السحاب حتى سطح الأرض ، ليفرغ في الأرض قدرًا عظيمًا من الطاقة يصهر التربة الى كتل من مادة زجاجية . لا أحد بالطبع يرى هذه الكتل وهى تتكون على السطح ، كما انها بالتأكيد لم تكن موجودة قبل وميض البرق ، وبذا فمن المعقول تماماً ان يتصور أسلافنا ان هذه المادة قد طوح بها من السماء الى الأرض . والواقع انها تحدث أكثر ما تحدث في المناطق المعتدلة اثناء فصلى الربيع والخريف .

والمذنبات أجسام غير مؤكدة المنشأ تتحرك داخل النظام الشمسى في مدارات تحملها مرة قريباً من الشمس ثم تحملها ثانية بعيداً جداً عنها . وفى كل مرة يمر فيها المذنب قريباً من الشمس يفقد بعضاً من مادته ، وليس هناك طريقة يمكنه بها أن يعوض هذا النقص . وعلى هذا فان معظم المذنبات يتلاشى بالتآكل ، كما ان البعض منها يضيع

تماما من النظام الشمسى بسبب اضطرابات جاذبية مداراتها تقذف بها بعيدا فى الفضاء بين النجوم . وعلى هذا فان المذنبات نفسها تغير من طبيعتها وسلوكها بسبب هذا التآكل وبسبب الطرق التى بها تتغير مداراتها وسرعاتها بالنسبة للشمس .

كان الفلكى الأمريكى فريدل . هويل - من مرصد سميتشونيان الفيزيائى فى كامبريدج ماساتشوستس ، وسنسمع عنه مرة أخرى بالفصل السادس - كان هو من نشر بحثا سنة ١٩٥٠ اقترح فيه - على عكس السائد وقتئذ - ان للمذنبات نوايا صلبة تتكون من نسب متساوية من الصخور وبلورات السوائل المتجمدة والغازات . فهى فى الحقيقة - على حد تعبيره - « كريات ثلج قذرة » . ويعتقد معظم العلماء هذه الفكرة الآن . والأجزاء الصخرية منها تتكون من جلاميد مدورة والكثير من الشظايا الأخرى الأصغر ، وقطرها يبلغ نحو كيلو متر واحد ، يربطها الثلج جميعا مما يتسبب فى زيادة حجمها . وكتلة المذنب اقل بكثير من كتلة نيزك صلب له نفس الحجم .

ستكون لهذا أهميته إذا كانت سرعة المذنب بالنسبة للأرض تقارب سرعة أى جرم آخر فى النظام الشمسى ، ولكننا لا نستطيع التأكد من هذا . فإذا ما كان المذنب بعيدا عن الأرض فعلينا ان نحرص على ما تعنيه كلمة مثل « السرعة » ، لأنها بالطبع نسبية تتعلق بالملاحظ الذى يرصدها . تتحرك الأرض فى مسلكها بسرعة تبلغ ٢٩٫٨ كيلو مترا فى الثانية ، أما سرعة المذنب برانفيلى فقد قدرت بـ ٢٤ كيلو مترا فى الثانية بالنسبة للشمس ، بينما تبلغ سرعة كوهوتيك ومجموعة مذنبات وست نحو ٥٠ كيلو مترا فى الثانية . لو أن هذه السرعات كانت هى أيضا السرعات بالنسبة للأرض للزم أن يكون المذنب حقا اكبر من مجرد كتلة من الصخر المصمت كى ينتج نفس الأثر الذى تسببه كتلة الصخر المصمت عند الاصطدام ، ذلك لأن سرعته لن تختلف عندئذ كثيرا عن سرعة نيزك . غير أن مدارات المذنبات غير منتظمة ، ومن المحتمل جدا ان يقابل أحدها الأرض مواجهة . فى هذه الحالة يلزم أن تجمع السرعتان - سرعة المذنب وسرعة الأرض - وإذا ما وصلت سرعة الاصطدام الى ٥٠ - ٨٠ كيلو مترا فى الثانية تناقص الفارق بين الأثر الذى يحدثه المذنب وأثر النيزك بشكل واضح .

تحسب طاقة الحركة - وهى ما يهم - بضرب نصف كتلة الجرم فى مربع سرعته . وعلى هذا تتساوى طاقة الحركة لقطعة من الصخر المصمت تسير بسرعة ٢٠ كيلو مترا فى الثانية ، مع طاقة مذنب له عشر هذه الكتلة إذا وصلت سرعته الى أكثر قليلا من ٦٣ كيلو مترا فى الثانية .

(يجرى الحساب كالتالى : افترض ان كتلة قطعة الصخر هى ١٠٠ وكتلة المذنب هى ١٠ ، ستكون طاقة الحركة للصخر تساوى ($100 \div 2$) مضروبة فى مربع ٢٠ (أى مضروبة $\times 400$) ، والنتيجة اذن ٢٠٠٠٠ ، أما بالنسبة للمذنب فستكون ($20 \div 2$) $\times (63 \times 63)$ = ١٩٨٤٥٠ وهذه الأرقام ليست خيالية تماما ، فقطر المذنب يبلغ نحو ١٢٥ كيلو متر ٠ وعلى هذا ، ويسبب الفارق فى الكثافة بين « كرة الثلج القدرة » والنيك ، فان مذنبا له كتلة نيزك قطره عشرة كيلو مترات سيكون قطره ١٢٥ كم فاذا ماكانت نصف كتلة المذنب من الثلج بحيث يمكن اسقاطها من الحساب لنهتم فقط بالجزء الصخرى منه ، يلزمنا ان نضاعف حجم المذنب ليصل الى الكتلة المفروضة لو انه كان بالكامل كتلة صلبة ٠ يتضاعف حجم الكرة اذا ازداد قطرها بمقدار ٢٥٪ ، وبذا فان مذنبا قطره ١٢٥ كيلو مترات ستكون له نفس كتلة نيزك قطره عشرة كيلو مترات ٠ ومن المستبعد – ان لم يكن مستحيلا – ان نجد مذنبا قطره ١٢٥ كيلو مترات ، لكن من السهل ان نجد مذنبات سرعتها ٦٣ كيلو مترات فى الثانية وقطرها ١٢٥ كيلو مترات ٠ بل الحقيقة ان السرعة قد تزيد كثيرا عن هذا ، ليكون حجم المذنب اصغر ٠

ان الصعوبة مع فكرة اصطدام مذنب بالارض ليست فى انها غير قابلة للتصديق ، فهى معقولة تماما ، وانما تكمن فى كيمياء صلصال التخوم ٠ اذ يبدو انه من المستبعد ان تنقل « كرة ثلج قدرة » الكميات المطلوبة من الأوسميوم والاييريديوم ٠

عندما ناقشنا فى الفصل الثانى احتمال ان يكون مذنب قد اطلق سموما فى الجو أو فى البحر ، وجدنا ان هذا هو الآخر أمر مستبعد ٠ والسبب بسيط للغاية ٠ افترض وجود مذنب له نواة قطرها ١٢٥ كيلو مترات ٠ سيكون حجم نواته نحو كيلومتر مكعب ، نصفها من مواد جامدة تصبح سوائل أو غازات على درجات الحرارة التى تقابلها على سطح الأرض – نقصد ان النصف مكون مما قد نسميه « ثلجا » ، ونعنى بذلك مادة لا توجد فى الحالة الجامدة الا عرضا ٠ هنا لابد ان نتذكر ان الرصاص الجامد على ظهر كوكب الزهرة قد يعتبر « ثلجا » لانه يوجد هناك طبيعيا فى حالة سائلة ٠ دعنا نفترض ان هذا كله – نصف الكيلو متر المكعب بأكمله – مكون من سيانيدات وسموم أخرى ٠ دعنا نفترض ايضا ان المذنب سقط فى شمال الاطلنطى (وهو فرض له أسبابه التى سنذكرها فى الفصل التالى) ٠ فى نهاية العصر الطباشيرى كان شمال الاطلنطى اضييق مما هو عليه الآن ، وان لم يكن عمقه – على الأغلب – يختلف كثيرا عنه اليوم ، وكان يتخذ تقريبا شكل مثلث ابعاده

بالتقريب : القاعدة ٣٠٠٠ كيلو مترا ، الارتفاع من الشمال الى الجنوب ٣٠٠٠ كيلو مترا ، ويحتل أن عمقه كان نحو ٤ كيلو مترات . وهذا يعطى حجما يبلغ ١٨ مليون كيلو متر مكعب . اننا نفترض الآن أن نصف كيلو متر مكعب من المادة السامة قد سقط في ١٨ مليون كيلو متر مكعب من الماء . ستقتل بالطبع كل الكائنات بالمنطقة المجاورة لمكان السقوط بسبب غف الاضطدام : قبل أن تجد الوقت كي تموت مسمومة ! انما سيؤثر السم على تلك الكائنات التي كانت بعيدة عن موقع الاضطدام ، لكن في انتشار السم نحوها سيتوزع خلال الظروف العنيفة الناتجة داخل كتلة تبلغ ٣٦ مليون ضعف كتلته الأصلية . ستتسم بعض الكائنات ، لكننا نستبعد أن يكون عددها كبيرا . ثمة احتمال أقل في أن تصل مثل هذه الكميات القليلة من السموم ، بعد أن خففتها مياه محيطات العالم كله . ومنها الباسيفيكي الذي كان اكبر بكثير وأعمق من الأطلنطي - أن تصل في صورة جرعات قاتلة أو حتى مؤذية للغسالية العظمى من الكائنات الحية . لن يكون في مقدورها أن تسبب انقراضا ، وحتى أن هي سببت هذا ، فلن تعمل انقراض الأنواع التي كانت تحيا على الأرض .

تبقى لدينا النيازك والنجيمات . ثمة اختلاط بسيط في المصطلحات هنا . فهناك نظرية تقول أن حزام النجيمات هو مصدر النيازك التي تتحرك داخل النظام الشمسي وتصطدم أحيانا بالكواكب . وهناك نظرية أخرى تقول انها بقايا نوايا مذنبات - لتعطل بذلك مداراتها غير المنتظمة . والنيازك أجرام يمكن أن ترتطم بالكواكب ، والنجيمات أجرام شبيهة لا ترتطم بها . وتسمى النيازك التي تحملها مداراتها قرب الأرض باسم نجيمات أبولو . ونحن نعرف منها تسعة عشر ، وقطرها يتراوح ما بين كيلو متر واحد وستة كيلو مترات ، فيما عدا اثنين منها قد لا يزيد قطر أي منهما على مائتي متر (هما ب ل ٦٣٤٤ ، ١٩٧٦ ي ا) ، وبعضها يقترب كثيرا من الأرض ، بل وقد يمر ما بين الأرض والقمر . والنيازك الموجودة حاليا اصغر من أن تبرز الواقعة التي نحاول تفسيرها ، ولكن ربما كان هناك يوما ما نيازك أكبر . وطبيعي أن اضطدام أي منها بالكواكب سيخرجها من المجموعة . ولنا أن نعتبر أن بنيتها هي البنية النموذجية للنيازك الأخرى .

هناك نمطان رئيسيان من النيازك : نيازك مكونة من الصخر ، وأخرى لبها من المعدن (الحديد أساسا) - تسمى السيديروفيلات . والتركيب الكيميائي للنمطين مختلف . ومن الممكن أن تتسبب عن أيهما واقعة اضطدام

رهيبة بالأرض • والمعادن التي ترسبت في صلصال التخوم معادن مميزة
لنيزك السيديروفيلا •

وعلى هذا يبدو من المحتمل جدا أن ثمة طائفة واحدة فقط من الأجرام
هي التي تسببت في تلك الآثار الهائلة على سطح الأرض ، وألقت في نفس
الوقت بالمعادن التي عثرنا عليها في صلصال التخوم • اننا نتصور نيزكا
من الحديد • ولكن ، لما كان مصدر الجرم السماوي ما يزال مجهولا ،
فربما كان من الأفضل الا نسميه نيزكا ولا نجما • بدلا من ذلك دعنا نستعمل
من الآن مصطلحا اقل دقة وأكثر عمومية : سنطلق على هذا الجرم اسم
الكويكب - الكوكب البالغ الصغر •

والآن ، دعنا نحاول أن نعرض ما نتصور أنه قد حدث عند وقوع
الاصطدام •

الفصل الخامس

برميل النار

انفجر البحر • قفز المحيط الى اعلى وقد تحول الى غاز متوهج ،
فى هدير ملا جنبات الكون •

لم يكن ثمة تحذير • على الأقل ، لم يكن ثمة تحذير يعين الحيوانات
الوجودة عندئذ على وجه البسيطة • ربما رأى الانشط منها والأكثر
ذكاء ، ربما رأى لحة من شعاع ييرق فى الفضاء ، فشرع يرفع راسه •
هل يا ترى كانت الزواحف تمد رؤوسها فوق سطح مياه المحيط ؟ وطيور
البحر - وكانت موجودة عندئذ ، وتشبه ما نراه الآن من نسلها - هل
كانت تحوم وتصرخ فى بحثها الدءوب عن الطعام ؟ ثم هل ابتدأت جميعا
تننبه للنار فى السماء ؟ نستبعد هذا ، ثم ان انتباهها لم يكن ليفيدها
كثيرا •

وليس هذا لأن الواقعة لم تكن مرئية • العكس تماما • عندما دخل
الكويكب المناطق الأعلى من الغلاف الجوى - على مبعده ١٥٠ كيلومترا
من سطح الأرض - لابد وأن قد ابتدا فى التوهج ، ليصبح أكثر سطوعا
من الشمس • كما أنه لابد وأن قد بدا فى نحو عشرة أضعاف حجم
الشمس ، بسبب زاوية الدخول • وبارتفاع حرارته الى ١٨٠٠٠ درجة
مئوية - ثلاثة أضعاف حرارة الشمس - أصبحت درجة لمعانه مائة ضعف
لمعان الشمس • لابد أنه قد ملا الفضاء تماما بعد ثانية واحدة لا أكثر من
ظهوره • ان رؤيته لم تكن لتزيد عن مجرد لمحة ، فلو أن الراى كان
قريبا ، اذن لاحتقنت الحرارة التى يشعها امامه ، وأحالتة الى رماد •
أما البحر من تحته ، فلا بد وأن قد ابتدا يغلى فى عنف قبل أن يصطدم
به مباشرة •

كانت النهاية سريعة بالنسبة للحيوانات التى وقعت فى مساره •
ان كويكبا يسقط عموديا على السطح بسرعة ٢٠ كيلو مترا فى الثانية

لن يستغرق أكثر من ثانيتين ليقطع المسافة داخل المنطقة الكثيفة من الغلاف الجوي • ثمة مذنبات تسير بسرعة تصل الى أربعة أضعاف هذه السرعة بالنسبة للأرض ، لتصل في وقت أقصر • لن تحس بالكويكب أذن كل تلك الملايين التي لا تعد ولا تحصى من الحيوانات : نائمة ، ترعى ، تبحث عن فريسة ، تتشاجر، تغازل، تتزاوج • انها – ببساطة – ستتلاشى •


أما الانفجار الذي مزق المحيط فلأيد وأن قد كان أكثر عنفا من أي انفجار عرفناه في تاريخنا ، أعنف بكثير مما يمكننا تخيله • ولأيد لنا عند محاولة تفهمه أن نقصصه الى أجزاء ، ثم نصف عناصره المروعة واحدا واحدا •

نسالك أولا أن تقبل تأكيدنا بأن الجسم السماوي قد سقط في الماء • ان الكثير من الآثار المباشرة لن تختلف كثيرا اذا ما كان الجسم قد سقط في الماء أو سقط على اليابسة ، لكن لدينا أسبابا عديدة للإفتراض بأنه قد سقط في مكان ما بوسط شمال الأطلنطي ، وسنفصلها في الفصل السادس •

دعنا نبتدىء بحجم الكويكب • كان قطره ١٠ أو ١١ كيلو مترا • قد يبدو لك هذا صغيرا ، لكن ذلك يرجع الى أننا عادة ما نقارنه بغيره من اجرام النظام الشمسي • ان حجمه لا يؤهله لأن يمنح لقباً مبهجاً مثل « الكوكب » • ان له نفس حجم فوبوس ، وهو واحد من أقمار المريخ صغير ثقيل ، يبلغ طوله ١٣٥ كيلومترا وعرضه ٩٥ كيلو مترا • لكن قمر الأرض أكبر من ذلك بكثير • وكويكبنا هذا صغير على المستوى الكوني ، ويمكن أن يقارن بالأجرام الموجودة على الأرض نفسها •

يبلغ ارتفاع جبل أيفرست أكثر قليلا من ٨٨٥٠ مترا ، نعني أن أعلى قمة فيه ترتفع عن مستوى سطح البحر بنحو ٨٩٩ كيلومترا (وأن كانت ما تزال ترتفع ، لأن تحركات قشرة الأرض التي كونت الهيمالايا لم تتوقف بعد) • اذا تصورت جبل أيفرست منتصبا كعمود من الصخر ، منعزلا بحيث يمكنك أن تراه من قمته حتى مستوى ماء البحر – دون أن يغرق في المنخفض الذي يسببه وزنه الثقيل ، فان الكويكب سيكون أعلى منه بكيلو متر أو اثنين ، وأعرض منه كثيرا • سيبدو الجبل أمامه قزما •

سيكون مصدر خطر للطيران • فالطائرات التي تطير على ارتفاع عشرة كيلو مترات أو أكثر هي فقط الطائرات الحربية والطائرات المدنية حابرة القنارات • ستعبر الكونكورد فوقه بلا متاعب ، أما طائرات ٧٤٧ أو ترايستار فسيكون عليها أن تدور من حوله ، الا اذا كان القائد مستعدا أن يمتع ركابه بقليل من الطيران المنخفض •




يقدم هذا الشكل تخطيطا للسلسلة المحتل لجرم ضخم عندما يصطدم بالبحر وقاع البحر
 لاحظ كيف يتشوه الجرم نفسه ، ثم لا يبقى منه ما يمكن تمييزه .

اننا نتعامل اذا مع جرم صغير بالمقياس الكونى ، وكبير حقا بالمقياس المألوف لنا على سطح الأرض . ولقد كان الكويكب ايضا صلبا جدا . كان كتلة من الصخر لا تقل صلابة عن ايفرست نفسه ، ولم يكن بالقل كثافة منه ، فامتد المكعب منه لم يكن ليقل وزنا عن متر مكعب من صخور ايفرست . قدر فريق الفارس وزنه برقم يقع ما بين ١٠٠ بليون طن و ١٠٠٠ بليون طن ، وهذا مجال يسمح بقدر كبير من التهذيب (كان تقدير جاناباى هو ٢٥٠٠ بليون طن) ، ولكنه على الاقل يعطينا فكرة عن كتلة هذا الكويكب .

اقترب الكويكب من الأرض بسرعة بلغت ٢٠ كيلو مترا فى الثانية (اى نحو ٧٢٠٠٠ كم فى الساعة) . والأرض نفسها تتحرك فى مدارها حول الشمس بسرعة ٢٩.٨ فى الثانية . لكن الأرقام لا تعنى الكثير ، فعمشرين كيلو مترا فى الثانية تعادل ستين ضعف سرعة الصوت على مستوى سطح ماء البحر فى غلاف الأرض الجوى . وعلى هذه السرعة تقطع الطائرة الرحلة ما بين لندن ونيويورك فى زمن يزيد قليلا عن أربع دقائق ، وستوفر فيها شركات الطيران الكثير من مصاريف الخدمة على الطائرة وتخسر الكثير من مبيعات البار اما المكوك الفضائى « كولومبيا » فيدور حول الأرض بسرعة ٨ كم فى الثانية (٨٠٠ ٢٨ كم فى الساعة) ، والقمر الاصطناعى الموجود فى مدار متزامن مع حركة الأرض ، اى الذى يبقى فى مكان ثابت فوق نقطة على سطح الأرض ، يتحرك بسرعة نحو ٣ كم فى الثانية (١٠ ٨٠٠ كم فى الساعة) . ويمكن للبندقية م ١٦ أن تطلق رصاصة سرعته ١ كم فى الثانية (٣٦٠٠ كم فى الساعة) دعنا نستخدم سرعة الرصاص هذه فى المقارنة . اننا نتعامل مع جسم اكبر بكثير واثقل من جبل ايفرست ، مكون من صخر صلب ومعدن ، يقترب من الأرض بسرعة تبلغ عشرين ضعف سرعة رصاصة من بندقية جيش حديثة .

كان جسما ضخما وسريعا ، نتج عن ارتطامه بالأرض قدر هائل من الطاقة . كم كان مقداره ؟ يمكننا حساب هذا ، فلدينا تقديراتنا عن كتلته وسرعته . مرة أخرى سنعطى رقما قد لا يعنى شيئا : ١٠٠٠ مليون ارج لكل سنتيمتر مربع من سطح الأرض . وضع و. ه. ماكربا هذا الرقم فى صيغة أبسط ، قال انه يعادل تفجير ١٠٠ ترليون طن من ت. ن. ت (اى مائة مليون مليون طن) . كم حجم هذا ؟ ما ضخامة الرقم ١ يتلوه أربعة عشر صفرا ؟ انفجرت القنبلة الذرية التى ألقيت على نجازاكي فى أغسطس سنة ١٩٤٥ بقوة تساوى ٢٠ ٠٠٠ طن ت. ن. ت ، اى رقم ٢ امامه



هذا الرسم يقدم تخطيطا للسلوك المحتمل لجرم شغيم عندما يصطدم بالجاذبية .
 لاحظ ارتفاع وسط الحفرة عندما يتحلل الجسم المصطدم فلا يبقى منه في منطقة الحفرة
 الا القليل .

أربعة أصفار • ولقد وصل الكويكب بطاقة تبلغ ٥ بليون (٥٠٠٠ مليون)،
قنبلة كقنبلة نجازاكى • ولتسهيل التصور اشار ماركيا الى انه لو ان
الطاقة توزعت على سطح الأرض بالتساوى (وهو مالم يحدث لحسن
الحظ) فسيكون نصيب كل كيلو متر مربع من سطح الأرض عشر قنابل.
فى قوة قنبلة نجازاكى • وإذا افترضنا أن حجم الأسلحة الذرية الموجودة
الآن على الأرض يعادل بضع مئات البلايين من تـنـت ، فاننا نحاول أن
نتصور تفجيرها يعادل ألف ضعف تفجيرها جميعا فى مكان واحد •
لا عجب إذن أن نجد هذا صعب التخيل ! اننا نحاول أن نصف واقعة
أبعد بكثير من كل ما خبرناه أو سجله التاريخ • على أنه يلزم أن نشير
الى أنه بينما قد نتحدث عن الطاقة المنفردة عن الارتطام ، فان الأثر الناجم
عنها يتوقف كثيرا على الطريقة التى افردت بها هذه الطاقة • وكما
سنوضح فيما بعد ، فان الطاقة الهائلة التى أفردها الكويكب كانت أكثر
انتشارا من الانفجار النووى ، وتختلف عنه – بالتالى – كثيرا •

ورغم ذلك فان المشهد الذى نصفه أبعد بمراحل عن أية خبرة
بشرية ، أبعد بكثير حتى من أية ظواهر يبتكرها العلماء فى معاملهم •
وليس أمامنا الا أن نتأمل التضمينات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية •
ان كل ما نقوله نحن أو غيرنا عن تفاصيل الواقعة لابد أن يحوى قدرا
كبيرا جدا من التخمين العليم •


ثمة كارثة وقعت منذ نحو قرن مضى ، وهى موثقة جيدا • قيل ان
ثورة بركان كراكاتوا ، الموجود الآن فيما يسمى اندونيسيا ، كانت أفظع
انفجار بركانى مسجل ، وربما كانت أسوأ كارثة من نوعها فى التاريخ
المعروف • لقد قتلت موجات التسونامى (موجات المد) وحدها نحو
٣٦٠٠٠ شخص فى جزيرتى سومطرة وجاوة المتجاورتين • وربما كانت
طاقة انفجار كراكاتوا نحو ١٠٠٠ مليون طن ت ن • لقد أفرد اصطدام
كويكبنا هذا طاقة تعادل مائة ألف انفجار كانفجار كراكاتوا :

ماذا يحدث اذا ما انفجر مائة ألف بركان مثل كراكاتوا سسويا ؟
لا يجب أن نبالغ فى قوتها ، فهذه لم تكن تكفى لاقلاق مدار الأرض ، وهى
لم تزعزع عالمنا وتدفعه بعيدا عن مكانه • لا ولم يكن الانفجار من الضخامة
بمحيث يسبب تلفا خطيرا فى تركيب الكوكب نفسه • وهذا انما يرجع أساسا
الى المرونة النسبية للأرض : فحتى صخورها الصماء الصلبة يمكن أن
تنحنى وتتدفق قليلا ، كما تتحرك القشرة بثبات ، وقد تتجدد • ثمة اجرام
أخرى فى النظام الشمسى أكثر هشاشة تتحطم باصطدام قوى كهذا –
توابع كوكب زحل البعيدة المتجمدة مثلا • والواقع أنها ربما كانت قد
تحطمت فى الماضى ثم أعيد تشكيلها عندما تجمعت الشظايا مرة أخرى

سويا بالاجاذبية • لكى ينحنى السطح أو يتحطم لابد أن يحدث الاصطدام •
فهل حدث ؟

افترض البعض أنه اذا ما اخترق الغلاف الجوى جسم له مثل هذه السرعة العالية ، فلن يتبقى منه ما يصل الى سطح الأرض ، اذ سيحترق ويتحطم تحت الاجهاد الذى يسببه مروره داخل هواء متزايد الكثافة ، وبذا فانه يفرد كل طاقته فى الغلاف الجوى • لو أن هذا قد حدث للكويكب - لو أن الانفجار كان قد تم فى الهواء - اذن لكانت نتائجه أكثر فظاعة ، اذ ستوزع الطاقة عندئذ على مساحة من سطح الأرض أوسع • والواقع أنه من المستبعد أن يكون مرور الكويكب داخل الهواء قد تسبب فى أية آثار خطيرة على الاطلاق • صحيح بالطبع أن الحرارة تحطم معظم الأجسام الصغيرة جدا التى تدخل الغلاف الجوى • اننا نراها أحيانا فى صورة شهب أثناء الليل • وهذه الشهب التى تبعث فينا البهجة ، وقد تخيفنا ، تتفاوت حجما ما بين جسيمات من غبار ، الى كتل فى مثل حجم حبة الفاصوليا ، ورغم ذلك فان البعض منها يصل سطح الأرض ، وكذا يصله ايضا بعض من نيازك يتفاوت حجمها ما بين حجم الحصاة وحجم كرة التنس ، بل وقد يصل حجمها ايضا - ونادرا لحسن الحظ - الى جلاميد تزن طنا أو تزيد • ومثل هذه الأجسام تكون أكبر من أن تستهلك بالتآكل داخل الغلاف الجوى ، ولكنها فى نفس الوقت أصغر من أن تخفف سرعتها كثيرا أثناء سقوطها فى الهواء • وبذا ، فبرغم أنها تخترق الغلاف الجوى بسرعة عالية فان حركتها تكون بطيئة نوعا ما عندما تصل الى الأرض • ودرجة التسخين التى يصلها الجسم تتوقف على سرعته وعلى الفترة التى يقضيها فى رحلته بالهواء - وهذه بدورها تتوقف على زاوية السقوط اننا نفترض الآن أن ثمة كويكبا اقترب من سطح الأرض باتجاه عمودى تقريبا ، وأنه قد قضى ثانيتين أو أقل فى رحلته داخل الغلاف الجوى ، وبذا ، فبالرغم من تسخين سطحه ، ومن أنه سيفقد بعضا من مادته ، فان النسبة التى سيفقدونها ستكون ضئيلة غير معنوية •

لا بد اذن أن يكون فناء هذا الكويكب قد تم عند اصطدامه بالبحر • مرة أخرى ، سيفرغنا أن نفترض أن أى جسم يتمكن من اختراق الغلاف الجوى وكان لا غلاف هناك ، يستطيع أيضا أن يخترق الماء بنفس الشكل ، ان يكن أصعب قليلا • ان أيا منا ممن أخطأ التقدير يوما وهو يقفز فى الماء فستط على بطنه فى حمام السباحة ، يستطيع أن يؤكد أن الماء أحيانا يسلك سلوك المادة الصلبة • هم عادة ما ينصحون الطيارين عندما يقتربون الى الماء بأن يفعلوا ذلك وهم فى وضع قائم ، بالاقسدام أولا (وان كنا لا نعرف كيف يستطيعون ذلك) ، بل الأفضل لو تمكنوا من الولوج بأطراف أصابع أقدامهم ، كما الرافعات !



(ب)

(ب)

موجات الصدمة الناتجة عن جسم يقترب من
سرعة الصوت لم يتجاوزها . لاحظ كيف
تضغط موجات الصدمة الى الخلف بازدياد
السرعة الى ان تتبع الجسم في النهاية عندما
يخترق الجسم حاجز الصوت .

(شكل ٤)

(١)

قطعتان مستعرضتان في الأرض يوضحان كيف
تنتشر الموجات السيزمية من نقطة الارتطام .

غير أن الطيارين ، وبينهم من يأبى حظه العاثر إلا أن ينفصل عن مظلته (پاراشوته) ، ومثلهم الهابطون على بطونهم ، كلهم يصلون الماء فى ببط فعلًا . لكن مشكلتهم هى أنهم يعرضون للماء مسطحًا كبيرًا من جسيمهم ثم لا يستطيع الماء أن يتحرك بطريقة ملائمة لاستقبالهم . فلكي يتلقفهم الماء فى هدوء ، يلزم أن يتحرك جانبًا عند ولوج أجسامهم فيه . طبيعى أنه كلما كانت حركة الماء اللازمة صغيرة أو تدريجية كلما سهّل إتمامها . فالغواص الأكثر رشاقة ، الذى ينساب جسده الى الماء بأطراف الأصابع أولاً ، لا يعانى من متاعب عند الاصطدام ، فالأمر لا يحتاج سوى قدر قليل من حركة الماء يسمح بولوج الأصابع أولاً ، ثم يتلوها بالتدريج الجسم المتصل بها .

لماذا يلزم أن يتحرك الماء أصلاً ؟ عندما يتحرك جسم صلب خلال الهواء أو الماء ، يلزم أن يتحول الهواء أو الماء المزاح الى مكان ما - فهو لن يتلاشى بالطبع ! والحقيقة أن الجسم يدفع الهواء أو الماء أمامه ، لينضم ثانية من خلفه . يتسبب دفع الوسط السائل فى خلق موجات ضغط تتحرك أمام الجسم ، وتبدأ فى شق الوسط قبل وصول هذا الجسم . فالجسم يتحرك كما لو كان مشرئقاً خلف موجات الضغط التى تخلقها حركته . فإذا ما كان الجسم نحيلًا - كالسهم مثلاً - كانت الأذاعة المطلوبة لمروره ضئيلة . وعندما تلاقى موجات الضغط بالهواء كتلة ماء ، تستمر الموجات فى الانتشار بالماء ، ولما كانت كثافة الماء ألف ضعف كثافة الهواء ، فإن الأمر يتجلب قدرًا أكبر من الطاقة لتحريكه . فإذا كان الجسم نحيلًا مضى كل شيء على خير ما يرام لأن طاقة حركة الجسم قد تكفى . أما إذا ما عرض الجسم سطحًا واسعًا للماء ، يحتاج قدرًا كبيرًا من الأذاعة ، فإن طاقة حركته قد لا تكفى ، فيجد الماء « غير مستعد » ، وتكون النتيجة آلاما فى الجلد - أو ما هو أسوأ من ذلك . أما كويكبنا فقد يتخذ أى شكل ، وإن كان من المستبعد أن يكون شبيهًا بالسهم . وبذا فنحن نتوقع أن يسقط على بطنه ، ويصبح الفارق عند الاصطدام بين الماء الذى لم يعد مستعدًا للاستقبال وبين ركانز المعدن والصخر أمرًا لا يهمل غير الأكاديميين . والأكثر من ذلك أن ثمة عاملاً آخر يلزم فى هذه الحالة أن نخضعه فى الاعتبار .

تتحرك موجات الضغط أمام الجسم المتحرك بسرعة الصوت . ومعنى هذا أن المسافة التى تمتد فيها هذه الموجات أمام الجسم تتوقف على سرعته بالنسبة لسرعة الصوت . وباقتراب هذه السرعة من سرعة الصوت تقترب حركة الجسم من موجات ضغطه المتقدم ، ثم الى سرعة الصوت نفسها ، فإذا ما ازدادت سرعة الجسم عن سرعة الصوت ، توقف تمامًا عن توليد

أية موجات ضغط أمامية ، وبذا لا يتلقى الوسط الذى يتحرك خلاله أى تحذير مسبق . الموجات ما تزال تنتج ، لكن الجسم يتخطاها ويسبقها ، تنتضغط ضغطا محكما وتتحول الى ذلك الدوى الصوتى الذى يهز النوافذ، ويتركه السكان يتميزون سخطا .

ينتج الدوى الصوتى عن موجات الضغط المكبوسة التى تصدر عن الجسم المتحرك فى صورة مخروط خلفه ، وتصبح الموجات - كما الصوت - أكثر انتشارا كلما ازداد بعدها عن الجسم . فإذا ما كان الجسم - قل مثلا - طائرة تحرك أفقيا ، فإن مخروط موجات الضغط سيقابل سطح الأرض رأسا خط سير خفى ، وإن كان مسموعا ، يتوقف اتساعه على ارتفاع الطائرة نفسها . أما الفرقة التى نسمعها ، فترجع الى موجات الضغط قرب حافة المخروط ، حيث تكون كثافتها أعلى ، لأنها الأقرب الى الطائرة التى تنتجها . فإذا كانت الطائرة تتحرك عموديا غدت النتيجة مختلفة . فهى إن كانت تهبط فلن يكون ثمة صوت يسمع الى أن ترتطم بالأرض ، عندئذ ستصل موجات الضغط - ليس كفرقة واحدة - وإنما كهدير طويل . وينفس الشكل ، إذا كانت الطائرة ترتفع بعيدا عنا فانا لن نسمع سوى الهدير ، ولا فرقة صوتية ، حتى وإن كانت سرعتها تفوق سرعة الصوت .

وكويكبنا وهو يتجه نحو الأرض عموديا سينتج موجات ضغط تبدأ فى الوصول الى الأرض كهدير طويل مباشرة عقب الاصطدام ، وسيستمر وصوله عددا من الثوانى يعادل طول الرحلة التى قطعها الكويكب خلال الغلاف الجوى .

فى أربعينات هذا القرن ، عندما اخترقت الطائرات لأول مرة ما يسمى « حاجز الصوت » كان البعض يعتقدون أن هذا الحاجز لا يمكن تخطيه . كانوا يقولون أن الطائرة لو وصلت هذه السرعة فإن الهواء يسلك سلوك الجسم الصلب فلا يمكن لأى طائرة أن تخترقه ، ثم ثبت بالطبع أن هذا غير صحيح وإن سرعة الطائرة يمكن أن تزيد عن سرعة الصوت . لكن الفكرة كانت تبدو معقولة فى ذلك الوقت . وظهر أن المشكلة تكمن فى اضطراب تيار الهواء فوق أسطح التحكم على أجنحة الطائرة وذيلها عندما تقترب من سرعة الصوت ، وما يتبع ذلك من فقدان السيطرة عليها . ولقد حلت المشكلة بالجمع ما بين تصميم للطائرة يضمن الاحتفاظ بالانحناء السطحي للهواء فوق أسطح التحكم عند السرعات فوق الصوتية ، وبين محركات أقوى من كل ما صنع حتى أوائل الأربعينات . لم يحدث أن ابتكر الإنسان قبلا جسما يتحرك خلال الماء بسرعة أعلى من سرعة الصوت . إن حاجز الصوت فى الماء سيكون حائلا أكثر صعوبة من زميله الهوائى .

سيرتطم الكويكب اذن بالماء ، فجأة ودونما تحذير ، وبذا سيسلك الماء سلوكا يقترب من سلوك الجسم الصلب ، فاذا كان لحنة كويكبنا ان تزداد ، سقط فى الماء على بطنه . ومن المستبعد ان يخرج سليما من هذه التجربة . اننا نعرف ان النيزك الكبير الذى يرتطم بالارض اليابسة يسبب حفرة ، لكنها حفرة ليس فيها من بقايا النيزك شيء . ومثل هذا المصير يحدث ايضا لاي جسم شبيه يسقط فى الماء . ولكن ، دعنا نذكرك ثانية اننا نتعامل مع واقعة غريبة عنا تماما .

ستحدث لا شك طرشرة هائلة . طبيعى ان الطرشرة هى المعادل المائى لعملية تكوين الحفرة التى نتوقعها على اليابسة . وفى مقدورنا ان نقدم تخمينا معقولا لسلسلة الاحداث التى شغلت المليليثوانى الاخيرة من وجود الكويكب .

ما ان تقابل المياه حافة مقدمة الكويكب الا وتكون حركته قد بطأت . لكن بقية الجسم سيستمر فى التحرك بسرعة قريبة جدا من السرعة الأصلية . تنتقل هزة الاصطدام الى الخلف خلال الجسم ، لكن الموجات الناقلة ستتحرك بسرعة الصوت ، وسرعة الصوت داخل الجسم ستكون أكبر بكثير من سرعته فى الهواء ، ولكن ، لما كنا نفترض ان الجسم يتحرك بسرعة تبلغ ٦٠ ضعف سرعة الصوت فى الهواء ، فمن المحتمل الا يتلقى الماء اية موجات ضغط امامية ، لا ولن يتلقاها ايضا معظم باطن الكويكب .

تخيل ان شخصا قفز وجلس على ظهر الكويكب اثناء مروره بعيدا فى أعماق الفضاء كى يصل الأرض فى رحلة مجانية . تصور ايضا انه تحمل تسخين الغلاف الخارجى لهذه الكتلة الصخرية الى حرارة تبسلغ ثلاثة اضعاف حرارة الشمس . ان يقابل هذا الملاحظ ازعاجا طيلة الرحلة حتى لحظة وصوله الأرض على ظهر مركبته الفضائية الى ان تصله موجة الصدمة ، عندئذ سيصيبه الاحباط عندما يتبخر ويتبخر معه ما بقى من جواده الكونى المطهم . ستحدث هذه الواقعة الاخيرة بعد نصف ثانية تقريبا من اصطدام الحافة السفلية بالماء ، ولن يجد من الوقت ما يكفى كى يسجل لنا رسالة تفيدنا ، يصف فيها ما حدث .

سيتشوه الكويكب عندما تسطح حافته السفلية وتضغط فى تجويف يتشكل داخل الماء . فلك تذكر ان الماء سيكون فى حالة غليان جنسونى اثناء اقتراب الكويكب ، وان درجة حرارة الكويكب نفسه ستكون نحو ١٨٠٠٠ درجة مئوية . اما الضغط والحرارة داخل الشريط الذى يتقابل فيه الصخر مع الماء فسيسببان تفكك كل من الصخر والماء الى مكوناتهما الذرية ، كما ستؤين الذرات - اى تجرد من الكتروناتها - لتكون سحابة

من البلازما • أما خصائص وسلوك مثل هذه السحابة البلازمية فستكون مختلفة كثيرا عن الحالات المألوفة للمادة ، حتى ليجد بنا في هذه المرحلة من الواقعة أن نعتبر وجود ثلاث كتل لا اثنتين : هناك الجسم الجامد الذي ما زال لم يتأثر ، والماء الذي لم يتأثر بعد ، ثم البلازما التي تكونت حيث تقابلا • والبلازما غاز ، لكنه غاز ذو كثافة عالية ، وسيقذف بها الى الجانبين بعيدا عن مركز الاصطدام • سيفقد جزء كبير من الكويكب قبل أن يصل الى قاع البصر •

ان الأثر العام سيكون أشبه بما يحدث عندما تطلق رصاصة من مدفع هوائي على حائط من الآجر • ستتناثر شظايا القذيفة ، لكنها ستسبب أيضا نقرة في الحائط •

دعنا اذن نفكر في هذه النقرة - الحفرة • نحن نفترض أن الكويكب قد سقط في شمال الاطلنطي • منذ نحو ٦٥ مليون عام كان شمال الاطلنطي اضيئ منه الآن • ربما كان عرضه عندئذ ، وفي اوسع مناطقه ، نحو ٢٠٠٠ كيلو متر ، ولقد كان مثلث الشكل تقريبا • في شماله كانت القارات ما تزال متصلة ونحن لا نستطيع أن نقدر عمقه عندئذ ، غير أنه لما كان - وما يزال - يتسع لأن ثمة صفيحتين من الصفائح التكتونية تتحركان متباعدتين ليسد الفراغ بينهما بمادة وشاح الأرض ، فمن المعقول أن نفترض أن الاطلنطي القديم كان في عمق الاطلنطي الحديث - أي نحو ٤ كيلو مترات ونحن نعرف أيضا أنه اذا ما اصطدم بالأرض جسم له الطاقة التي حسبناها ، فإنه سيسبب حفرة على اليابسة قطرها نحو ٢٠٠ كيلو مترا وعمقها ٢٠ - ٣٠ كيلو مترا • أما في البحر فان عمق الحفرة سيكون اقل لأن الصخور التي تكون قشرة قاع المحيط اكدف من صخور قشرة اليابسة • على أن الجزء الأعلى من الحفرة سيتشكل داخل الماء •

سيشكل الماء والصخر كرة نارية رهيبية الحرارة ، كثيفة للغاية ، تنتشر بسرعة على الجانبين والى أعلى ، لتعزى من قاع المحيط ما يقرب من مائتي كيلو متر قطر الحفرة • لو أن الكويكب كان يلف عند اختراقه للغلاف الجوي ، فان كرة النار البلازمية قد تلف هي الأخرى ، لتكون دينامو فائقا ينتج مجالا مغناطيسيا قويا • وسترتفع كرة اللهب الى أعلى ، لأنها تنتشر كما الهواء الساخن ، ولكن لأنه ليس ثمة اتجاه آخر يمكنها أن تتحرك فيه • سيخرج من المحيط نحو ١٢٥٠ بليون طن من الماء وتصل الى الهواء •

قدر والتر الفارس حجم المادة التي يقذف بها خارجا في مثل هذا الاصطدام بنحو ٦٠ ضعف كتلة الجسم المصطدم • وعلى هذا فعلينا في

حالتنا هذه أن نفترض أن قدرا يقع ما بين ٦٠٠٠ و ٦٠٠٠٠ بليون طن من المادة قد قذف به في الغلاف الجوي ، ومعظمه في قاع المحيط . فإذا ما وضعنا في الاعتبار عمق الماء ، والكثافة الأعلى لقشرة قاع المحيط مقارنة بقشرة اليابسة ، فسنجد أن عمق الحفرة قد يكون ٣ كيلو مقرات أو يزيد ، وربما كانت الحفرة أعمق كثيرا في فترة محدودة .

قد يبدو هذا القدر من المادة هائلا . حقا ، انه قدر هائل . لكن علينا أن نتذكر أن المحيط لا يشكل أكثر من مجرد غشاء على سطح كوكبنا . لو أن الأرض كانت مثلا في حجم البرتقالة ، فلن تمثل المحيطات أكثر من غشاء رقيق من الرطوبة فوق جزء من قشرتها ، وإن تكون الحفرة بأكثر من نقرة تافهة عليها . ليست أكبر من أحد المسام الموجودة على جلد البرتقالة . ربما ساعدتنا هذه المقارنة في تفسير ليس فقط حجم الأثر على سطح الأرض ، وإنما أيضا على هيئتها . أما المادة التي ستطرده من الحفرة في صورة بلازما ساخنة كثيفة ، فستتخذ تقريبا شكل القرص . سيرتفع هذا القرص الى السماء في شكل برميل هائل جدا - برميل من النار .

لابد أنه ارتفع بسرعة كبيرة جدا ، كالبرق . وليس من المستحيل أن يكون قد وصل سرعة الافلات ، ليضيع جزء منه على الأمل في الفضاء . وربما ارتفع قدر منه كبير الى المدى الذي يتخذ فيه مدارا حول الأرض ، هل يا ترى ليكون حلقة كتلك الموجودة حول زحل ؟ كان من الممكن أن يصنع شيئا كهذا لو أنه كان يحوى شظايا من مادة صلبة ذات أحجام مختلفة . فلو كان لمثل هذه الشظايا أن تتخذ مدارات ثابتة فإن سرعات دورانها ستكون مختلفة ، كل حسب كتلته ، والأغلب أن تكون المدارات على ارتفاعات متباينة ، ومن شأن هذا أن يفصلها حتى تكون حلقة . ومن ناحية أخرى سنجد أن مادة البلازما ستتخذ صورة غبار دقيق يدور في شكل مسحابة .

عندما يقفز البحر الى السماء ، ستندفع أمواج المحيطات من حوله لتحل محله . ستعتمد الحفرة بالماء في دقائق . اندفاع جبار للمياه من كل ناحية يكون موجات ضغط تتداخل عندما تصغر محيطاتها . عندما تتلقى الأمواه المتدفقة من المركز ، سترتفع في صورة أنبجاس ثانوى هائل - من الماء هذه المرة وليس من البلازما . ما الذي يحدث عندما يلتقى الماء البارد بالصخر المصهور ؟ لا نعرف هذا بيقين ، لكننا نستطيع أن نقول بقدر من الثقة بأن الانبجاس الثانوى سيضم قدرا هائلا من بخار الماء الفائض السخونة .

ستسبب حرارة الاصطدام في تطاير المادة عاليا في الغلاف الجوى ، لتتشأ منطقة بأسفل ذات ضغط جوى منخفض للغاية . والمفروض أن يتبلمر هذا الفراغ . ولكن كيف ؟ لو أن ارتفاع الهواء والماء كان على

درجات الحرارة المألوفة لنا ، اذن لاستطعنا ان نتقحص الظواهر الجوية لهذه الواقعة ، لكن سحابة بلازما ترتفع سريعا هي شئ يتحدى كل خيالنا .

امامنا الآن صورة ، لاضطراب هائل ، لدوامة رهيبة من الهواء والماء فوق المحيط نفسه تمتد الى الشطآن على الجانبين ، لدوى رهيب يخلف فيه ضجيج الكويكب الهابط بالنفمات النشاز ، لضوء اسطع من الشمس . يمكننا ان نتخيل سحابة ضخمة ، يبدو امامها انفجار القنبلة الهيدروجينية مجرد نفثة من دخان سحابة ترتفع فوق ساق سمكها مائتا كيلو متر تمتد الى ارتفاع عشرات او مئات الكيلو مترات ، ثم ينسبط منها على الجوانب ذيل كثيف كما لو كان ثمة سقف خفى يحدها من اعلى ، سحابة من الضخامة حتى لتصبح في حد ذاتها غير مرئية لمن يرقبها من فوق الارض ، يحتجب الجزء الاعظم منها خلف السحابة الثانوية المكونة من بخار الماء والغبار الذى حبسه الطروبوز ، تلك السحابة التى تشكل حدا لا تنخفض فيه حرارة الهواء بزيادة الارتفاع . من القمر ، ربما بدت الصورة كسحابة . أما بالنسبة للملاحظ فوق سطح الارض بعيد عن موقع الارتطام اقلت من الهلاك ، فسيبدو الأفق وقد غمرته النيران ، ترتفع النيران ، ترتفع باسرع مما يمكن لأى عين ان ترصد ، ليضئ السماء بأكملها برميل من نار !

امامنا الآن صورة ، وما ان تتبنى الصورة فى اذهاننا حتى تضطر الى ان نمحوها . اذا ما ان ينتشر الذيل الكثيف من الحطام على طول السماء وعرضها حتى يعم الظلام العالم بأكمله .

لا بد وان كانت كارثة الاصطدام مرئية على مدى واسع ، لكن انحناء الكرة الأرضية سيحجبها فى النهاية عن الأعين البعيدة ، فلم تكن هذه لترى الاصطدام نفسه ، لا ولا حتى الوهج المنعكس من اسفل السحب الذى قد كان ليحذر بان شيئا ما رهيبا يحدث فى العالم . ولكن ، لن يضى وقت طويل قبل ان تبدأ اشارات التحذير فى الوصول .

سيبعث الاصطدام موجات سيزمية خلال الارض نفسها ، وستكون هذه هى أول التحذيرات لأنها تسرى بسرعة تفوق سرعة الصوت فى الماء أو فى الهواء .

ثمة أنماط عدة من الموجات السيزمية ، لكل منها سرعته المعيزة . فالموجات الأولية هى موجات ضغط تتحرك موازية لاتجاه الانتشار . أما الموجات الثانوية فهى موجات قص مستعرضة تتحرك تقريبا فى زوايا

قائمة باتجاه انتشار الضغط . ولما كانت سرعة الموجات تزداد بازدياد كثافة الوسط الذى تنتشر فيه ، فإن كلا النمطين من الموجات يتبع سبيلا منحنيا خلال الأرض . تتحرك الموجات الأولية بسرعة أعلى قليلا من ٦٠٠٠ متر فى الثانية وحتى ١٠٤٠٠ متر ، أما الموجات الثانوية فسترى بسرعة نحو ٣٤٠٠ متر فى الثانية وحتى ٧٢٠٠ متر . ولما كانت الموجات الأولية تتحرك أسرع من الثانوية فإنها تصل مبكرة عن الثانوية . ثم هناك أيضا موجات سطحية ، وهذه تنتشر موازية لسطح الأرض ، بدلا من التحرك داخلها ، وسرعتها تبلغ ٤٠٠٠ متر فى الثانية . قد تصل الموجات الأولية والثانوية الى حدود لب الأرض لتنعكس ، كما يمكن أيضا أن تنكسر - مثلما يفعل الضوء ، وبذا فإن تتابع الاشارات التى تصل المحطة السيزمية التى ترأب الزلازل يصبح أمرا معقدا . سنهتم هنا فقط بالأفكار العامة ، كما سنتوخى البساطة فى الصورة التى سنقدمها .

للتأمل خبرة مراقب يقف بعيدا عن موقع الاصطدام - على الجانب النابيد من الأرض ، على مسافة تبلغ نصف محيط الكرة الأرضية . ستصله الموجات الأولية بعد فترة تزيد قليلا عن ٢٠ دقيقة عقب الارتطام الذى سببها ، تليها الموجات الثانوية ، لتبدأ الموجات السطحية فى الوصول بعدما يزيد قليلا عن ٨٠ دقيقة من الصدمة . ستتتثر الأرض اهتزازا محسوسا ، ولكنه على الأغلب لن يكون اهتزازا عنيفا لبعده عن موقع المراقب . ربما اهتزت الأشجار ، ولكنها على الأغلب لن تسقط . لن يكون الزلازل مجرد هزة واحدة ، وإنما سيكون هزينا طويلا يمكث ساعة أو أكثر تصل فيه الموجات الواحدة وراء الأخرى . ربما تكون الموجات السطحية أكثر عنفا مما نتوقعه فى الزلازل العادية التى تكون بؤرتها أعمق بكثير تحت السطح .

وبالرغم من انتشار طاقة الموجات بتحريك الصفوف التى تسرى فيها ، إلا أنه من المحتمل أن يكون بها من الطاقة ما يكفى كى تقوم بأكثر من دورة لو حدث هذا فستبدأ الاهتزازات بعد نحو ٢٠ دقيقة من الاصطدام لتصل الى قمته خلال الساعة التالية . ثم أنها ستتوقف نحو ساعتين ونصف ، عندما تصل الموجات السطحية مرة أخرى فى دورتها الثانية . ستصل هذه من كل الاتجاهات ، ومن المحتمل أن يتسبب الاضطراب الناجم عن التقائها فى حدوث « صورة مرآة » مصفرة لصدمة الارتطام عند المنطقة من الكرة الأرضية المقابلة تماما لبؤرة الاضطراب .

أما المجموعة الثانية التى تصل من موجات الصدمة فستتحرك فى الماء ، وبذا فلن يحس بها المراقب إذا كان واقفا على اليابسة بعيدا عن

البحر • يتحرك الصوت فى الماء العذب على درجة حرارة الغرفة بسرعة تبلغ نحو ١٥٠٠ متر فى الثانية ، أما فى مياه البحر الباردة فربما كانت سرعته ١٠٠٠ متر فى الثانية • وبهذه السرعة تصل الموجات الى الناحية الأخرى من العالم بعد ١٠ ساعات أو أكثر قليلا • لن يكون لموجات الصوت حذو الا اثر مباشر قليل ، يمكن أن يراه المراقب على اليابسة • سيصبح لون سطح البحر ابيض ، اذ تتكون فوقه مباشرة طبقة من الرذاذ : وتظهر نفس هذه الظاهرة كتحذير أول عندما تنفجر قنبلة أعماق تحت سطح المحيط • أما داخل الأمواج نفسها ، فسيكون الأثر على الحيوانات البحرية مفاجئا • سيتصطم الكثير من الأسماك التى لا تستطيع أن تتحمل التغير المفجئ الحاد فى الضغط • وستطفو جثثها على السطح أيا ما وإياها ، لتصبح غذاء لأكات الجيفة ، بينما تهملها المفترسات التى تتطلب وجود الفريسة الحية لاستثارة شهيتها للقتل والالتهام • والكثير من الزواحف الحديثة من هذا الصنف • أما العزاء الوحيد فهو أن هذه الموجات تضعف بسرعة • ولما كان للأطنطى شكل المثلث تقريبا ، فان الموجات ستتصرك فقط فى اتجاه الجنوب • وقبل أن تصل خط الاستواء ستكون على الأغلب قد فقدت قدرتها على قتل الكائنات الحساسة تقريبا • قد تكون الصدمة محسوسة فى المناطق البعيدة جدا ، بل وقد تكون مرئية ، لكنها لن تكون مؤذية •

ثم يصل الصوت • سيحتاج الصوت فترة تزيد عن ١٦ ساعة كي يصل الى الناحية الأخرى من العالم ، فموجاته تتحرك فى الهواء بسرعة تبلغ ٣٤٤ مترا فى الثانية •

على الأقل ، قد يصل الصوت • وهو اذا وصل فلن تصل موجاته المتحركة خلال الماء والهواء فى شكل انفجار واحد ، وانما فى شكل دمدمة هدير عميق قد يستمر لفترة • وليس من المستحيل أن تلف موجات الصوت بضع دورات ، مثلما تفعل موجات السطح فى تحركها خلال القشرة ، ليعود الصوت بضع مرات ، كصدى قيام الساعة • تضمحل موجات الصوت بسرعة الهواء ، ويتوقف مدى اضمحلالها على حرارة الهواء ، وعلى تردد الصوت نفسه • فالترددات الأعلى أسرع ضياعا ، وهذا هو السبب فى سماعنا للأصوات البعيدة عادة كدمدمة ضوضاء ضعيفة • نعود الى حالة مراقبتنا • الأغلب انه سيبسمع دمدمة عميقة جدا ، لأن الصوت فى تحركه على مدى نصف محيط الأرض سيفقد نحو ٧٦٠٠٠ ديسيبل فى الهواء الدافئ اذا كان تردده ١ كيلو هيرتز (أى ١٠٠٠ دورة فى الثانية) ، فاذا كان تردده ١٠٠ هيرتز فقط فسيخفض بمقدار ٦٠٠٠ ديسيبل ، أما اذا كان التردد ٢٠ هيرتز فقط فلن يفقد أكثر من ٢٠٠ ديسيبل ، لكن هذا التردد أدنى من أن ترصده اذن آدمى •

وأخيرا ، تصل موجات التسونامى – موجات المد التى لا علاقة لها بالمد – لتغمر اليابسة محطمة فى طريقها كل شئ ، تاركة خلفها الدمار والخراب ، وتربة أجدها التشبع بماء البحر المالح .

تنتج موجات التسونامى عن الصدمات السيزمية التى تتولد اسفل قاع البحر أو – فى حالتنا هذه – عنده . والحقيقة انها موجات جاذبية تنشأ عن طرشة تنتج عادة عن تحرك مفاجئ فى قاع البحر . انها مجرد موجات ضخمة كتلك التى تحدث فى « البانير » ، وهى تتحرك ببطء ، فسرعتها لا تزيد عن ١٧٨ – ٢٢٠ مترا فى الثانية (نحو ٦٤٠ – ٧٩٠ كيلو مترا فى الساعة) ، وطول موجاتها فى البحر العميق المفتوح يبلغ كيلو مترا أو أكثر ، وارتفاع الموجة على السطح لا يزيد عن متر وقد يقل . وطول هذه الموجات وسرعتها مرتبطان : فكلما ازداد طول الموجة ازدادت سرعتها . وهى تتحرك ببطء لكن تقدمها أسرع بكثير من الموجات العادية – موجات المد – ويندر أن يلحظها البحارة . انها تنطلق وسط اضطراب البحر ومعها ، وهى لا تغير سلوكها الا اذا وصلت مياهها ضحلة . وكلمة تسونامى كلمة يابانية تعنى « موجة الميناء » . فاذا ما قيدها قاع البحر قصرت موجاتها ، وازدادت سمعتها ، وقلت سرعتها – فتراكمت – لمرتفع الموجة وتشكل حائطا من الماء قد يتحرك بسرعة تصل الى مئات الكيلومترات فى الساعة ، وهى سرعة تجعل هروب الكائنات الحية أمرا صعبا .

ويبلغ ارتفاع معظم موجات التسونامى ثلاثة أمتار أو أربعة – بالرغم من سمعتها الرهيبة ، وأن كان منها موجات أكبر بكثير . فموجات التسونامى التى أعقبت انفجار بركان كراكاتو عام ١٨٨٢ ، تلك التى أهلكت المناطق الساحلية على جانبي مضيق سوندا ، على بعد نحو ١٥ كيلو مترا من كراكاتو – هذه الموجات كان ارتفاعها ٢٨٤ مترا ، ولقد أمكن رصد موجات أخرى ، نتجت عن هذا الانفجار ، على الساحل الغربى لأمريكا الجنوبية وفى هاواي ، ولكنها بعد هذه الرحلة الطويلة لم تسبب أية أضرار .

لكننا نتعامل الآن مع واقعة سيزمية أكثر عنفا بمراحل من انفجار كراكاتو . لا شك وأن قد حدثت موجات تسونامى على شواطئ المحيطات بكل مكان فى العالم ، الأغلب أن ارتفاعها قد وصل مئات الأمتار ، أن لم يكن

كيلو مترات ، على الشواطئ الأقرب لموقع الاصطدام بأمريكا الشمالية وأوراسيا .

وعلى هذا فلا بد أن العالم كله قد اهتز عندما تحركت الموجات السيزمية من بؤرة الواقعة خلال صخور الأرض . ثم تبعها موجات الصدمة التي تحركت خلال الماء . ليصل بعدها الصوت – عصف الانفجار وصداه ، وأخيرا تصل القسونامي لتسحق كل شاطئ مكشوف . لكن هذه ليست سوى الآثار الأولى المباشرة . ثمة آثار أخرى غيرها ، علينا الآن أن نتناولها .

الفصل السادس

السماء والبحر والصخر

ما ان تلاشت الآثار المباشرة للصدمة حتى ظهرت الآثار الثانوية .
ومثل هذه ستكون أقل مأساوية من الآثار المباشرة ، لكنها ستكون أهم
بكثير من وجهة نظر التطور .

ربما تكون الصدمة التى سرت الى كل مكان بالقشرة الأرضية
قد تسببت فى تحركات أرضية ثانوية تؤدى الى زلازل أكثر وإلى زيادة
النشاط البركانى . على الفور تثور البراكين التى كانت على وشك الانفجار
أو التى كانت فى سبيلها الى الانفجار على أية حال بعد بضع سنين . لكن
من المستبعد أن تظهر براكين جديدة أو تعود الحياة الى براكين خمدت
من زمن بعيد . أن البراكين هى التعبير الخارجى لتلك الضغوط التى تتراكم
فى بطء شديد على آحاد طويلة من الزمن بسبب تجمع المادة فى غرفة
للصهارة (الماجما) بعيدا عن سطح الأرض . إذ تقمع المادة نفسها -
الصهارة - تحت ضغط شديد جدا ، فتصبح ، برغم سلوكها تحت السطح
سلوك السوائل فى نواحي عديدة ، سائلا دبقا كثيفا للغاية طالما بقيت تحت
السطح . ومن المستبعد جدا أن يعجل من هذه العملية أية صدمة على
السطح مهما بلغت قوتها .

اقترح فريد هوبيل - وقد ذكرناه سابقا ، فهو الرجل الذى وصف
نوايا المذنبات بأنها « كرات ثلج قذرة » - اقترح أنه اذا دخل شمال
الأطنطى جسم قطره عشرة كيلو مترات بسرعة ٢٠ كيلو مترا فى الثانية،
فانه يثقب قشرة المحيط ثقباً قطره نحو ١٠٠ كيلو متر . وهو يعتقد أن
مواقع الصدمة كان على حيد وسط المحيط أو قريبا منه جدا ، وأن النشاط
التكتونى الذى نبهته الصدمة قد أدى الى ظهور آيسلنده .

ربما كان علينا أن نقول كلمة عن بنية الطبقات الخارجية من الجزء
الجامد من الأرض . من المعتقد أن الصخور العليا تشكل صفائح صلبة
- صفائح تكتونية - تتحرك على سطح وشاح من مادة تسلك سلوك السائل .

ومادة الوشاح بادئ ذي بدء أكثر من الصفائح الصلبة التي تعلوها .
والحركة داخل الوشاح بطيئة جدا وتتحرك الحرارة فيه بالحمل الحراري ،
تماما كالسوائل المألوفة . وإذا ما تحرك الوشاح من الضغط العالي - كما
يحدث في الانفجارات البركانية - فإنه يتدفق مثلما السائل ، لكنه سائل
يختلف كثيرا عما نفهمه عادة من كلمة « سائل » . لأنه مثلا لا يشبه الماء
على وجه الإطلاق . وربما كان علينا أن نجد بديلا للكلمة « قشرة » ، لأن
الأرض لا تشبه على الإطلاق قشرة الفطيرة ، فهي غطاء صلب يغطى
سائل .

ثمة حد واضح بين قشرة الأرض والوشاح ، يطلق عليه اسم « حد
موهوروفيتش » ، أو « موهر » ، اختصارا - على اسم الجيوفيزيقي الكرواتي
الذي اكتشفه . لكن علينا أن نتذكر أنه حد ما بين مادة عليا كثيفة ومادة
سفلى أكثر كثافة بكثير . وعلى هذا فعندما يتحدث هوبيل عن « ثقب
القشرة » فلا يجب أن نتصور ثقب قشرة فطيرة أو قشرة الثلج فوق بحيرة .
إنما هو إزالة للمادة العليا وحتى عمق يكفي لكشف السادة الأسخن
والأكثر . لو أن هذا قد حدث ، فلا شك على الإطلاق في أن التقاء الماجما
الساخنة مع ماء البحر البارد - أو حتى الذي يغلى - سينتج انفجارا
هائلا ، عندما تندفع المياه لتحل محل ما ضاع في سحابة البلازما .

على أية حال ، تقع أيسلنده على قمة حيد منتصف المحيط على قمة
بركاني طولى يثبت نفسه بما ينتجه من حمم ويناابيع حارة وطين يغلى . من
الصحيح أن أيسلنده لا تزال تنمو - ولقد ذهل العالم لما ثبت له هذا
عندما ظهرت جزيرة سيرتزي من المحيط قرب شاطئ أيسلنده منذ
عشرين عاما ونيف . وأيسلنده بالطبع موقع مثير بالنسبة للجيولوجيين
- لأنها ترقد فوق بركان طولى - ولقد درست دراسة ضافية ، فلم يعثر بها
على أية صخور عمرها يزيد عن ٦٥ مليون سنة . بزغت أيسلنده من
البحر عقب انفجار بركاني هائل حدث منذ نحو ٦٥ مليون سنة .

هذه حقيقة ثابتة ، سواء وافقنا هوبيل أو لم نوافقه على أن ذلك كان
بسبب ارتطام كويكب ، أو أسهم فيه كويكب . قد تبدو فكرة هوبيل متطرفة ،
ولكنها ليست كذلك . ثمة كثير من الحفر الكبيرة التي تحوى جبالا في
مراكزها - القمر معتلء بمثل هذه الحفر . هل نجرؤ على الافتراض بأن
أيسلنده البركانية هي مجرد جبل في مركز مثل هذه الحفرة الأرضية ؟
لا أحد يعرف ، طبعاً ، لكنه احتمال مثير .

ربما ثقب الكويكب قشرة الأرض . تتكون قشرة المحيط من صخور
أكثر من صخور قشرة اليابسة ، وبذا فمن المحتمل أن تكون القشرة

فى قاع البحر أضحل بكثير من الحفرة على اليابسة • اكتشف هذا الفارق بين كثافتى القشرتين عندما قورنت القوة المغنطيسية فوق النوعين • كان من المعروف عندئذ أن القشرة بقاع المحيط أرق سمكا من قشرة اليابسة •

نمة مناطق يبلغ فيها سمك قشرة اليابسة نحو ٤٠ كيلو مترا ، لكن متوسط سمك قشرة قاع المحيط هو ٧ كيلو مترات فقط • وعلى هذا فإذا كانت للصخور نفس الكثافة ، فإن الجاذبية ستكون أكثر قليلا فوق قششرة اليابسة عنها فوق قشرة قاع المحيط • لكن هذا فى الواقع ليس صحيحا • وهذا لايعنى إلا أن كثافة ٧ كيلو مترات من قشرة قاع البحر تعادل كثافة ٤٠ كيلو مترا من قشرة اليابسة • إذن ، فصخور قشرة قاع المحيط أكثر كثافة مرة من صخور قشرة اليابسة • فإذا كان الاصطدام كهذا الذى تعالجه الآن أن يسبب حفرة عمقها ما بين ٢٠ الى ٣٠ كيلو مترا فى قشرة اليابسة، فعلينا أولا أن نطرح عمق الماء قبل أن نهتم بكثافة الصخر • عندئذ سنجد أن المعادلة لحفرة العشرين – الى – ثلاثين كيلو مترا على اليابسة هو حفرة عمقها ٢٨ – ٥٤ كم فى قشرة محيط تقع تحت أربعة كيلو مترات من الماء • هذه هى الحفرة النهائية ، لكن الأثر الفيزيقي للصدمة سيصل الى أعماق من هذا بكثير ، ربما الى عشرة كيلو مترات أو أكثر • لن يفترق الكويكب إذن صخور القشرة – فلن يتبقى منه إلا القليل – لكنه قد يحرر بعضا من مادة الوشاح عن طريق تبخير جزئى لصخوره السطحية •

لا بد أن الاصطدام قد سبب نقرة هائلة فى السطح • دعنا ننسى الآن أن أيسلنده قد تكون راقدة فى مركز حفرة ، ولنلتفت الى الحفرة نفسها • أين هى الآن؟ المؤكد أننا لا بد أن نجد بعض الآثار لمثل هذه الواقعة الكارثة، شيئا أكبر من مجرد بعض التلوث الكونى فى صلصال التخوم •

لا نستطيع أن ننكر أننا إذا وجدنا حفرة لها الحجم والعمر الملائمان، وفى الموقع العقول ، فإن هذا سيعضد نظرية الاصطدام تعظيدا كبيرا • لكن غيابها لن يضعف النظرية الى الحد الخطير •

قد تكون الحفرة موجودة ولكننا لم نعتبر عليها ، بل الحق أننا قد لا نعتبر عليها أبدا • إذا ما كان الكويكب قد سقط فى المحيط العميق – كما نقترح – فسيصعب أن نجد الحفرة التى صنعها • ثمة خرائط ممتازة لدينا لقاع المحيط لم تكن موجودة من أعوام قليلة مضت ، لكنها تموى الكثير من المواقع الفارغة ، وماء هذه أمر بطيء يكلف الكثير • صحيح أن شهبتنا النعمة للمعادن ، واحتمال وجودها فى المخزون الوفير بقساع المحيط قد يشجع شركات التعدين الباحثة عن الثروة ، فتسرع من دراسة هذا القاع وأن تدفع التكاليف ، لكن ، حتى مع هذا ، ستمر سنين طويلة

قبل أن ترسم خريطة للمحيطات فى مثل وضوح خرائط القارات • ثم ان المعلم الذى نبحث عنه ربما يكون قد أختفى •

ان تزايد اتساع قاع شمال الاطلنطى ، الذى ظل وما يزال مستمرا منذ ما قبل نهاية العصر الطباشيرى ، يعمل على فصل القارات – لكن القارات التى نتحدث عنها هنا ستشمل أجزاء منها غرقت تحت مياه المحيطات : الرفوف القارية التى تشكل الحواف الواطئة للقارات نفسها • وهذه الرفوف تغمرها مياه تعتبر ضحلة ، مقارنة بالقاع العميق لموسط المحيط – وتغذيها أنهر تنقل لها الغرين ، وليس هناك من سبب يدعونا لنفترض انها كانت منذ ٦٥ مليون سنة مضت أصغر مساحة ، أو انها كانت تترقد عندئذ تحت طبقة اقل عمقا من الرواسب التى تصلها أساسا من اليايسة • لو كان هذا صحيحا ، فان الماء الذى سيدفع ليملا الفجوة عقب الاصطدام سينقل معه بالتاكيد كميات ضخمة من رمال وطين منجرف من مناطق أخرى بقاع المحيط • وعلى مدى الخمسة وستين مليون عام التى مضت منذ ذلك التاريخ لا شك وان قد وصلت كميات أكثر من الرواسب • فاذا كانت الحفرة تقع فى اعماق المحيط فمن الجائز أن تظل مخفية ، واذا ما كانت فى المياه الضحلة على رف قارى فربما تكون قد دفنت تحت طبقة سميكة من الرواسب •

ولو كان الكويكب قد سقط على اليايسة كما يعتقد فريق الفارس ، فالأغلب أننا لن نجد لحفرته الآن أثرا • ستكون حافتها وقد تاكلت بسبب الجو ، وفجوتها وقد امتلأت ، والمنطقة من حولها وقد تسطحت ، وربما تكون قد التوت وانشنت نتيجة ما حدث من تحركات تالية فى قشرة الأرض • ان الحقيقة هى ان قشرة الأرض متقلبة لدرجة يصعب معها أن توفر سطحا سليبا يسمح ببقاء سجل ثابت لتاريخ مثل هذه الوقائع العارضة •

لا نعى بهذا أنه لا توجد مثل هذه الحفرة • فهناك الكثير من حفر الارتطام ، وبعضها قديم واسع • غير أن اكتشافها أمر صعب ، فالكثير منها لا يفصح عن هويته الا اذا صورت المنطقة التى يوجد بها من الجو ، عندئذ ستبدو كتشكيلات دائرية هائلة لا يستطيع الملاحظ على الأرض أن يكتشفها ، ان قد يحجبها مثلا كساء نباتى كثيف • ومن المشكوك فيه أن نستطيع أن نتبين ونحن على الأرض حفرة قطرها ٢٠٠ كيلو متر فى غابة استوائية بجنوب أمريكا ، بل اننا نحتاج حتى فى منطقة التندرا الكندية مثلا الى اعمار صناعية لنكتشف وجود حفرة اصطدام اذا لم نكن نعرف بوجودها مسبقا •

لتحرك الصخور اثر آخر • رأينا ان السطح الخارجى الصلب للأرض لا يتكون من مجرد طبقة وحيدة من المادة ، كالجلد ، وانما من عدد من

الصفائح ، المكونة من الصخور الجامدة ، تطفو على سطح مادة أكثر كثافة وأكثر مرونة . فتحرك هذه الصفائح . ولأنها تتحرك - وبالرغم من أنها تهيم سطحا متصلا للكوكب ، فليس ثمة ثقوب بالقشرة - فالسطح يتبدل باستمرار . فى بعض المواقع تنزلق الصفائح بعضها على بعض - ودائما فى شكل هزات - وفى مواقع أخرى تتحرك الصفائح سويا ثم تتجدد احداها لتشكّل الجبال ، ثم ثمة مواقع أخرى قد تتركب فيها صفيحة ظهر المجاورة لها فينشأ حد - ضاعت عنده صفيحة - ضغطت ودفع بها الى اسفل ، الى وشاح الأرض ، حيث تصهر صخورها ليضيع منها أية سجلات قد تحملها ، وتحطم الى الأبد .

من المنطقي أن نفترض بأن كل المادة التي تكون قشرة الأرض سيدفع بها - بمرور الزمن - الى الوشاح لتحل محلها مادة جديدة . ويبدو أن الوضع كان هكذا طيلة تاريخ الأرض ، فليس ثمة منطقة وجدت من قاع المحيط يزيد عمرها على ٢٠٠ مليون سنة . وهناك فرصة معقولة - على مدى ٦٥ مليون سنة - أن يبتلع فى الوشاح معلم فى مكان ما بقاع المحيط يقع فوق حد صفائضى مدمر . (وهذا لا يسرى على البحار الضحلة - كالبحر الأبيض المتوسط وبحر الشمال - التي نشأت فى منخفضات القشرة القارية لا فى قشرة المحيطات) .

ذكرنا سابقا أن شمال الأطلنطى ما يزال يتسع منذ ما قبل نهاية العصر الطباشيرى . أما سبب هذا الاتساع فهو حركة صفيحتين تتباعدان ، وفى حركتهما يمتلئ الفراغ بينهما بمادة جديدة من الوشاح ، وبذا يتجدد القاع على طول الزمن . وليس ثمة منطقة ابتلاع فى شمال الأطلنطى ، وليس ثمة جزء من القشرة يتحطم هناك . هكذا تبدو العملية هادئة ، لكن الماجما لا تصل السطح فى هدوء . أن ثورة مادة الوشاح - بالتعريف - هى حادثة بركانية . لو أن حفرة تكونت عبر منطقة اتصال الصفائح ، فإن حركة الصفائح ستقسم الحفرة الى قسمين ، ثم قد تندثر حوائط الحفرة بسبب الانفجارات البركانية ، ومن الجائز جدا أن يمتلئ المنخفض - لحد ما - بصخور جديدة . فحوائط حفرة كانت تتباعد بمقدار ٢٠٠ كيلو متر ، يصبح البعد بينها الآن ١٠٠٠ كيلو متر أو يزيد ، ثم اذا كانت الحوائط قائمة ، فسيصعب تمييزها من سلاسل الجبال الصغيرة تحت البحر .

طلبنا منك أن تقبل مؤقتا تأكيدنا بأن الكويكب قد سقط رأسيا تقريبا ، وأنه قد سقط فى شمال الأطلنطى . وسنقوم الآن بالدفاع عن زعمنا هذا .

لماذا نفترض أن الجسم قد سقط رأسيا ؟ فمن الجائز على أية حال أن يكون قد دخل الغلاف الجوى فى مسار منحرف بعض الشيء ، ليهبط

الى السطح بشكل اضحل . أيجوز أن يكون قد قام بأكثر من دورة حول الأرض قبل أن يسقط على سطحها ؟

لابد أن نسألك أولا أن تتأمل هندسة الاقتراب . لعلك واجد أن أفضل طريقة للبداة هي أن تتخيل البدر كما يبدو من فوق الأرض . تأمل مشكلة أن تصيبه بقذيفة من بندقية معك . يبعد القمر عنا بنحو ٤٠٠٠٠٠ كيلو متر، وهو يمثل هدفا نصف كروي ، تماما كما ستبدو الأرض من بعيد بالنسبة لجرم يقترب منها . ان المسافة بين حافتي القمر التي ستصوب اليها قذيفتك زاوية ضيقة جدا . ستكون محظوظا بالفعل ان أنت أصبت القمر أصلا . ان احتمال أن تصيب مركزه ، أو أية منطقة قرب مركزه ، هو احتمال جد ضئيل حقا . والأغلب أنك قد تصيب مكانا آخر خارجيا قرب الحافة . ولأن الهدف هنا له ثلاثة أبعاد لا اثنان فإن هذا يعنى أن وصول القذيفة سيكون بزاوية ضحلة بالنسبة للسطح .

يبلغ قطر الأرض ١٣٠٠٠ كم ، وعلى هذا فإن مساحة نصف الكرة الأرضية يبلغ نحو بليون كيلو متر مربع . وهذا الرقم يبدو هائلا حتى بالنسبة لأقل الرماة مهارة . والهدف هنا من الحافة للحافة يبلغ أكثر قليلا من ٢٠٠٠٠ كم . غير أننا لا يصح أن ندخل كل هذه المسافة في حسابنا ، لأن أى جسم يقترب بسرعة عالية جدا نحو الحافة سيخطئ الهدف تماما، على الأغلب . وبذا فريما كان لنا أن نسمح فقط بمسافة ٨٠٠٠ كم من مركز نصف الكرة كحد خارجى يمكن للجسم أن يصيبه عمليا . ان العامل الحاسم هنا هو طول الفترة التي تستغرقها القذيفة فى مسارها داخل الغلاف الجوى ، وهذا ما نستطيع حسابه . يبلغ العمق الرأسى للغلاف الجوى نحو ١٥٠ كم . اعتبر أن هذا هو ارتفاع مثلث قائم الزاوية ، وأن طول قاعدة المثلث هي ٨٠٠٠ كم . هنا سنجد أنه اذا ما تحركت القذيفة على طول وتر المثلث فانها ستسير خلال نحو ٨٠٠٠ كم من الهواء وبسرعة تبلغ ٢٠ كم فى الثانية . وهذا سيستغرق نحو ٧ دقائق ، أما اذا تحركت فى مسار عمودى فلن تستغرق الا ٧ر٥ ثانية فقط .

عندما تخترق القذيفة الهواء ، سيتسبب احتكاكها بجزيئات الهواء فى تسخينها وفى فقدانها الحرارة ، وقد تتحطم . وتحرر قدر كبير من الحرارة الى الهواء يدمر الغلاف الجوى ، اذ يسخنه بشدة ، مسببا التفاعلات الكيماوية داخله ، وتاركا به بعض مادته . ومن الصعب أن نتخيل كيف يستطيع أى كائن حى أن ينجو من انفجار هوائى كهذا . والانقراض كما نعلم لم يكن تاما ، فقد بقيت بعده كائنات حية ، وبقاء هذه الكائنات هو الذى يندفعنا الى القول بأن ما حرر من طاقة القذيفة فى الغلاف الجوى

نفسه كان قدرا أقل، وبذا فلا بد أن الزمن الذي استغرقته التغذية خلال الغلاف الجوى كان أقل ، وأن زاوية دخوله كانت أكثر انحدارا .

ماذا إذن لو كان الجسم قد ألقي به بالصدفة فى مدار لولوى حول الأرض ، فتنخفض زاوية هبوطه الى مجرد درجات قليلة ، كما تنخفض ايضا سرعته ، بحيث يسلك سلوك مركبة فضائية عادية ؟ ولابد أن تنخفض السرعة ، اذ يكاد يكون من المستحيل أن ينطلق جسم بسرعة ٢٠ كيلو مترا فى الثانية فى مدار حول الأرض ، ذلك أن الجسم اذا وصل هذه السرعة فإنه سيطير بعيدا الى الفضاء الواسع . وعلى هذا فإذا افترضنا أنه دخل فى مدار أخذ يتناقص حتى أوصله يبطء الى سطح الأرض ، فلا بد لنا أن نبتكر وسيلة ما تخفض من سرعته قبل أن يصل الى جدار الأرض . ونحن لم نتمكن من هذا ! ولو أن هذا قد حدث رغم كل شيء ، إذن لنجست عن ذلك نتيجة من اثنتين : اما أن يكون الجسم قد تحطم - وهو الأمر الأكثر احتمالا - وهو بعد على الحدود الخارجية للغلاف الجوى ، فانتثر الى سحابة من الحطام ، يسقط البعض منها فيما بعد ، واما أنه قد بطؤ للحد الذى يسقط معه كاملا على الأرض ، وعندئذ سيظل باقيا حتى الآن ككتلة ضخمة من المادة الصلبة .

ان تصورنا للأثار المباشرة الناجمة عن الاصطدام يتركز على حسابنا للقدرة الطاقة التى يحويها الكويكب ، فالجسم يحوى نفس القدر من الطاقة بغض النظر عن الزاوية التى اقترب بها من الأرض ، لأن هذا القدر تحدده الكتلة والسرعة . وفى مروره خلال الغلاف الجوى ، فالمحيط ، ثم فى قشرة الأرض ، سيفقد الجسم طاقته الى أن تنتهى جميعا آخر الأمر . فإذا افترضنا أنه دخل بزاوية ضحلة جدا فافتراض أنه مكث وقتا أطول فى الهواء ، لينقل بذلك قدرا كبيرا من طاقته فى الهواء نفسه . ثم انه كان سيسخن كثيرا بالاحتكاك ، وربما ابتدا فى التكسر الى شظايا كبيرة ، تسقط كوابل على مساحات واسعة جدا . بل وربما أنهى وجوده ليس كانهجار واحد ، وانما كحزام من الحطام منتشر حول الأرض ، وهنا ، لن يكون علينا أن نبحت عن حفرة ، فمثل هذا الوصول لن يصنع ثمة حفرة .

وليس من المستحيل أن يصل بهذه الطريقة مذنب - من ثلج معظمه - ولدينا فكرة عما سيحدث عندئذ ، ذلك أن منطقة تونجوسكا بسiberia قد خبرت مثل هذه الواقعة سنة ١٩٠٨ (أرجع للفصل الثانى) ، وفيها وجدنا فى جوار موقع الاصطدام عددا من الحفر الصغيرة يتراوح قطرها ما بين ٥٠ و ٢٠٠ متر ، لا حفرة واحدة - الشيء الذى يشير الى أن الجسم قد تحطم فى الهواء . فى تلك الواقعة قتلت الحرارة كل الحيوانات

فى منطقة بلغت ١٠٠٠ كيلو متر مربع . وتقدر كتلة هذا المذنب - الذى يعتقد البعض انه السبب فى هذا الدمار بنحو ٥٠٠٠٠ طن فقط . والواضح انن ان كويكبنا الاكبر حجما لابد وان كان سيؤدى الى دمار اكبر بكثير .

سيفقد كويكبنا كل طاقته تقريبا فى الهواء نفسه ، فيسخن الهواء ، كما يسخنه الهواء . ومثل هذا التسخين الشديد - وتذكر اننا نتعامل مع طاقة ١٠٠ تريليون طن من مادة ت ن ت ، سواء افردت عند الاصطدام ام لم تفرد - مثل هذا التسخين سيجعل الحياة مستحيلة ، وليس فقط بالنسبة للأنواع التى انقرضت ، وانما بالنسبة لكل كائن حى . سيحترق الكساء النباتى ، اما الحيوانات فستطبخ (بالمعنى الحرفى للكلمة) ، ولابد وان كانت الكائنات الدقيقة ستحطم فى مواطنها المعقدة .

لا ، وليس هذا كل شيء . تشع النيران الصغيرة قدرا معينا من الطاقة ، لكن اثرها على المادة من حولها يحدث اساسا عن طريق النقل أو عن طريق التسخين البطيء نسبيا ، الذى يجعل المادة القابلة للاحتراق تدخن بلا لهب قبل ان تبتدىء فى الاحتراق . ومثل هذه النار تنتشر بسرعة على ما يبدو . لكن ، من الممكن ايضا ان تنتشر النار بأسرع حتى من هذا ، ذلك انه اذا ما تجاوزت طاقة النار حدا معلوما ، غدت الحرارة المشعة من الشدة حتى لتبدأ المواد البعيدة عنها فى الاشتعال ، مضيفة بذلك الى كمية الاشعاع الحرارى . ان هذا الاشعاع هو ما يقوم بنشر النيران . وتكون النتيجة ان تمتد النار فى لمح البصر - كالانفجار . عرفنا مثل هذه النيران - فى الحرب العالمية الثانية كان للقنذ المركز للمدن بالمقابل الحارقة هذا الأثر الرهيب . ومن المحتمل جدا أن يكون الاحتراق الهائل الذى حدث فى تونجوسكا قد نتج عن واقعة لانتشار النار بالاشعاع . فاذا ما كان لكويكب ضخمة أن ينقل طاقته الى الغلاف الجوى - وتذكر ان حرارة سطحه كانت ثلاثة أمثال حرارة سطح الشمس - فمن المستحيل أن يبقى على وجه الأرض كائن حى . بل الحقيقة أن الغلاف الجوى قد يحطم هو الآخر .

لكنه لم يحطم - هذا ما سنثبتته الآن . صحيح أن الأثر على الكائنات الحية كان فاجعا ، لكن البعض قد نجا . استمرت الحياة . علينا انن ان نحصر الكارثة لتصبح واحدة مما يمكن النجاة منها .

ثمة صعوبة أخرى تواجهنا فى نظرية الهبوط الضحل . فحتى لو تصورنا الجسم وقد دخل بطاقة أقل بكثير فلم ينفجر بعنف فى الهواء (كما نتوقع اذا ما اقترب مذنب فى مسار مواز تقريبا لمدار الأرض نفسها،

وبسرعة نسبية منخفضة) فانه لن ينشر ما يكفى من معدنى الايريديوم والاوسميوم بالشكل الذى نجده . ان اقترابا طويلا ، يتشظى فيه الكويكب فيصل الأرض دون اصطدام كبير ، سينتج عنه توزيع مادة هذا الكويكب فى مساحات محددة - اما فى منطقة بذاتها أو ربما فى صورة حزام حول العالم أو عبر قارة أو محيط ، ولكن يصعب أن نفهم كيف يمكن له أن ينشر نفسه - كما فعل - فوق الكرة الأرضية بأكملها . فإذا كان هذا قد حدث برغم ذلك ، فإن علينا أن نراجع أفكارنا عن تركيب المذنبات كى نسمح بوجود القدر الذى نعرفه من المعادن . وهو أمر على أية حال أقل لا معقولة . مما قد يبدو ، وسنعود إليه فى الفصل العاشر .


نخلص من هذا إذن الى أن الجسم قد اقترب من الأرض بزاوية شديدة الانحدار ، وأنه قد تحطم عند الاصطدام ، وأن الاصطدام قد تسبب فى حفرة ، بالرغم من أننا لم نعثر لها على أثر .

لماذا افترضنا أنه سقط فى شمال الأطلنطى ؟ دعنا نرجع الى توزيع المعادن الثقيلة فى صلصال التخوم . لعلك تذكر فى مشروع الحفر العميق بالباسيفيكي أن صلصال التخوم باللب كان غنيا جدا بهذه المعادن . ولقد كان الصلصال بنيوزيلنده أغنى من هذا ، ثم أنه كان أكثر ثراء فى اسبانيا وإيطاليا . أما فى الدانيمرك فقد كان ثراء الصلصال بهذه المواد أكبر بشكل هائل . كان صلصال نيوزيلنده فى الواقع يحوى من هذه المعادن ٢٠ ضعفا لمتوسطها فى قشرة الأرض ، أما الصلصال الايطالى فكان يحوى ٣٠ مثلا ، لكن صلصال الدانيمرك يحوى ١٦٠ ضعفا أو أكثر . ان تصورنا لما حدث لابد أن يفسر هذا التباين : ونحن نعتقد أن سقوط الجسم فى شمال الأطلنطى يفسر هذا .

دعنا نرجع الى سحابة البلازما الهائلة التى تركناها ترتفع فوق موقع الاصطدام . ماذا سيحدث لها ؟ ماذا سيحدث للمياه المندفعة ، عندما تلاقى الصخور المنصهرة . اننا لا نستطيع أن نعرف ما قد يحدث تحت ظروف كهذه - لا ولا نستطيع حتى أن نخمنه . لم يقم أحد - لحد علمنا - بدراسة ظواهر السحب البلازمية ! ان دراسة الظواهر الجوية للهواء الأرضى العادى فيها من التعقيد ما يكفى دون أن نضيف إليها ديناميكا المغنطيسية المائية ! ان علينا أن نكتشف مثلا ماذا يكون أثر جذب الغازات نحو منطقة منخفضة الضغط ، تحاول فيه قوة كوريوليس (القوة المتعامدة على اتجاه الحركة الناتجة عن دوران الأرض) أن تحولها الى اتجاه ، بينما يحاول مجال مغنطيسى شديد أن يحولها الى اتجاه آخر . قد يحدث أى شيء . أما الشيء الوحيد الذى نعرفه مؤكدا فهو أنه ايا كان ما حدث فإن نتائجه لم تكن مما تهزج له الكائنات الحية .

دعنا نفترض أن جزءا من مادة الكويكب نفسه قد قذف بها فى مدار حول الأرض . وأن جزءا آخر قد احتجز على الغلاف الجوى ، بينمابقى جزء ثالث الطروپوسفير (انظر صفحة ١٢٩) من الواضح أن الطاقة اللازمة لحمل هذه الأجزاء الى مواقعها ستزداد بازدياد بعدها ، وبذا فقد يكون القسم الأكبر من الطاقة من نصيب الجزء الذى دخل فى مدار مع سحابة البلازما أو بقاياها . ماذا حدث لكل هذه المواد ؟ بالنسبة للجزء الدائر فى فلكه : سيهبط فى بطنه ، على فترة تصل الى سنين ، فى شكل سحابة تغلف الكرة الأرضية بأكملها ، أو فى صورة حلقة - تبعا لطريقة توزيع المادة فى مدار حول الأرض ، فلابد أن نوافق على أنها قد هبطت، إذ لا يوجد الآن ثمة مدار كهذا . أما المادة الموجودة فى أعلى الغلاف الجوى فلابد وأن قد سقطت بالمندرج - ولكن قبل هبوط المادة المدارية - لتوزع بالتساوى حول الأرض ، وأن كانت قد تجمع فى أحزمة عرضية مميزة . وسيكون سقوط المادة بالغلاف الجوى السفلى هو الأسرع . وما نعرفه عن الغبار المتساقط - من مداخن المصانع ، ومن الانفجارات الذرية، ومن البراكين - يدفعنا الى الفرض بأن معظمها سيسقط على مخرية من المنطقة التى أطلق منها فى الهواء . تتناقص كثافة الغبار المتساقط بسرعة بازدياد البعد عن موقع الاصطدام . والأكثر من ذلك أن المادة الأقل طاقة بأسفل الغلاف الجوى ستبرد بسرعة لتصل الى درجة حرارة تكثف بخار الماء الموجود داخلها . لكننا لا نستطيع أن نعطي وصفا موثوقا به لحالة الهواء فوق المحيط عقب ارتفاع برميل النار ، بسبب الصعوبة التى نلاقيها مع حسابات ظواهر البلازما ، لكننا نعرف أن الهواء قد عاد الى طبيعته ، ربما بعد فترة قصيرة ، وأن الأمطار قد غسلت جزءا كبيرا من الغبار الموجود بالهواء .

لن نضل كثيرا إذا تصورنا الواقعة حادثة لاطسلاق رصاصة من بندقية : تنطلق الرصاصة من البندقية ، وسيلمع أيضا وميض عند الفوهة - بعض من لهب يتألف من نواتج الاحتراق الساخن لانفجار البارود . وميض الفوهة يمثله فى حالتنا هذه سحابة البلازما وهى تقفز الى أعلى داخل الغلاف الجوى ، حاملة معها ما يوازى نواتج الاحتراق - وهى الآن معظم المواد التى يتكون منها الكويكب بالإضافة الى ماء البحر . أما الطلقة نفسها فتمثلها المفلوظات - نعنى ماء البحر وصخور قاع المحيط التى قذف بها فى الهواء . ثم أن وميض الفوهة سيترك البندقية بسرعة أعلى من سرعة القذيفة . لكن الى هنا تنتهى أوجه الشبه ، لأن سحابة البلازما تحتفظ بمعظم طاقة الواقعة . وستسقط المفلوظات ثانية فى البحر . لتتحرك الى المناطق الساحلية للقارات على الجانبين ، كما أنها ستسقط بسرعة كبيرة . أما سحابة البلازما فستتكتف . فإذا افترضنا أن مركزها



هذا هو قاع المحيط الأطلنطي كما نجده اليوم ، يمتد
بوسطه جند الاطلنطي وتستقر ايسلنده شماليه .

كان كثيفا جدا ، فلذا أن نتوقع أنها ستتكتف الى قطرات كبيرة ، وهذه ستهبط بسرعة ، قريبا من موقع الاصطدام .

وعلى هذا فإن غبار الحادثة سيتوزع في تركيز عال نسبيا حول موقع الاصطدام ، ليقترأص التركيز بسرعة كلما ابتعدنا عن الموقع ، ثم ينتشر بالتساوي تقريبا حول بقية الكرة الأرضية غير أنه بالرغم من الفارق الواضح في التركيز بين المادة القريبة من موقع الاصطدام وتلك الموجودة بعيدا جدا عنه ، فسيصعب تفهم السبب في ذلك الشذوذ الواضح الذي نجده عندما نقارن الصلصال بالداينيمرك وأسبانيا وإيطاليا . علينا أن نكتشف آلية تسبب تركيز الغبار بعد سقوطه على السطح . يمكننا أن نتخيل آلية كهذه تعمل بالمحيط ، لكن حدوث مثل هذا التركيز في المادة التي سقطت على الأرض الجافة يتطلب عملية أكثر تعقيدا ، ستكون على العموم أقل اقناعا .

إن الأسهل أن نفترض أننا نتعامل مع حادثة وقعت في نصف الكرة الشمالي ، لأن أعلى تركيزات الحطام توجد بالنصف الشمالي للكرة الأرضية . ليس من المستحيل أن تكون الحادثة قد وقعت بالنصف الجنوبي لكن حركة هواء الطروبوسفير ضعيفة عبر خط الاستواء ، ونحن نحتاج الى حركة الهواء لنقل الغبار . قد نجد وسيلة نفسرها مثل هذا النقل في هذه الحالة الخاصة ، لكن الحاجة الى نقل المادة الى النصف الآخر للكرة الأرضية ثم تركيزها بعد ذلك ، هو قمر لا شك سيضعف المصادقية . دعنا نتفق إذن على أن الحادثة قد وقعت بنصف الكرة الشمالي ، ودعنا نتفق أيضا على أننا نتعامل مع حادثة وقعت بالبحر . ولما كان الشذوذ (نقصد الفارق في تركيز الايريديوم والأوسميوم بالمناطق المختلفة التي فحصت) موجودا فقط في أوروبا ، ولا يوجد في أية منطقة أخرى ، فمن المعقول أن نفترض أن البحر الذي وقعت به الحادثة هو منطقة شمال الأطلنطي . والداينيمرك بالطبع ليست في شمال الأطلنطي . وهي لم تكن فيه منذ ٦٥ مليون سنة مضت . إذن ، كيف وجد كل هذا الكم الوفير من الحطام طريقه الى الداينيمرك ؟

لكي نجيب على هذا السؤال علينا أن نتذكر أن صلصال التخوم في الداينيمرك مشهور باسم «الصلصال السمكي» فهو يحوى العديد من البقايا الحفرية للأسماك ، ويحوى منها أكثر من غيره في معظم المواقع . فهل كان هذا مكانا تسبح اليه الأسماك كي تموت - مثل مقبرة الأفيال الأسطورية (غير الحقيقية) ؟ الواضح أن هذا ليس صحيحا ، فالأسماك لا تسبح لتموت في ماوى مفضل . هل كانت الطسروف في البحر - الذي كان عندئذ الداينيمرك - قاتلة للأسماك التي تدخله ، كان يكون ساما مثلا ؟ مرة

أخرى ، هذا أمر مستبعد لأن الأسماك مجهزة بجهاز على الحساسية يسهل أمر بقائها بعيدا عن المياه السامة . قد تقع حقا فى شرك ماء يسممها بعد دخولها فيه ، لكن ، يكفى أن يحدث هذا مرة واحدة لتجنبه الأسماك . ليس أمامنا إلا تفسير واحد . تموت الأسماك حيث توجد ، ومعظمها يموت فى المحيط ، ثم تقوم تيارات المحيط وتيارات المد بنقل الجثث بعد الموت الى الدانيمرك . أن هذه آلية لا تزال تعمل حتى اليوم . فما بين الغينة والغينة يجذب الصيادون صيدا من أسماك ميتة ومتعفنة ، هى فى الأغلب بقايا صيد سابق ، تخلص منه آخرون بالقائه ثانية فى البحر ، ثم نقل وركز فى منطقة معينة . فإذا كان للحركة الطبيعية للمياه أن تنقل الأسماك إلى « جبانة » يعينها ، فمن الممكن أن تفسر نفس هذه الآلية نقل الحطام ، الهابطة فى الماء كجسيمات دقيقة ، ربما فى بطء .

أى نوع من البحار إذن كان هذا الذى يغطى الدانيمرك ؟ لابد لنا أن نفترض بحرا تتدفق اليه المياه ثم لا تخرج ، أو تخرج منها كميات ضئيلة . قد يبدو هذا بعيد الاحتمال ، لكنه فى الواقع أمر شائع للغاية . فالبحر الأبيض المتوسط الحالى تدخله المياه المالحة من خلال مضيق جبل طارق ، كما تصب فيه مياه الأنهار العذبة ، أما البحر نفسه فلا يفقد الماء الا بالتبخير . يتبخر إذن ماؤه من السطح ليعوضه الأطلنطى ، لكنه لا يعيد الى الأطلنطى الذى يغذيه الا القليل جدا من الماء ، ان كان يعيد شيئا على الإطلاق . أما تبادل للماء مع البحر الأحمر خلال قناة السويس فيتم فى أدنى الحدود . ان الأمر يتطلب من البحر الأبيض ثمانين عاما كى يجدد نفسه ، أما البحر الأسود - الذى يغذيه البحر المتوسط - فيجدد نفسه بمعدل أبدا من هذا .

والبحر المتوسط هو ما يسميه برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة باسم « البحر الاقليمى » ، نعتى أنه بحر ضحل يكاد يحاط تماما باليابسة ، وهو ليس الا واحدا من العديد من البحار الاقليمية . ولكى نتفهم لماذا يسبب التلوث خطرا استثنائيا بالنسبة لهذه البحار دعنا نفحص بعناية موضوع ملوحة البحر الأبيض . فبالقرب من مضيق جبل طارق - حيث تدخل مياه الأطلنطى - سنجد الملوحة مساوية تقريبا لملوحة المحيط الواسع لكن الملوحة تزداد بشكل واضح كلما اتجهنا شرقا ، لأن تبخر المياه من السطح يركز الملح فى الماء المتبقى . ولما كان هذا هو ما يحدث للملح ، فلا شك أنه يحدث أيضا بالنسبة للملوثات ، وهذا بالفعل ما يحدث . فهى تركز أيضا .

من الجائز أن يكون بحرنا الدانيمركى القديم من هذا الصنف . فالأسماك الميتة ، والتلوث الكويكى ، وكل ما لا يستطیع السباحة فيقرب بنفسه التوجه الى هناك ، هذه جميعا قميئة بأن تسحب الى هذا البحر لتدفن

فيه • ولا يلزم أن تكون العملية سريعة • ثمة متسع من الوقت • كان المناخ معتدلاً فى نهاية العصر الطباشيرى • ويكاد يكون من المؤكد أن متوسط درجة حرارة الهواء فوق هذا البحر كان هو نفس المتوسط الآن فوق البحر الأبيض ، بل وربما أعلى • كان الماء يتبخّر من السطح ليحل محله ماء المحيط ، وتجمعت بالقاع تلك المواد التى نقلها الأطلنطى •

فى طين القاع لا بد وأن قد ثبت التحلل الطبيعى الذى تقسّم به الميكروبات الهوائية • ونحن نعرف هذا بسبب وجود أحافير الأسماك • فلو أن الأسماك قد تحللت بالطريقة العادية لما بقى منها شيء ليتحفر • لا بد وأن كان الماء وقد نزع منه الأكسجين ، وربما كان راكداً ، وكان النشاط بالطين مختلفاً • ولا بد وأن كان ثمة نشاط ، فغياب الأكسجين فى حصد ذاته ليس بالمعقبة أمام أعداد كبيرة من أنواع الكائنات الدقيقة ، تلك التى عمر أسلافها العالم قبل أن يكون له هذا الجو الغنى بالأكسجين • ستعمل هذه الميكروبات على محتويات الطين ، لتطلق الى سطح الماء غازات تبقّى كريهة الرائحة ، ويعملها هذا قد تحرك المعادن التى لا تحتاجها ، تاركة إياها فى مواقع خاصة • أن قيام الميكروبات بتركيز المعادن أمر موثّق جيداً ومعروف - تحت نفس هذه الظروف بالتحديد ، التى نفترض وجودها فى البحر ، الذى ردم فى نهاية الأمر ، وجف ، ليصبح الدانيمارك • اننا لا نقول أن الاصطدام قد حدث فيما هو الآن الدانيمرك ، انما نقول أن البحر الذى كان موجوداً آنذاك مكانها قد جمع الغبار من مساحة كبيرة من الأطلنطى •

من الممكن أن تترسب فى شمال الأطلنطى مادة نتجت عن حادثة وقعت فى مكان آخر • يرتفع الهواء الساخن ويهبط الهواء البارد مكوناً خلايا ، هى نموذج للحركة العمودية • ونحن نعرف مواقع هذه الخلايا فى زماننا هذا ، ولكننا لا نعرف شيئاً عن مواقعها فى الماضى السحيق • فالمادة التى رفعت فى الماضى قد ترسب فى أى مكان • اذا أخذنا هذا فى الاعتبار فعلياً أن نبحث عن مواقع اصطدام أخرى محتملة • وأول هذه المواقع هو بحر تيثيز ، الذى كان مغلقاً خلال العصر الطباشيرى - ويقع بين شبه الجزيرة العربية وأوراسيا • ولقد اختفى هذا البحر تماماً نتيجة تصادمات الكتل القارية • ليس هناك الكثير مما يمكن قوله عن حفرة بهذا البحر ، سوى أنه قد أخفى من الوجود منذ ملايين السنين • أما الاحتمال الثانى فهو البحر التيرهيلى فى حوض البحر المتوسط ، الذى تحده إيطاليا وصقلية وسردينيا وكورسيكا ، وفى مركزه توجد واحدة من أعرق مناطق البحر المتوسط • والصخور حوله تحمل معالم منشأ غير عادى ، ونعنى بهذا عادة منشأ ناتجاً عن نثار بركانى عنيف حول البحر استمر طويلاً • ولكن ، هل التاريخ البركانى لمهد الحضارة الغربية هذا هو التفسير الأوحى ؟ ان

الفكرة مثيرة ، ولكن ، لأننا لا نستطيع أن نعرف شيئا عن طريقة تحرك المادة الى الأطلنطى ، فى الوقت الذى نستطيع فيه أن نبتكر طريقة تتحرك بها المادة من الأطلنطى الى الدانيمرك ، فاننا نفضل فكرة أن يكون مكان الاصطدام قريبا من حيد منتصف المحيط .

لدينا تحليل اذن لتركيز المعادن المرتفع جدا بالدانيمرك ولتوزيعها الأكثر توازنا فى بقية انحاء العالم . ولقد حان الوقت كى نعود الآن لفترة ما بعد الاصطدام بقليل .

ما زال عمود النار والذيل الكثيف أعلاه حيث تركناهما ، وان كنا قد ازلنا من الغلاف الجوى السفلى قدرا كبيرا من المادة وأعدناه الى البحر . لكن ، ماذا عن الغلاف الجوى العلوى ، والحيز الداخلى ؟ سيكون به قدر ضخم من المادة ، حتى ليصحب ضوء الشمس تماما . سيحل الظلام على الأرض ، أو على الأقل فوق الجزء الأقرب الى منطقة الاصطدام . عندما حدث انفجار كراكاتوا عام ١٨٨٣ كان على الناس على مدى يومين ونصف أن يستخدموا المصابيح اثناء النهار ، وذلك على مدى منطقة نصف قطرها ٨٠ كيلو مترا . ما طول الفترة التى خيم فيها الظلام عقب هذا الاصطدام الطباشيرى ؟ وما حجم المنطقة التى حلت فوقها الظلمة ؟

صعب جدا أن نعرف هذا . يلزمنا عند معالجة أية ظاهرة مناخية أن نهتم بخطر العرض الذى وقعت عنده الحادثة . تقع كراكاتوا فى المنطقة الاستوائية . واثر الغبار والرماد بهواء المناطق الاستوائية على المناخ اكبر بكثير من اثره عند خطوط العرض الأعلى ، ويرجع هذا الى سلوك الكتل الهوائية . فالهواء الذى يسخن بالمناطق الاستوائية يرتفع الى أعلى ليحل محله هواء أبرد . ولما كان الهواء الأبرد موجودا على جانبي خط الاستواء ، فانه يتحرك نموه من الشمال ومن الجنوب ، وبذا تحدث دوّرتان مميزتان واحدة بنصف الكرة الشمالى والأخرى بالجنوبى . ثمة قدر بسيط من خلط الهواء يحدث حيث تلتقى - متواجهتين - كتلتا الهواء . فالمادة التى تدخل الغلاف الجوى لأحد نصفي الكرة الأرضية قد تحمل نحو خط الاستواء ، ولكنها على العموم لا تعبره . لكن هناك استثناء . ذلك انه اذا دخلت المادة الستراتوسفير قريبا من خط الاستواء ، وبها من الطاقة ما يكفى ، فقد تحمل عبر الخط الى الناحية الأخرى . عندئذ تتوزع المادة فى نصفي الكرة الأرضية كليهما . تدخل المادة اذن نظام الدوران الاستوائى الذى يحمل الهواء أساسا من خط الاستواء واليه ، وبذا فقد تحمل الى خطوط العرض المتوسط ، حيث يعمل نظام دوران آخر شمالى - جنوبى . فاذا كانت المادة مما يؤثر فى المناخ ، فسيعم تأثيرها مناخ الكرة الأرضية كلها . أما اذا دخلت المادة الغلاف

الجوى عند خطوط العرض العليا ، فمن الجائز جسدا أن تغل حبيسة موقعها ، لتؤثر فقط فى مناخ نصف الكرة الأرضية الذى توجد به . بعد أن ذكرنا هذا ، علينا أن نتذكر أننا نتعامل مع حادثة اكبر بمراحل من انفجار كراكاتوا ، وبذا فإن ما نفقده فى المدى ، سنكسبه فى الوفرة .

قدر فريق الفارس أن الظلام قد خيم على العالم زمنا قد يصل الى خمس سنوات . واقترح و . ه ماكريا أن الأمر يتطلب ٣ - ٥ سنوات كى تسقط كل المادة . لكن هذا شيء آخر . يغرينا أن نستقرئ من حادثة كراكاتوا نفترض أن الظلام قد استمر أضعافا بقدر النسبة بين حجم المادة المفلوطة فى الواقعتين . لكن الأمر للأسف أعقد من هذا بكثير . فمعدل تساقط الجسيمات من الجو معدل أسى ، وفترة بقاء الجسيمات فى الغلاف الجوى السفلى أقصر من أن يكون لها غير أثر مؤقت . وفى حالتنا التى ندرسها ، فإن الكثير يعتمد على الطريقة التى اختلطت بها الغازات فى السحابة الأصلية . وهذا موضوع سنعود اليه فى الفصل التالى . كان فريق الفارس يبحث عن تفسير للكثير البيولوجية عندما حاول تقدير فترة الاظلام . وهذا غرضنا نحن أيضا ، وثمة غرض آخر سنعود اليه فى فصول تالية . أما الآن ، فيكفى أن نشير الى أن النتيجة المأساوية لا تحتاج أن يمتد الظلام خمسة أعوام ، ولا حتى ثلاثة . فعام واحد يكفى ، بل وقد تكفى بضعة أشهر .

كان اهتمامنا فى هذا الفصل منصبا على الآثار المباشرة لاصطدام كويكب وهذا امر معقول ، فهذا هو ما نتصور أنه قد حدث . ولكن ، ماذا يكون عليه حجم الفارق لو أن الجسم المصطدم كان مذنباً ؟

قد يكون الأمر مجرد تفرقة دون فارق . لو أن كويكبنا كان واحدا من أجسام أبوللو - مجرد كتلة من صخر كونى لها مدار يتقاطع مع مدار الأرض - فسيكون مذنباً « ميتا » . أن معظم الأجرام داخل النظام الشمسى لها مدارات يمكن تفسيرها بنظريات تكوين النظام نفسه . لكن المذنبات وأجسام أبوللو تعتبر استثناءات ، لأن أفلاكها لا تتوافق مع النموذج العام . لذا فمن المغرئ أن نفترض وجود تفسير واحد يصلح لكليهما ، وأن المذنبات وأجسام أبوللو لها أصل شائع ، أى أن أجسام أبوللو هى مذنبات من نوع خاص . ثمة عنصر من المماثلة هنا - لأنه حتى لو كان لها أصل شائع ، فإن تركيب أجسام أبوللو - الصخر الجامد - يختلف عن تركيب « كرة الثلج القذرة » المفترضة للمذنبات المألوفة . يلزمنا أن نتفحص مدارات هذه الأجسام حتى نحدد كيف يصطدم أى منها بالأرض - وسنقوم بهذا بالتفصيل فى الفصل العاشر - أما الآن فإن ما يهمنا هو تركيب هذه الأجرام .

يصعب كما ذكرنا أن نتصور كيف يستطيع المذنب أن يوفر كل هذا القدر من المعادن الموجودة في صলصال التخوم . وفيما عدا هذا فليس ثمة فارق كبير . فالأثر على أية حال ينتج عن الطاقة المبذولة - وكما رأينا فإن مذنباً صغيراً ينطلق بسرعة ، قد يحوى من الطاقة قدر ما يحمل كويكب كبير يسير ببطء . وتحطيم نواة المذنب سيعطى قدراً أقل بكثير من المادة الصلبة ، ولكن ، لما كانت كتلة الجرم المصطدم بالمسطح لا تشكل إلا جزءاً ضئيلاً من القدر الكلى للمادة الملقوفة الى الهواء - فهذه تحددها طاقة الاصطدام - فإن أهمية الكتلة ستكون محدودة . وبنفس الشكل ، إذا دخل المذنب فى مسار ضحل ، فإنه سيحترق فى الغلاف الجوى ليسبب نفس القدر من التسخين ، لأن هذا يتوقف على الطاقة المبذولة وليس على مجرد حجم الجرم المعنى . ربما اختلفت كيمياء الواقعة قليلاً لاختلاف التركيب الكيماوى (المفترض) بين الكويكبات والمذنبات ، ولكن ، لما كانت الآثار على الأرجح سستنتج عن الاصطدام لا عن تركيب الأجرام المصطدمة نفسها ، فإن التركيب الكيماوى لن يهم كثيراً . والواقع أن المذنب سيعطى تقريباً الأثر الذى يسببه الكويكب ، ولكنه لم يكن يعطى كل هذا القدر من الايريديوم والأوسميوم .

حان الوقت كى نتخلى عن السوبرنوفات كسبب . اقترح أن انفجاراً لسوبرنوفاً قد يلقى بكميات كبيرة من المادة الدقائقية فى الغلاف الجوى الأعلى . لن تكون السوبرنوفات نفسها هى مصدر المادة ، وإنما الغبار الذى صوح به من سطح القمر فى اتجاهنا . وهذا لا يهم كثيراً ، لأن حادثة السوبرنوفات إذا ما وقعت قريباً من الأرض - بحيث تعصف بغبار القمر فى اتجاهنا - فلا بد وأن تغمر الأرض أيضاً وكل ما عليها من كائنات بأشعاع كونى مكثف . يلزم أن تقع مثل هذه الحادثة على بعد منا يقدر بثلاثين فرسخاً نجمياً (نحو ٩٧٥ سنة ضوئية) . وقد تسبب مثل هذه الحالة بعض ملاحظاته من آثار ، ولكن هل كان فى مقدورها أن تنقل المادة الموجودة بصلصال التخوم - من القمر ؟ الحقيقة أنه ليس ثمة شواهد قوية على وقوع انفجار سوبرنوفات بهذا القرب خلال تاريخ النظام الشمسى بأكمله ، كما لا توجد أية أسانيد على وقوع أية حادثة أرضية بهذه الطريقة .

مرة أخرى ، لم يبق معنا إلا الكويكب . قمنا بوصف القوة التى سينفجر بها عند الاصطدام ، قمنا بوصف الفرقعة ، وبوصف الهزات التى ستحدث بالعالم كله ، تخيلنا الزلازل ، والبراكين ، والتسونامى الأكبر من كل ما حدث فى تاريخ البشرية . ولقد قلنا أن القوة تعادل كل

تخيرة العالم من الأسلحة الذرية مجمعة ، ضوعفت عشرة الاف مرة ،
ثم فجرت جميعا فى لحظة واحدة بموقع واحد •

سيحطم الارتطام – شمال الأطلسى – من الناحية البيولوجية
ليس شمة وسيلة يستطيع بها أى كائن حتى أن يفلت من الموت • أما فى
شمال شرقى أمريكا وفى غرب أوراسيا فسيحدث تخريب هائل ،
وسيموت الكثير من الأحياء •

لكن ، ماذا سيحدث للحوانات بالباسيفيكي ، أو بنصف الكرة
الجنوبى ، بجنوب أمريكا ، أو بشمال غربى أمريكا ؟ لماذا تتأثر الحياة
الترتبية فى أفريقيا بأية حادثة حتى لو كانت فى مثل قضاة هذه ؟ فى
كلمة ، لماذا تسبب مثل هذا الاصطدام فى فناء بعض الأنواع – ولا نقول
كلها ، وإن كان هذا ليس صعب التفسير ، غير أنا عندئذ لن نكون هنا
نحاول التفسير ؟

إن الكثير من الكائنات الحية الدقيقة يستطيع أن ينجو من هذه
الكارثة ، لا سيما البحرية منها • أنها لن تقاسى أكثر من هزة شديدة
ومزج عنيف ، إلا إذا كانت قريبة جدا من بؤرة الواقعة • ولكنها
تستطيع أن تشفى سريعا ، لتستمر حياتها الغامضة المجهولة ، وليستمر
التطور نفسه •

لقد فعل التطور أكثر بكثير من مجرد الاستمرار • وإذا كان لنا
أن نتفهم ما حدث بعد ذلك فلا بد أن نحاول أن نكشف : لا ماذا قتل كل
هذه الأنواع – ونحن نعتقد أننا نعرف هذا – وإنما كيف قتلت • ما
السبب فى انقراض الأنواع ؟ ماذا سنكتب على شهادة وفاتها ؟

الفصل السابع

أسباب الوفاة

عظمتنا كثيرا من الكيمياء الغريبة لصلصال التخوم التي تسم نهاية العصر الطباشيري ، ولقد حان الوقت لنتحدث قليلا عن هذا الموضوع ، ذلك أن المحتوى المعدني ليس هو كل ما يميز هذه التخوم عما فوقها وما تحتها .

ظهرت في السنين القليلة الأخيرة طريقة يمكن استخدامها في إعادة تشكيل الماضي . ثمة نظيران مهمان للأكسجين موجودان بالغلاف الجوي للأرض (الأكسجين ١٦ وأكسجين ١٨) ، ويبلغ متوسط نسبة النظير ١٦ في أكسجين الجو نحو ٩٩٫٧٦٪ أما نسبة النظير ١٨ فتبلغ نحو ٠٫٢٪ . ونسب النظائر تحددها السوبرنوفا الأصلية التي انتجت العناصر المكونة للنظام الشمسي . هي إذن نسب ثابتة ، وتبقى ثابتة . وعندما يتأكسد الكربون ليكون ثاني أكسيد الكربون ، تبقى نسبة النظيرين فيه كما هي ، نعى أن ثاني أكسيد الكربون يحوى نظيرى الأكسجين بنفس نسبة وجودهما في أكسجين الجو (أو غيره) .

وثاني أكسيد الكربون هو الصورة الغازية لحامض ضعيف جدا هو حامض الكربونيك ، وهذا الغاز لا يذوب منه في الماء الا كميات ضئيلة ، يمكن أن تتفاعل مع المعادن . وتستوعب بعض الكائنات الحية بعض هذه الكربونات - لا سيما كربونات الكالسيوم - لتستخدمها في بناء اجسامها . وأهم الكائنات التي تعتمد كثيرا على كربونات الكالسيوم هي الرخويات - القواقع والأسماك الصدفية - والأنواع الميكروسكوبية التي لا تعد ولا تحصى والتي تحيا بين البلانكتون ، أى أن كتلة مثل هذه الكائنات تتراوح ما بين حجم خلية واحدة ، الى يرقات وصغار الكثير من الأسماك التي تنجرف قرب سطح ماء البحر أو في المياه العذبة الواسعة . لكن هذه الكائنات تختار أحد نظائر الأكسجين ، وتفضله على غيره ، بحيث يمكننا القول بوجود آلية انتخاب بيولوجى . وعندما

تموت هذه الكائنات ، فان بقاياها من كربونات الكالسيوم - التي لا تذوب في الماء - تظل محتفظة بالنسب المختارة لنظائر الأكسجين .

وتحرير ثاني أكسيد الكربون الى الجو ، وتكوين الكربونات ، وحجم عشائر الكائنات التي تستخدم كربونات الكالسيوم ، كل هذا انما يتوقف على الظروف المناخية ، لا سيما درجة الكالسيوم ، كل هذا انما الرسوبية التي عرضت الى الكثير من التحريف والانضغاط عبر الملايين من السنين ، قد لا تقدم الا القليل من الشواهد المفصلة عن قدر النشاط البيولوجي زمن تكوينها ، لكنها قد تحوى بقايا الكائنات في صورة كربونات كالسيوم . وعلى هذا ، فان تحليل عينات من هذه الصخور لتحديد نسب نظائر الأكسجين سيكشف لنا عن قدر النشاط البيولوجي ، ومن هذا يمكن ان نحسب درجة حرارة الماء التي يمكن ان تحدث عليها هذه الدرجة من النشاط . توجد معظم العناصر في صورة نظائر عديدة ، وليس الأكسجين بالعنصر الوحيد الذي يجرى عليه الانتخاب البيولوجي بهذه الطريقة .

اهتم البعض بنظائر الأكسجين في الاختبارات العديدة التي أجريت لعينات اللب المأخوذة من قاع الباسيفيكي في مشروع الحفر بأعماق المحيط . ومن نتائج الاختبارات التي أجريت على عينات من مواقع مختلفة اتضح ان حرارة قاع المحيط وسطح مائه في النهاية الأخيرة للعصر الطباشيري قد ارتفعت ما بين درجة مئوية وخمس درجات . وهذا لا يعنى ارتفاعا عاما في درجة الحرارة ، فليس لدينا ما يعضد هذا ، وانما يقدم اثباتا للصورة التي رسمناها لقدر ضخ من الحرارة بذل في ذلك الوقت . كان ارتفاع الحرارة مفاجئا ، وقصيرا .

ولقد قدرت أيضا نظائر الكربون ، فاتضح وجود نقص في كربون ١٣ تتراوح قيمته ما بين ٠.٣٪ ، للكربون نظيران ثابتان : ١٢ و ١٣ . والانخفاض في كربون ١٣ انما يعنى زيادة متناسبة في كمية كربون ١٢ . وكما هو الحال مع الأكسجين ، سنجد ان الكائنات الحية تنتخب نظيرا من نظيري الكربون وتفضله على الآخر ، نعنى ان النقص في كربون ١٣ لا يعنى على الاطلاق نقصا في الكربون ككل ، وانما قد يشير الى زيادة في كمية الكربون الكلية ، طالما كان الكربون من اصل بيولوجي . علق كينيث هسو على هذا عام ١٩٨٠ قائلا انه « يعادل التغير الناتج لو ان الغلاف الحيوى الأرضى بأكمله قد وضع في المحيط » . طبيعى ان الغلاف الجوى الأرضى لم « يوضع في

المحيط » - فالكائنات التى ماتت على اليابسة ظلت على اليابسة - لكن عددا كبيرا جدا من الكائنات البحرية - التى تحوى نسبة اعلى من الكربون ١٢ - قد ماتت .

هل يوجد ثمة تفسير بديل للتفسير البيولوجى ؟ لما كانت نسبة الكربون ١٢ الى ١٢ ثابتة بالنسبة للكربون الأرضى - وهى نتيجة اخرى للظروف النجمية التى تتشكل تحتها العناصر الثقيلة - فان علينا أن نجد مصدرا للكربون الخفيف اذا كنا نبحث عن تفسير بديل ، مصدرا أكثر ثراء بالكربون ١٢ . اقترح هسو أن الجسم الكونى الساقط قد يكن وهو نفسه المصدر . لكربون النيازك والكوندريت (كتل المسادة الكربونية الموجودة فى بعض النيازك الحجرية) نفس التركيب النظائرى لكربون الأرض ، وبالرغم من أن الكربونات بها تتكون من كربون ثقيل جدا (فهى غنية بكربون ١٣) ، فقد اقترح هسو أن المنذبات قد تحوى أول اكسيد الكربون وثانى اكسيد الكربون الأخف بكثير - بسبب طريقة تكوينهما . غير أن جدله تخمينى وغير مقنع عموما . اقترح أن الجسم المصطدم قد يكون قادرا على نقل الكمية المطلوبة من الكربون الخفيف ، غير أن كمية الكربون الخفيف فى حالتنا هذه ستكون أكثر من اللازم ، لأننا اذا سمعنا للواقعة بأن تقتل عددا كبيرا من الكائنات الحية فان الكربون الخفيف فى بقاياها لابد وأن يذهب الى مكان ما ، وأكثر الأماكن احتمالا هو الرواسب التى ترسبت فى ذلك الوقت . عموما ، فاننا نفضل أن نعتبر النقص فى كربون ١٣ مقياسا لحجم الأثر البيولوجى للواقعة .

اننا نبحث عن طرق نستطيع بها أن نعيد تركيب الوقائع التى ادت الى موت الكائنات الحية . قد تبدو المهمة غير ضرورية اذا كنا قد اقنعناك بأن مثل هذه الوقائع نفسها هى نتيجة واقعة بالاضخامة التى حاولنا وصفها . غير أن طبيعتنا الجذلية لن نقبل بمثل هذه النتائج الفورية السريعة وانك لن تجد طبيبا فى أيامنا هذه يقبل « كبر السن » كسبب للموت ، ونحن لا نستطيع أن نقبل اليوم فكرة « الاصطدام بكويكب » الا اذا عرفنا الطريقة التى حقق بها الكويكب اثره الرهيب .

وقبل أن نستطرد ، ربما كان من الأفضل أن نفكر فى هذا الأثر . فما الذى اندثر ، وما الذى نجا ؟ اذا عرفنا ذلك فربما توصلنا الى بعض الدلائل ، وربما تمكنا من ابتكار نظريات - حتى ولو كانت غير نهائية - من التغيرات فى البيئة التى قد تؤدى بعض الكائنات دون الأخرى .

- لقد اختلفت من طبقة الحقب الثلاثى القديم نحو ٧٠٪ من كل الكائنات التى كانت تحيا فى نهاية العصر الطباشيرى . هذا هو مدى الانقراض ككل ، ولكن كيف توزع هذا الانقراض ؟

لقد تأثر البلانكتون الجيرى بشدة - نقصد البلانكتون الذى يحتوى على كربونات الكالسيوم ويعتمد عليها . ولقد تلاشت المنخربات مثلا ، صحيح أنها عادت ثانية للحياة ، لكن أعدادها لم تصل أبدا الى ما كانت عليه فى بحور العصر الطباشيرى . والمنخربات حيوانات بروتوزوا بسيطة ، والكثير منها وحيد الخلية ميكروسكوبى الحجم ، لكن بعضها عديد الخلايا ، وقد ينمو ليصل قطره الى نحو ١٥ سنتيمترا . وهذه العملاقة من المنخربات طبقية الشكل ، وتوجد فى الحجر الجيرى بسوريا وبعض الأماكن الأخرى . وكل هذه المجموعة من الحيوانات تعيش داخل قشرة أو صدف ، وعندما تموت ترسب أصدافها الى قاع البحر حيث تتراكم . والمنحدرات الجيرية الشهيرة فى دوفر بجنوب إنجلترا ليست الا بقايا منخربات . وثمة طبقة سميكة منها على ارتفاع ٦٧٠٠ متر على جبل أيفرست تشير الى أن هذا الجبل كان يوما ما قاعا لبحر .

ظهر خلال تاريخ الأرض ما يقارب ٢٠٠٠٠ نوع من المنخربات ، لم يعد منها الآن الا ١٢٠٠ ، معظمها بحرى . ثمة صفة مميزة تشترك فيها هذه الأنواع جميعا - وكانت تشترك فيها فى الماضى - وهى تلك الدرجة العالية من التأقلم لبيئتها ، وكثيرا ما يكون ذلك حتى على مستوى محلى جدا ، ثم أنها تتميز أيضا بحساسيتها الشديدة للتغير فى هذه البيئة . والبعض منها يعيش بقاع البحر ، والبعض منها يطفو مع البلانكتون قرب سطح البحر . ورواسب المحيط الغنية ببقاياها تسمى « الطرين الجلوبجرينى » . وبعض المنخربات حساسة بوجه خاص للتغير فى درجة الحرارة ، بحيث توجد أولا توجد - كما أنها للغرابة تحلزن قوقعتها الى اليمين أو الى اليسار حسب درجة حرارة البيئة ، وبذا فمن الممكن أن تستخدم كمؤشرات للمناخ القديم .

ولقد كان الأثر على النانوبلانكتون كبيرا جدا . وهذه الزمرة من الكائنات المتباينة تجمع فقط على أساس الحجم والمنطقة التى توجد بها . والمقطع « نانو » يعنى « قزم » - والنانوبلانكتون كائنات دقيقة للغاية تحيا بين البلانكتون .

والنانوبلانكتون تعتبر - تقنيا - من النباتات ، وهى تصنع السكريات عن طريق التمثيل الضوئى ، والبعض الآخر حيوانات لأنها

تتغذى على النباتات أو على بعضها البعض . والنباتات البلاكتونية (الفيتوبلانكتون) هى المنتج الايكولوجى الرئيسى فى البحار الواسعة ، حيث تقوم بالدور الذى تقوم به النباتات الخضراء على اليابسة . ولقد كان يظن حتى زمن قريب أن انشط الفيتوبلانكتونات فى القيام بهذا الدور هو الدياتوم - وهذه كائنات وحيدة الخلية مغلقة بصدف شفاف من السليكا ، ويصعب رؤية أكبرها بالعين المجردة . ويعيش الكثير من الدياتومات منفردا ، الا ان البعض قد يلتمح سويا فى شكل سلاسل ، كما أن للبعض الآخر - مما يعيش منفردا - أصدافا تتطاول لمتخذ صورة الشعر الطويل . وهذه الخصائص تجعلها أوضح الفيتوبلانكتونات . على انه قد وجد مؤخرا أن أهم المنتجين كائنات أصغر تسمى السوطيات ، ولقد كانت هذه تعتبر من النباتات بالرغم من أن طريقتها فى التغذية تضعها فى مكان ما بين النبات والحيوان ، أما الآن فثمة نظام جديد للتقسيم . لهذه الكائنات أسواط تسبح بها وتصنع بها تيارات صغيرة تسوق الغذاء نحوها . والأسواط هى بروزات دقيقة تخرج من جدار الخلية وتبدو كالذيل أو الشعر الناعم حسب عددها ، وهى لا تقتصر على الكائنات الحرة وحيدة الخلية ، فالكثير من خلايا أجسامنا نحن له أسواط ، كما أن حركة الأسواط هى التى تنقل بها حواسنا المعلومات عما حولنا الى الأعصاب التى تنقلها الى المخ . واللوليبات (الاسبيروكيت) كائنات وحيدة يكاد يكون جسمها كله سوطا واحدا . وثمة بعض من علماء الحياة يشبهون بأن كل السوطيات تتكون من خلية بداخلها واحد من اللوليبات . وقد يزداد هذا الاشتباه قوة بحقيقة أن اللوليبات والأسواط تتركب تماما بنفس الطريقة أينما وجدت .

ولما كانت هذه البلاكتونات هى أهم منتجى الغذاء فى البحر ، فى حين أن كل الحيوانات الأكبر تعتبر مستهلكة ، فإن أى تغير فى حجم عشائرها يزيد أو يخفض من مستوى الانتاج فى البحر لابد وأن ينعكس على عشائر الحيوانات الكبيرة .

ربما انعرفنا الآن قليلا عن سياق الموضوع لنشرح دورة الطاقة - وكذا الغذاء - داخل المحيط أو داخل أى شبكات غذائية .

ان العملية دورية ، ولنا أن نبدأ الوصف من أية نقطة ، لكن البداية التقليدية هى ذاتيات التغذية - المنتجون . تتألف هذه أساسا من النباتات الخضراء - من كل حجم ، بداية بالطحالب وحيدة الخلية وحتى أكبر اشجار الغابات ، لكن الطحالب هى الأهم بالنسبة لحجم ما تنتجه اذا أخذنا العالم ككل . وهذه الكائنات تحول الماء وثانى أكسيد الكربون الجوى بالتمثيل الضوئى الى سكريات ، ويوفر لها ضوء الشمس

الطاقة اللازمة • وفى نفس الوقت فإن الكائنات الدقيقة التى تعيش أساسا فى التربة أو ماء البحر تستطيع أن « تثبت » المواد المعدنية البسيطة لتستوعبها فى أجسامها ، ثم تقدمها كمركبات يمكن للنبات استخدامها عندما تموت • فالنيتروجين على سبيل المثال - برغم وفرة - لا قيمة له فى حالته الغازية بالنسبة للنبات ، لكن النبات يأخذه ككثرات بعد أن تعالجه مجموعة معينة من البكتيريا • وذاتيات التغذية تستخدم كطعام لغيرها من الكائنات ، وهذه عادة ما تكون من الحيوانات ، وتسمى على وجه الدقة « عضوية التغذية » ، نعى أنها كائنات لا تستطيع أن تصنع طعامها بنفسها وإنما يلزمها أن تأخذه فى صورة جاهزة ، وتحوره بالأبيض حسب احتياجاتها • هى إذن كائنات مستهلكة • فإذا كانت تعتمد كليا أو جزئيا على غذاء من الكائنات المنتجة فهى إذن « مستهلكة أولية » ، نعى عواشب • أما اللواحم فتتغذى على العواشب ، وبذا فهى مستهلكات ثانوية • فإذا ما كانت تتغذى على غيرها من اللواحم فهى مستهلكات ثالثة •

فى نصف الحلقة هذا ، يستخدم ضوء الشمس والحرارة لتوفير الطاقة للفاعلات الكيماوية التى تستخدم فيها الجزيئات العضوية البسيطة فى صناعة جزيئات أكثر تعقيدا ، ومن ثم تجمع هذه فى هياكل الكائنات الحية التى نراها من حولنا ، وتمدها بأسباب الحياة •

أما النصف الآخر من الحلقة فيختص بتكسير هذه الجزيئات الكبيرة إلى الجزيئات الأصلية الأيسر ، التى تعود ثانية إلى البحر ، أو إلى الماء الأرضى أو إلى الهواء ، لتبتدىء ثانية عملية البناء ، وتكتمل الحلقة • وهذا النصف الثانى من الحلقة - الخاص بالتحليل - يعتمد على سلسلة من الكائنات الحية توازى سلسلة التركيب ، لكنها ترتكز على أنشطة الكائنات الدقيقة بشكل أكبر بكثير •

يمكننا إذن أن نتصور الأنواع مرتبطة بالعلاقات الغذائية فى شبكة مركبة • كما يمكن تصور العلاقات فى هذه الحلقة بطريقة أخرى ترتكز على أماكن ترتيب الكائنات فى تسلسل هرمى • فإذا أخذنا الجزء البنائى من الحلقة وقسمنا الكتلة الكلية - الكتلة الحيوية لجميع الكائنات العاملة فى كل مستوى - المنتجة والمستهلكة الأولية ، والثانوية ، والثالثة - فمن الممكن أن نمثل هذا برسم بيانى من درجات كل يمثل مستوى ، لها جميعا نفس الارتفاع بينما يمثل العرض الكتلة الحيوية • عادة ما يرسم الرسم البيانى بحيث يكون أعرض الدرجات بالقاع • فإذا نقضنا ذلك فسيشكل لنا هرم مدرج ، يسمى « الهرم الحيوى » •

وأهميته لا تخفى • ولقد وضعنا الكائنات المنتجة بأسفل ، ولوقها المستهلكات الأولية فالثانوية فالثالثة • الواضح أن المستهلك لا يستطيع أن يأكل الى أن يعجز النوع الذى يأكله عن التكاثر ليسد النقص • ولقد وجد على العموم أن الكتلة الحيوية عند كل مستوى تبلغ تقريبا عشر الكتلة الحيوية للمستوى الأدنى مباشرة •

وكل ما يغير الكتلة الحيوية عند أى مستوى سيؤثر فى الهرم كله ، لكن مدى الأثر سيعتمد على موقع التغير • فزيادة الكتلة الحيوية عند معظم المستويات تسبب تغيرا بسيطا فى المصدر الغذائى أسفلها ، لكن ذلك فى نفس الوقت سيؤدى الى زيادة كمية الغذاء للكائنات بالمستوى الأعلى مباشرة فينخفض حجم العشيرة مرة أخرى ويستعاد الازدان • تأمل مثلا أثر زيادة فجائية فى أعداد العواشب • ستقوم العشيرة بعد أن ازدادت بضغط متزايد على الغذاء المتاح ، فتتناقص كميته ، لتؤدى قلته فى نهاية الأمر الى الهجرة ، أو حتى الموت جوعا ، وبذا تستعيد عشيرة العواشب حجمها الأول • على أنه من الجائز قبل أن يحدث هذا أن تزداد أعداد اللواحم التى تقترب هذه العواشب • يتزايد الافتراض ، وتكون النتيجة مرة أخرى هو استعادة الاتزان الأصلى • وهذا المثال نظرى جدا بالطبع : فالمعلاقات فى العالم الحقيقى أكثر مراوغة • إذا ما ازداد المستوى الأدنى فسيزداد الاستهلاك الأولى لتستعيد الاتزان • أما إذا انخفض المستوى الأدنى ، فسيحس الهرم كله بالصدى ، وتكون النتيجة النهائية على الأرجح هربا أصغر ، ربما وقد أزيل منه المستوى الأعلى – المستهلكات الثالثة – لعدم وجود الغذاء الكافى لها •

الواضح إذن أن انخفاضاً حاداً فى الفيتوبلانكتون سيؤدى الى فناء الأنواع على قمة الهرم البحرى •

أن ما يسم نهاية العصر الطباشيرى هو الانخفاض الحاد الفجائى فى المخربات والنانوبلانكتون • ولقد وصف هذا بوضوح ج • سميت ، ج • هيرتوجين سنة ١٩٨٠ بقولهما : « عند فحص المارل الماستريختى الحديث فى قطاع كارافاكا بأسبانيا – وسمكه يزيد عن ٢٠٠٠ متر – لم نجد أى تغير معنوى فى المزاملات الأستوائية الغنية للمخربات البلانكتونية والاحافير الثانوية ، وذلك حتى آخر سنتيمتر فيه ، هنا تختفى كل المزاملات تقريبا داخل • – ٥ ملليمترات • • وهذا يعنى أن الانقراض قد حدث خلال نحو مائتى سنة » • وفى رأينا أن زمن الانقراض لا يمكن أن يتجاوز مائتى سنة ، بل وقد يكون أسرع من ذلك •

أما المثير حقاً ، فهو أن أنواع النانوبلانكتون التى نجت من الواقعة هى تلك المعروف عنها تحمل الظروف التى لا تستطيع معظم الأنواع تحملها - بل وربما تفضيلها .

اختفت رخويات الامونيات تماما على اثر الصدمة . أما على الأرض فقد قتلت كل الحيوانات التى تزن أكثر من نحو ٢٥ كيلو جراما . ولم تتأثر النباتات على اليابسة كثيرا . كانت كاسيات البذور الحديثة قد ازدهرت تماما على نهاية العصر الطباشيرى - كما رأينا فى الفصل الثالث - ثم استمرت فى التطور بالحقب الثالث ، وليس ثمة من سبب يدعو للفرض بأن الواقعة كان لها أثر على تطورها . كما نجت حيوانات المياه العذبة فلم تصب بأذى كبير .

كان للواقعة اذن آثار متباينة . تأثر البلانكتون بشدة ، اختفى الامونيات ، اختفت الحيوانات الكبيرة على اليابسة ، لكن نجت نباتات اليابسة وحيوانات المياه العذبة الصغيرة . ما الذى يمكن أن يسبب هذا النموذج ؟

دعنا نعالج فكرة أن كمية الغبار التى قذف بها الغلاف الجوى كانت تكفى لتحجب ضوء الشمس . اقترح والتر الفارس هذه الفكرة ، لكنها نفذت على أساس انه مهما كان حجم كتلة الجسيمات التى تدخل الغلاف الجوى فان الزمن اللازم لسقوطها سيظل ثابتا تقريبا ، ويرجع هذا - كما يعضى الجدل - الى انه كلما ازدادت كثافة سحابة الغبار كلما ازدادت فرصة التصادم بين الجسيمات . وعندما تصطدم الجسيمات فان البعض منها سيلتصق ببعض الآخر ، مما يزيد من وزنها ، فتسقط . وعلى هذا فان فترة بقائها فى الغلاف الجوى تتناسب عكسياً مع عددها . ببساطة : كلما ازداد عددها كلما ازدادت سرعة سقوطها . ولما كان سقوط أية سحابة من الجسيمات بالغلاف الجوى السفلى يضى بمعدل اسى ، فان الزمن اللازم لاختفاء السحابة سيكون ثابتا تقريبا بغض النظر عن كثافتها الاولى .

ان ما يهم اذن ليس هو مصير الجسيمات فى الغلاف الجوى السفلى ، وإنما مصير الجسيمات فى الستراتوسفير . فالجسيمات فى الغلاف السفلى لا تستطيع أن تبقى فترة أطول من أن تسبب غير الآثار العابرة .

تكونت السحابة - فى الحالة التى نفحصها الآن - أساسا عن تكثيف سحابة من الغبار ، وليس عن جوامد قذف بها من اسفل الى

الغلاف الجوى • ويتوقف الكثير على كثافة هذه السحابة • فالجسيمات الدقيقة لا تشكل الا اذا كانت السحابة غير كثيفة • فاذا كانت كثيفة تكونت قطرات كبيرة تسقط فورا كالمطر • وسيكون سقوطها على الأرجح داخل منطقة محددة •

ثمة اعتراضان خطيران ضد هذا النقد • دعنا أولا نفترض وجود عدد كبير من الجسيمات الدقيقة • هل تتصادم الجسيمات الصغيرة فعلا فى الهواء ؟ تقترح التجارب التى أجريت من سنين عديدة عن انتشار الايروسولات من الرذاذ ان هذا لا يحدث • وأن الاصطدامات حتى فى السحابات المكثفة جدا بالجسيمات ليست بأكثر شيوعا منها بين المجاميع الكثيفة من النجوم بوسط المجرات • صحيح أن الاصطدامات تحدث ، ولكن ليس كثيرا ، وفترة بقاء الجسيمات فى الجو لا تتأثر بها كثيرا •

اما الاعتراض الثانى فيختص بالكثافة الفعلية للمسحابة اللازمة لحجب ضوء الشمس ، او ما يسمى علميا باسم « كثافة العمود » • تأمل الغطاء الورقى فى غابة من الأشجار العريضة الأوراق • اذا وقفت على أرض الغابة ونظرت الى أعلى فقد يستحيل عليك رؤية السماء ، لن ترى غير الأوراق • ليس هذا لأن الأوراق قد تكدست سويا باحكام عند احد المستويات ، ولكن لأنها تتداخل معا على مستويات كثيرة • ليس المهم فقط هو عدد الأوراق (أو الجسيمات) عند ارتفاع معين لكن المهم هو العدد ما بين سطح الأرض وقمة الغلاف الجوى • ولما كانت هذه السحابة بالذات قد قذف بها الى أعلى بقدر من الطاقة لم يسبق له مثيل ، فلنا أن نفترض أنها ستتوزع رأسيا من أدنى المستويات الى أعلاها ، وحتى قرب الفضاء نفسه ، اذا ما كان الأمر كذلك ، فستكون السحابة غير كثيفة حقا اذا قيست على أى مستوى واحد ، ولكنها ستجبح فى أن تحجب ضوء الشمس بشكل فعال تماما •

يمكننا أن نشهد هذا الأثر بوضوح على كوكب الزهرة • يبدو هذا الكوكب اذا نظرنا اليه من الفضاء وقد غلف بسحابة كثيفة ، حتى ليستحيل أن نحظى ولا حتى بلمحة من سطحه • وعندما انزلت الآلات بهدوء على سطحه أوضحت الصور التى أرسلتها واستقبلناها مسطحا جافا صخريا ، وسماء لا يغطيها سحاب وإنما ضباب رقيق • فالرؤية الأفقية داخل الغلاف الجوى للزهرة جيدة • والسحابة الكثيفة ليست فى الحقيقة سوى عمود من الضباب الرقيق عميق جدا • وليس هذا كل شيء • فلو أن بعضا من المادة اتخذ له مدارا تحاصا حول

الأرض ، فمن المرجح أن يتساقط تدريجيا الى الغلاف الجوى ليزود مادته بمادة آتية من فوق .

اننا نعرف الكثير عن سلوك الجسيمات فى الغلاف الجوى . فى عام ١٩٦٣ انفجر بركان جبل أجونج باندونيسيا ، ودرست آثاره بالتفصيل . بعد الانفجار ارتفعت حرارة الستراتوسفير قرب خط الاستواء ٦ - ٧ درجات مئوية ، وبقيت الحرارة بضع سنين أعلى ، بدرجتين أو ثلاث ، عما كانت عليه قبل الانفجار . ولم يسجل أى تغير فى حرارة الطروبوسفير . وبقيت كل المواد التى قذف بها البركان داخل الغلاف الجوى . فاذا ما كان للمادة أن تترك الغلاف الجوى لمتخذ مدارا لها حول الأرض ، وتتساقط بعد ذلك بالتدريج ، فإن « ظاهرة أجونج » لا تخدمنا فى تفهم هذا ، كما لا تخدمنا التقارير القديمة عن انفجار كراكاتوا .

من المستبعد أن تتسبب المادة المفلوطة الى الغلاف الجوى فى اظلام طويل ، لكن المادة التى تدخل باستمرار من أعلى الغلاف الجوى . يمكنها أن تفعل هذا . قد يكون رأى فريق الفارس صحيحا - بأن العالم قد دلف الى الظلام وبقي مظلما لفترة طويلة (تصل الى خمس سنوات فى رأى هذا الفريق) . فهل يسبب مثل هذا الاظلام الآثار التى نعرف أنها قد حدثت ؟

سيتوقف التمثيل الضوئى اذا كان الاظلام تاما ، وسيخفض بدرجة كبيرة اذا كان جزئيا . سيموت الكثير من النباتات الخضراء ، وسيموت منها أولا الأصغر والأبسط . ستتلاشى ويسرعة الفيتوبلانكتونات البحرية ، وباختفائها يتناقص البلاكتون الحيوانى الذى يتغذى على الفيتوبلانكتون ، أو يختفى كلية . سيقدم الاظلام تهربا مرضيا للانقراضات البحرية .

لماذا كان تأثير نباتات اليابسة اقل حدة ؟ لاجابة هذا السؤال علينا أن نبدأ بالتساؤل عما نعنيه بكلمة « اظلام » . قد يبدو المعنى واضحا . لكن الاظلام بالنسبة للنبات يعنى اختفاء ضوء الشمس . وقد يختفى ضوء الشمس بالنسبة للنبات ولا يختفى بالنسبة للحيوان . فمن الممكن أن يغلف الرماد أوراق النبات لا سيما اذا كانت الأوراق مبتلة عندما يسقط الرماد ، فيلتصق بها بشدة . وتكفى طبقة رقيقة - كاملة - من الرماد كى يثبط التمثيل الضوئى . وأثر مثل هذا الغلاف هو نفس أثر الاظلام .

بعد أن أوضحنا هذا لم تعد الإجابة صعبة • فربما تكون النباتات نفسها قد ماتت ، لكن بذورها – المغلفة في أمان داخل أغلفة ضد الماء (وقد يكون بعضها ضد الحريق) والمخاية تحت سطح التربة – هذه البذور قد تبقى حية بضع سنين ، أو ستين طويلة • إن بذور الحبوب على سبيل المثال قد تبثت بعد قرون من التخزين في قبور أجدادنا العظام ، فهي تبقى قابلة للأنبات طالما حفظت في جو بارد جاف • وعلى هذا فمن الممكن جدا أن تكون معظم نباتات السطح قد ماتت – بل وحتى كلها – ثم عادت ثانية بعد انقضاء أعوام •

ومثل هذا الظلام قد يفسر الأثر الواضح الحدة على النباتات الأكثر بدائية ، ومعظم هذه النباتات مستديمة الخضرة غير مكيفة لدورة حياة تتضمن تساقط الأوراق دوريا ، فإذا ما توقف التمثيل الضوئي فسيندرثر معظمها • أما النباتات المساقطة الأوراق فستنضو عنها الأوراق لينمو الجديد بدلا منها •

إننا لا نقول أن هبوط الغبار قد تسبب في هذه الظاهرة ، إنما نقول إنه ربما سببها • قد يكون رأى فريق الفارس صحيحا لا يزال ، فربما أصبح العالم مظلما أيضا • وربما تكون الظاهرتان قد عملتا سويا •

لماذا يتسبب اختفاء الكساء النباتي في قتل الحيوانات الكبيرة وحدها ؟ أن أول جزء في أجابة هذا السؤال هو أنه ليس لدينا سبب للفرض بأن الحيوانات الكبيرة وحدها هي التي قتلت • وكل ما نعرفه هو أن الحيوانات الكبيرة قد انقرضت • ربما تكون الحيوانات الصغيرة قد ماتت بأعداد هائلة ، ولكن بقي منها ما يكفي كي تتكاثر العشيرة ثانية عندما عادت النباتات الى الظهور مرة أخرى •

للحيوانات الصغيرة ميزتان تتفوق بهما على الحيوانات الكبيرة في مثل هذه الظروف غير الملائمة • فهي أقدر على اقلية سلوكها مع المعوقات التي تفرضها البيئة ، ثم أنها تحتاج الى طعام أقل من الحيوانات الكبيرة •

إن فترة طويلة من الظلام قد تشبه ليل شتاء طويل • والكثير من الثدييات الصغيرة ليلى العادات ، فالظلام بالنسبة لها ميزة لا موعق • فثران الخشب مثلا لا ترعى حتى في الليالي المظلمة • تقضى الثدييات الصغيرة معظم وقتها في الشتاء داخل جحورها المهيأة بأوراق الأشجار أو الحشائش • وتعزل هذه الحيوانات نفسها من البرد وتقلل نشاطها ساعات النهار الطويلة أو أياما بطولها فلا تحتاج الا لقليل من الغذاء •

مما تحتاجه فى الصيف . والكثير منها يخزن الطعام للشتاء ، وان لم يكن ذلك بكفاءة عالية ، وعدم وجود هذا المخزون ليس ضرورة بالأمر الخطر . فاذا كان الحيوان جائعا ، وسمحت الظروف ، خرج ليرعى .

تكون عشائر الثدييات الصغيرة كثيفة فى بداية الشتاء (فى الحالة التى نحبها الآن لن يكون ثمة تحذير سابق - فربما لم يكن هناك خريف ، ولكن بالرغم من ذلك فقد وجدت على الأرجح عشائر كثيفة) ، وهى كثيفة لأن الخريف والشتاء يتلوان فصل التناسل ، وبذا تكون الصغار موجودة بعد أن ماتت معظم الأفراد الأكبر سنا خلال العام ، ولأن الأفراد الشاردة التى تقضى الربيع والصيف متجولة فى الريف - ستسكن أخيرا وتبقى فى مكان واحد تقضى فيه الشتاء ، وبذا تحسب ضمن العشيرة عند التشتية .

يتقدم الشتاء - خصوصا إذا كان شتاء قاسيا - تزداد نسبة النفوق . لكن النفوق انتقائى ، إذ تموت أولا الأفراد الكبيرة السن والمرضى والصغيرة الضعيفة ، بعد أن تستبد بها الأفراد الأكبر التى تستطيع أن تحصل على نصيب أكثر من نصيبها العادل من الطعام المتاح . أما المجموعة التالية التى ستعانى فهى هذه الحيوانات الكبيرة . قد تكون عدوانية ، لكن جسمها الكبير يعنى أنها تحتاج الى كميات أكبر نسبيا من الطعام ، فاذا لم تحصل عليها ماتت . وسيكسب هذه المباراة الحيوانات الصغيرة السن المتمتع بالصحة ، المتوسطة الحجم التى لا تحتاج الا الى قدر متواضع من الطعام . وقد دلت الدراسات على تشتية الحيوانات الصغيرة على أنه بالرغم من ارتفاع نسبة النفوق من الجوع الا أن الأفراد التى تنجو نادرا ما تكون سيئة التغذية .

طبيعى أننا نفترض شتاء طويلا جدا فى الواقعة التى نتخيلها ، لكن هذا لن يسبب مشاكل عريضة . ستموت النباتات أولا ، لكن الثدييات الصغيرة تتغذى على البذور ، وعلى الحشرات ، وعلى اليرقات والعذراء ، وعلى حيوانات التربة الصغيرة اللاقارية . ولا فقاريات التربة نفسها تتغذى أساسا على بقايا النباتات ونفايات الحيوانات ، وعلى بعضها البعض ، وليس من سبب يدعو للفرض بأن هذه الأغذية لن تكون وفيرة .

للحيوانات الصغيرة فترة حياة قصيرة ، وهى تتوالد أكثر من الحيوانات الكبيرة وهذا أيضا قد يكون ميزة تحت الظروف التى نفترضها ، لأن مستعمرات الحيوانات الصغيرة ستستجيب للظلام كما لو كان ليل شتاء طويل طويل . ستبقى داخل مستعمراتها حيث سيزداد

الاحتكاك مع افراد الجنس الآخر . ربما اقلق الظلام الدورات الهرمونية المرتبطة بالتغيرات فى طول النهار ، لكن دورات الشبق لن تتوقف فى الاناث ، وان كانت قد تظهر فى غير انتظام - لتستمر عملية التكاثر .
اما الحيوانات الكبيرة فانها ستبدأ باعداد اقل بكثير ، لأن كل فرد يحتاج مساحة أكبر من الأرض تزوده بالطعام . فاذا حل الظلام فربما كانت الاستجابة هى التشتت بحثا عن الطعام . . تبقى حيوانات القطيع مزاملة بالرؤية ، ولدى اقل - بالصوت . لكن القطعان التى نعرفها هى قطعان الثدييات : فقطعان الزواحف غريبة علينا ، وليس لدينا وسيلة يمكن بها أن نعرف سلوكها فى القطعان . فاذا ما تشتتت قبل اللقاء بين الافراد ، وقل بذلك التزاوج ، وهذا يؤدي الى انخفاض عشائر الحيوانات التى تتوالد فى العام مرة واحدة ، أو اقل . فاذا لم تشتت ، وظل تماسك القطيع كما هو ، فان استجابتها لنقص الغذاء - ان كان ثمة استجابة - لن يكون الا بزيادة تكرار ومدى الهجرة أو بالمهجرة لأول مرة . وفى الظلام ، أو شبه الظلام يصبح الاتصال بين افراد القطيع أصعب بكثير . تتفرق الافراد ، ثم قد يزداد الصراع بين القطعان الهائمة عندما تتعدى على مراعى بعضها . ولما كانت الحيوانات الأرضية الكبيرة تتغذى أساسا على الكساء النباتى الأخضر لا على البذور ، فلا بد أن يكون الضغط عليها أكثر حدة .

فى هذا الليل الطويل الذى سينتهى به العصر الطباشيرى ، يمكننا أن نصور الحيوانات الصغيرة مستمرة فى حياتها بطريقة تختلف قليلا ، ولكن دون مضايقة كبيرة ، بينما تقاسى الحيوانات الكبيرة كثيرا .

اما الحيوانات الصغيرة التى تعيش فى المياه العذبة فربما فعلت ذلك جزئيا بالاختباء فى طين القاع . ثمة سمك هو سمك الصحراء يستطيع أن يحيا سنينا بهذه الطريقة حتى يعود مطر الصحراء النادر فيحيل الأرض القاحلة الى مروج ، وحفار الطين الى برك حيث يمكن أن تتلاقى الأسماك وتتزاوج . والنشاط الميكروبيولوجى فى هذا الطين يختص بتحليل البقايا العضوية - ولا شك أنها كانت وفيرة - ولا يحتاج لضوء الشمس . فاذا كانت أسماك المياه العذبة الصغيرة تعتمد على مثل هذا النشاط ، فلن تواجهها أية مصاعب .

ليس من الصعب أن نجد تفسيرات لموت الحيوانات الكبيرة وبقاء الحيوانات الصغيرة ، ولكننا بهذا نكون قد أغفلنا إحدى المشاكل . فبعض الزواحف الحالية كبير لحد مزعج - مثل التماسيح ، وبعض الثعابين المعاصرة كالأصلة ، وبعض سحالي الورل .

وبعض السحالي العاشية مثل الايجوانا الامريكية والسلفاة الجلدية والسلفاة الخضراء - كل هذه زواحف ، وكلها يزن أكثر - وقد يكون أكثر بكثير - من الخمسة وعشرين كيلو جراما التى يبدو انها كانت الوزن الحرج للحياة فى الحقب الثالث . قدمت اقتراحات مختلفة لتفسير هذا الشذوذ الغريب . فربما كان السبب فى حماية السلاحف - وهى من الأنواع البحرية - هو وجودها بعيدا فى البحر ، بعيدا عن موطن الخطر . أما اليوم فيقتصر وجود السلاحف على نصف الكرة الأرضية الجنوبي ، ولو كان هذا هو مكان وجودها فى العصر الطباشيرى فانه يقدم تفسيراً لبقائها - فبذلك تكون بعيدة عن موقع الاصطدام . ومن ناحية أخرى فمن الجائز أن تكون السلاحف الموجودة فى النصف الشمالى قد قتلت ، ثم لم تهجر السلاحف أبداً لمتمبر خط الاستواء ؟ أما التماسيح التى تحيا اليوم فى نصفى الكرة الأرضية فربما كانت عند الواقعة نصف مغطاة فى الماء ، ثم أن بيضها كان محصناً جيداً داخل أعشاش جيدة الصنع . لكن هذا غير مقنع - فهل الزواحف الأخرى لا تسمى ببيضها ؟ ظهرت الثعابين أول ما ظهرت خلال العصر الطباشيرى ، ومن الجائز أن تكون الثعابين الحديثة الضخمة قد تطورت بعد انتهاء العصر الطباشيرى ، من أسلاف صغيرة ، فالثعابين هى أحدث الزواحف التى ظهرت على الأرض . ظهرت الايجوانا بعد العصر الطباشيرى ، لكن ثمة عينتين وجدتا فى العصر الجورائى بأورنيا - قد تكونان من أسلافها . لكن الورل يشكل معضلة أكثر تعقيداً ، لأنه ينتمى لعائلة قديمة كانت بكل تأكيد موجودة أثناء العصر الطباشيرى .

البراهين أبعد تماماً عن أن تكون مقنعة . لكن يلزمنا أن نجد طريقاً لتفسير بقاء القليل من الزواحف التى يتعدى وزنها الوزن الحرج . فهل ياترى أخطأنا فى تقدير هذا الوزن الحرج ؟

إننا نعرف أن الثدييات قد نجت من الانقراض ، وأن الثدييات الموجودة عندئذ كانت تضم بعضاً له تقريبا حجم القطط الأليفة الكبيرة (ربما كان وزنها ٣ كيلوجرامات) . ولأنها من الثدييات ، فهى من الحيوانات ذات الدم الحار - والمصطلح العلمى لها هو ثابقات الحرارة . أما الزواحف فهى من ذوات الدم البارد - والمصطلح العلمى لها هو متغيرات الحرارة . ولكن « ذوات الدم الحار » و « ذوات الدم البارد » مصطلحان مضللان . فالحيوان - أى حيوان - يعمل بكفاءة فقط داخل نطاق معين من درجات الحرارة ، بالرغم من أن الحرارة المثلى تختلف من نوع لآخر . فإذا انخفضت الحرارة كثيراً أصبح الحيوان بليد الحركة وبطؤت ضربات قلبه وانخفض معدل تنفسه . وهو فى هذا الوضع

يستطيع أن يحيا ، لكنه لا يستطيع أن يأكل أو أن يتناسل . فإذا ارتفعت درجة الحرارة كثيرا ، فقد يموت بسرعة لاختلال كيميائيه الداخلية . وحرارة جسم الزواحف النشط هى نفسها حرارة جسم الثديى - بل وقد تكون أعلى ، وتسمح الثدييات لحرارة جسمها فى البيئات الباردة أن تنخفض لتصبح أعلى درجة أو درجتين مؤثيتين من حرارة الجو المحيط . وعلى هذا فمن الممكن أن تكون ثابتات الحرارة باردة ، كما يمكن للتغيرات الحرارة أن تكون دافئة . أما الحرارة الفعاله التى ينشط فيها كلا الصنفين فهى واحدة . غير أنه من الصحيح أيضا أن معظم الحيوانات من ثابتات الحرارة تستطيع أن تحيا فى جو حرارته فوق الصفر بدرجة أو درجتين مؤثيتين - ثمة أسماك يمكنها أن تبقى نشطة فى المياه القطبية التى تنخفض حرارتها فعلا عن الصفر . أن تحمل الحرارة المنخفضة أسهل من تحمل الحرارة المرتفعة .

والفارق بين هذين النمطين من الحيوانات لا يختص بدرجة حرارة الجسم وإنما بالوسيلة التى بها تنظم هذه الحرارة . فمتغيرات الحرارة تدفئ نفسها بالشمس ، وتبرد أجسامها بالالتجاء الى الظلال أو المياه ، وهى حساسة بما فيه الكفاية لدفع أجسامها أو برودتها ، بحيث تستطيع أن تعرف مقدما متى تحتاج الى التحرك من موقعها الى موقع آخر أدفأ أو أبرد . أما ثابتات الحرارة فلها أجهزة احساس داخلية وآليات قسيولوجية - كالعرق واللاهات والارتعاش - يمكن بها أن تدفئ أجسامها أو تبردها ، دون اللجوء الى معاندة من خارجها ، وهكذا يمكنها من أن تستعمر مناطق شديدة البرودة أو شديدة الحرارة تخرج عن نطاق معظم متغيرات الحرارة . (ثمة استثناءات لهذه القاعدة - فالبرمائيات المتغيرة الحرارة كالضفادع تزدهر عند خطوط العرض العليا ، كما توجد أمعا داخل الدائرة القطبية . وفى الصحارى الحارة تنجح اللافقاريات والزواحف المتغيرة الحرارة ، جنبا الى جنب مع الثدييات) . أن الميزة الحقيقية - تلك التى تمكن الأنواع من الحياة حيث لا تستطيع الثمابين منافستها - هى قدرتها على ولادة الأحياء ، فهذا يرفع كثيرا فرص الحياة بالنسبة للصغار ، ويقلل من استثمارات الحيوانات فى التناسل . وسنعود الى هذا فى الفصل التاسع عندما نناقش موضوع التضمينات التطورية للواقعة .

فى نفس الوقت ، سنجد أن ثمة جزء يصيب الحيوان إذا كان ثابت الحرارة - فحرارة الجسم فى مثل هذه الحيوانات تتولد عن هضم الطعام وعن النشاط العضلى - كالارتجاف ، كما أن التخلص من الحرارة قد يتطلب نشاطا - كاللاهات . وعلى هذا فإن تنظيم حرارة

الجسم بالطريق الداخلى يتطلب بذل طاقة ، وهذا يزيد من كمية الطعام التى يحتاجها الحيوان . فالذبابة على سبيل المثال تموت جوعاً اذا حرمت من الطعام فترة لا تزيد عن بضع ساعات ، فهى لا بد أن تأكل باستمرار . وهى لا تحتاج كل هذا الطعام كى تصلح أنسجة جسمها أو لتوفير الطاقة اللازمة للتنفس أو الحركة - إنما تحتاجه لتوليد طاقة الجسم - وجسمها الصغير يعنى أن كتلتها صغيرة بالنسبة لمساحة سطحها وبذا فهى تفقد الحرارة بسرعة . أما ثابتات الحرارة الكبيرة الحجم فتتقاسى من المحوق المضاد ، فمساحة السطح الصغير تجعل من الصعب عليها أن تفقد حرارة الجسم لتظل باردة .

كيف أمكن لبعض الزواحف أن يتأقلم لنمط حياة ليلية ؟ كيف تنجح وهى المتغيرة الحرارة فى أن تحفظ لجسمها الدفء الكافى للنشاط ؟ أن معظم الزواحف الحالية نهائية الحياة ، والأنواع الليلية ليست متخصصة فى التغذية ليلاً ، وهى لا تتغذى إلا اذا كانت الجو دافئاً . ونحن نفترض أن زواحف العصر الطباشيرى كانت متغيرة الحرارة . ولكن ، لماذا ؟ ان السبب الأساسى فى ذلك هو أن الزواحف المعاصرة متغيرة الحرارة ، ولكن هذا لا يستتبعه بالضرورة أن تكون كل الزواحف هكذا على طول تاريخها فوق الأرض . ونحن نميل أيضاً الى الفرض بأن الانتخاب الطبيعى يحاسب ثابتهات الحرارة ، ولكننا قد رأينا - وسنقترح ثانية فى الفصل الثامن - أن ثبات الحرارة له مضاره وله منافع .

لو أننا افترضنا أن بعض زواحف العصر الطباشيرى كانت ثابتة الحرارة ، لكان اختفاؤها أسهل فى التقهيم ، إذ يلزم عندئذ أن تضرب كمية غذاء كل منها فى عشرة . فإذا ما فعلنا ذلك فسنرى أنه سيصعب بقاء حتى صفار أصغر أنواع الدينوصورات . أما الحيوانات الضخمة جداً فستندثر سواء أكانت ثابتة الحرارة أو متغيرة الحرارة ، لأن حاجاتها من الغذاء ستزيد كثيراً عن المتاح ، حتى لو كانت متغيرة الحرارة . سيعانى الكل من الجوع القاتل . غير أن الزواحف المتغيرة ستصيب نجاحاً أكبر ، وربما كان هذا هو السبب فى أن نجد كل الزواحف الحالية من ذوات الدم البارد .

هناك سبب آخر للفرض بأن كل الحيوانات الكبيرة التى تعيش على اليابسة تنظم حرارة أجسامها على الأغلب بوسائل داخلية : فالوسائل الخارجية قد لا تكفى . ان النشاط الطبيعى للحيوان يولد حرارة ، ولكنه يفقد الحرارة من سطح الجسم . فإذا كان سطح الجسم صغيراً بالنسبة لحجم الجسم الذى ينتج الحرارة ، فإن احتجاز الحرارة

قد يكون خطرا • وليس ثمة حيوان ضخم يتحلى بتحمل متميز للحرارة ، والحيوانات الضخمة التى تحيا بالمناطق الاستوائية تتمرغ فى الماء أو الوحل لتبريد أجسامها • ورغم ذلك فللثدييات أجهزة تنظيم داخلية ، والحيوان الذى لا يمتلك مثل هذه الأجهزة سيقاسى كثيرا فى الجو الحار • ومن المعتقد أن بعض الزواحف المنقرضة الضخمة جدا كانت مائية بعض الوقت • لكن ثمة الكثير ممن لم يكن كذلك خصوصا فى نهاية العصر الطباشيرى • فالكارنوصورات الضخمة كانت تصطاد على البر ، وكانت تعتمد على رجلين : على طرفين خلفيين كبيرين قويين وطرفين أماميين ضعيفين صغيرين ، ولم يكن فى استطاعتها على الأغلب أن تتحرك على أربع ، ولا حتى مؤقتا • وليس من طريقة كانت تستطيع بها أن تتحرك الى الماء أو منه اذا كان عميقا ليفر الأجزاء العليا من أجسامها • وبعض الهادروصورات - تلك الزواحف ذات المنقار الشبيه بمنقار البطة - التى عاشت فى قطعان وكانت وفيرة العدد فى نهاية الطباشيرى - كانت لها وبرة غشائية بين أصابع الأطراف الأمامية ، فلو كانت يوما تحيا فى الماء فالواضح انها قد تركته قبل انقراضها بوقت طويل • كانت لأطرافها الخلفية اظلال ، ويبتت محتويات المعدة بالعينات الحفرية انها كانت تتغذى على الفواكه والأغصان وأوراق الصنوبر الابرية ، وهو غذاء يناسب أسنانها تماما ، كما انه نمط للحياة على ارض جافة • لا شك انها كانت تجد صعوبة فى تبريد أجسامها ، ومن المنطقي ان نفترض انها كانت ثابتة الحرارة - وكذا ايضا البعوض غيرها من الزواحف الكبيرة الحجم •

فاذا ما كانت الزواحف الثابتة الحرارة لاتزال تبدو فظيعة، فلعلنا نتذكر ان الطيور والثدييات لحد علمنا كانت لها أسلاف من الزواحف • ولقد عاشت بكل تأكيد زواحف شبيهة بالطيور وأخرى شبيهة بالثدييات • فهل كانت هذه الزواحف ثابتة الحرارة ، أم انها اكتسبت القدرة على التنظيم الداخلى لحرارة الجسم بعد ظهور الطيور الحقيقية والثدييات الحقيقية ؟ اذا كان الأمر كذلك فلا بد ان نفترض ان الطيور والثدييات كانت يوما متغيرة الحرارة - وهى فكرة لا تقل فظاعة عن سابقتها ! ونحن لا نستطيع ان نقبل هذه مع تلك • فاما ان بعض الزواحف كان ثابت الحرارة واما ان بعض الطيور والثدييات كان متغير الحرارة •

من المشوق ان نذكر هنا ان القدرة على التنظيم الداخلى لحرارة الجسم قد تطورت على ما يبدو ببطء كجزء من الجهاز العصبى الأعلى ، وانها قد تفقد وقد تلغى • ولقد سبق ان عرضنا للحيوانات ذات البيات الشتوى ، التى تسمح لحرارة أجسامها أن تنخفض لغياب الغذاء وانخفاض حرارة الجو ، وعدم قدرتها على المحافظة على حرارتها

العالية • وهناك من الحيوانات الثابتة الحرارة ما يمكنه أن يسلك كما لو كان حيوانات متغيرة الحرارة تحت التخدير ، وهذا على ما يبدو يتلف آلية التنظيم الحرارى ، كما أن هذه الآلية قد تتلف أيضا إذا أصيب الحبل الشوكي ، ومثل هذه الإصابات قد تحول حتى الإنسان الى ما يشبه متغيرات الحرارة الحقيقية • وصغار الطيور لا تستطيع أن تنظم حرارة أجسامها ، فهذه قدرة لا تتطور الا بتقدم العمر •

يتضح لنا الآن أنه من المعقول أن تكون المادة الدقائقية التى قذف بها اصطدام الكويكب والنشاط البركانى الذى حدث فى أعقابه ، قد تسببت فى فترة طويلة من الظلام • كما يتضح أن مثل هذه الفترة يمكن أن تفسر نمط الانقراض الذى قد حدث • غير أنه من المؤكد أيضا أن الظلام إذا ما استمر سنينا فسيقود الى تبريد حاد فى جو الأرض • لقد انخفضت الحرارة انخفاضا ملحوظا فى السنين التى أعقبت انفجار كراكاتوا عام ١٨٨٢ • وليس هذا هو المثال الوحيد لدينا • فلقد كان شتاء عام ١٧٨٤ قاسيا بشكل غير عادى • وقد عزا بنجامين فرنكلين هذا - وربما كان على حق - الى ما أسماه « الضباب الجاف » الناتج عن غبار انفجار بركانى • ونحن لا نعرف بالضبط ما كان يعنيه فرنكلين بالضباب الجاف ، ولكننا نعرف أن وجود أى نوع من القيم الدقائقية فى الطروبوسفير يؤدى الى تدفئة الجو ، وبذا فلا بد أن يكون « الضباب » موجودا فى الستراتوسفير (انظر صفحة ١٢٩) • ربما كان إذن قد شاهد طبقة رقيقة دائمة من السحاب المرتفع •

قد تكون قصة فرانكنشتاين ومسحه ثمرة انفجار بركانى • إذ من المحتمل جدا أن يكون مثل هذا الانفجار هو الذى تسبب فى الجو اللظيع صيف عام ١٨١٦ فأبقى بيرسى شيلى ومارى جودوين وكليركليمونت ولورد بيرون فى عقر دارهم اثناء زيارتهم لجنيف ، وهى الظروف الرومانسية التى قادت مارى لتكتب رواية فرانكنشتاين ، وبيرون ليكتب جزءا من « تشايلد هارولد » وكليركليمونت من بيرون وشيلى ومارى ليخططا لزواجهما الذى تم فى نهاية نفس العام • فالجو الرديء ليس دائما بالمعيق ! كان بيرون فى جنيف أصلا بسبب فضيحة علاقته بأخته غير الشقيقة ، التى استقرت زواجه لتهجره ومعها طفلتها الوليدة • شبت هذه الابنة - أوجستا آدا - لتصبح آدا لوفليس مساعدة الرياضى الانجليزى تشرلس باباج ، أول مبرمج عالمى للكمبيوتر •

لدينا براهين على أن البحار قد دفنت كنتيجة مباشرة لاصطدام الكويكب ، وعلى حدوث تبريد عام تدريجى فى الجزء الأخير من العصر الطباشيرى • ولكن لا براهين على تبريد مفاجئ على مستوى الكرة

الأرضية • ومن المؤكد أنه لم يكن ثمة تثليج • ويكاد يكون من المؤكد أن التدهور الحاد في المناخ يقود إلى التثليج ، على الأقل عند خطوط العرض العليا • فهل يعنى هذا أن علينا أن نستبعد نظرية الاظلام ؟

إذا ماكان الظلام التام قد خيم على العالم فترة بلغت سنينا ، فإن هذا لا يعنى بالضرورة أن سطح الأرض قد برد • نحن نعرف في حالتنا هذه أن الكثير من الغبار قد دخل الغلاف الجوى ، ونحن نعرف أيضا أنه لم يحدث ثمة تبريد كبير • وعلى هذا يمكننا أن نستنتج أننا نتعامل مع واقعة تختلف تماما عن واقعة انفجار كراكاتوا أو أى انفجار بركانى آخر • أننا نخدع أنفسنا إذا افترضنا أن الواقعة تشبه واقعة كراكاتوا ، ثم نتصور أن آثارها هى مضاعفات لآثار كراكاتوا ، ثم لا نجد شواهد من الآثار التى اعتبرناها حتمية ، فنرفض بذلك الواقعة نفسها •

إن وجود الجسيمات الدقيقة للمواد الصلبة فى الغلاف الجوى يمكن أن يغير المناخ ، لكن طريقة أحداث هذا الأثر معقدة ، وتتوقف على الجسيمات نفسها وعلى موقعها • ولكى نفهم هذا علينا أن نتمعن قليلا فى الغلاف الجوى نفسه • وهذا ما سنفعله فى الفصل التالى حيث سنعالج الطرق التى يمكن بها للكويكب المصسطدم أن يغير مؤقتا من تركيب الهواء نفسه ، ربما ليعتمه ، مسهما بذلك فى الاظلام ، ومنتجا بكل تأكيد ظروفًا غير ملائمة لحياة النبات أو لحياة الحيوان أو لهما سويا •

أما عن الاظلام الطويل ، فسنتكفى الآن بالقول بأنه من الممكن أن يكون العالم مظلما ، وأن يظل رغم ذلك دافئا • ومن الممكن أن نستخدم الظلام فى تبرير الانقراض — مدى وتوزيعا — وليس هناك من سبب يدعو للفرض بأنه لم يحدث •

الفصل الثامن

التلوث الرهيب للجو

بعد الثورة المذهلة لبركان جبل سان هيلين بولاية واشنطن يوم ١٨ مايو ١٩٨٠ ، تلك التي دفنت ٧ ملايين هكتار من الأرض تحت الرماد ، تقدم بعض المهتمين من الظرفاء بشكاوى الى وكالة حماية البيئة الأمريكية . بلغ سمك الرماد فى بعض المناطق ٧٥ سنتيمترا ، وغطى أوراق النباتات حتى بعد ٢٠٠ كيلو متر من مكان الانفجار بحيث تعذر التمثيل الصوئى . اراد المواطنون أن يعرفوا اللوائح التي ستعدها الوكالة لتجعل من انفجار البراكين بهذه الطريقة فى المستقبل أمرا غير قانونى . فلو أن الجبل كان مصنعا ، فلن نجد على أية حال شاهدا محترما يشهد بقيمة المصنع الجمالية (السابقة) او قيمته الخدمية او العلمية (الحالية) ليحمى صاحبه من سجن طويل ، ومن القضايا المدنية التي ستكلفه بلا شك مكاسبه خلال العشرة ملايين سنة القادمة . كان المواطنون الظرفاء بالطبع يمزحون ، لكنها مزحة - مثل كل نكتة جيدة - لها لب من التفكير العميق .

يزعجنا التلوث الذى نسببه . ونحن على حق فى ذلك . ولكن لا يجب أن ننسى أن أمنا الطبيعة عندما تنوى أن تقوم بعملية التلويث فانها تفعل ذلك على مستوى هائل حقا ، والتلوث الذى تصنعه لا يقل ضرره عما تصنعه نحن .

بعد أن خمد بركان سانت هيلين غدا هواء واشنطن فى مثل نقائه (او تلوثه) قبل الانفجار . سقط على الأرض الرماد الذى كان موجودا بالهواء السفلى - الذى يتنفسه الانسان - كان التنفس صعبا بعد الانفجار مباشرة ، ولكن ذلك لم يستمر الا وقتا قصيرا جدا ، تقصد أن الغبار قد هبط بسرعة . فى نفس الوقت كانت الغازات فى الرأس التي ارتفعت الى أعلى فى الهواء قد تفاعلت وتركت وراءها سحابة من قطيرات

دقيقة جدا من حامض الكبريتيك انساقت عبر العالم كله . التقط فريق من العلماء الأوربيين (م . أكرمان ، س . لينز ، م . ليشيفالييه) صورا فوتوغرافية مستخدمين كاميرات - يمكن التحكم فيها من بعد - تحملها بالونات الى ارتفاع ٣ كيلو مترا . ولقد بينت هذه الصور انه بينما كان هواء الستراتوسفير فوق أوربا صافيا بدرجة معقولة يوم ٧ مايو ، الا ان ثمة ضبابا أبيض من القطيرات يتراوح سمكه ما بين ١٠٠ متر وبضعة كيلومترات ، نشر يوم ٥ يونيو ملأه يصعب من خلالها رؤية قمم السحب من تحتها . توقع هؤلاء العلماء ومثلهم كثير من الناس ان يقوم هذا الضباب بتقليل كمية الاشعاع الشمسى الذى يصل الى الأرض ، وبذا تنخفض حرارة الهواء ، مسببا صيفا فقيرا وشتاء قاسيا . ولكن ثبت خطأهم . كان شتاء ١٩٨٠ - ١٩٨١ شتاء معتدلا .

هذا المثال يبين خطأ الافتراض بأن الوضوح هو سمة علم الأرصاد الجوية . لا شيء بسيط فيما يحدث فى الغلاف الجوى ، الكثير منه غير مفهوم جيدا ، وغير مفهوم اطلاقا . والكويكب المصطدم بالأرض سيذف فى الهواء - بجانب الضباب - بكميات من الجسيمات الصلبة اكبر بكثير مما يذف به أى بركان ولكن هذا لا يستتبعه ان تكون النتيجة هى الجو البارد .

يجب ان نعتبر الغلاف الجوى مقسما الى طبقتين : غلاف داخلى وآخر خارجى يفصلهما حد واضح (الحقيقة ان ثمة اغلفة خارجية اكثر ، لكنها لا تهمننا) . الغلاف الداخلى أو السفلى يسمى الطروبوسفير ، ويمتد من سطح الأرض حتى الحد الفاصل الذى يسمى الطروپوبوز ، والذى يختلف ارتفاعه من مكان لآخر ، ومن يوم ليوم ، وقد يصل ارتفاعه الى عشرة كيلومترات فقط فوق القطبين وقد يزيد عن عشرين كيلومترا فوق خط الاستواء . والكثير من الطائرات الحربية والمدنية الحديثة تطير بانتظام داخل الستراتوسفير ، وهو الغلاف الخارجى . وهذا الغلاف يمتد لارتفاع يبلغ نحو ٨٠ كيلومترا ، حيث يفصله حد آخر - يسمى الستراتوبوز - عن الطبقات اعلاه .

والطروبوسفير والستراتوسفير كلاهما مكونان من الهواء : ٧٨٪ تقريبا من النيتروجين و ٢١٪ من الأكسجين ، وباقي المائة من ثانى اكسيد الكربون ، والارجون وغازات اخرى ، بجانب كميات متغيرة من بخار الماء ، الذى يكاد ينحصر وجوده فى الطروبوسفير . وفى الطبقات الوسطى من الستراتوسفير - ما بين ١٥ و ٣٠ كيلومترا فوق سطح الأرض - تتسبب الأشعة فوق البنفسجية النافذة فى تفكك جزيئات الأكسجين المعادية التى مكوناتها من الذرات ، لتتخذ بعض هذه الذرات فى مجاميع

من ثلاث ذرات - لا اثنين - فيصبح الأكسجين أوزونا . وهذه هي طبقة الأوزون .

ثمة فارق هام مابين الطروبوسفير والستراتوسفير تسببه درجة الحرارة فهما فحرارة الهواء في الطروبوسفير تتناقص بالارتفاع ، ويختلف مدى معدل التناقص من مكان لآخر ، ومن وقت لآخر ، حسب الظروف الجوية ، كما أن التقلبات الحرارية المحلية قد تنتج وضعاً مؤقتاً يحبس فيه هواء ساخن فوق هواء بارد ، بحيث تزداد الحرارة فعلاً مع الارتفاع ، لكن النمط العادي هو انخفاض الحرارة بزيادة الارتفاع . أما في الطروبوبوز فتتراوح درجة الحرارة ما بين - ٥٥ و - ٩٠ درجة مئوية . وتبقى هذه الحرارة ثابتة في المناطق السفلى من الستراتوسفير ، أما في المستويات العليا منه فتبتدئ الحرارة مرة أخرى في التزايد لتصل إلى ذروتها (+ ٢° م) على ارتفاع ٥٠ كيلومتراً ، ثم تتناقص مرة أخرى في الستراتوسفير الأعلى حتى تصل - على بعد ٨٠ كيلومتراً - إلى نحو - ٨٣° م . والأرقام ليست مهمة ، لكن حقيقة انخفاض الحرارة مع الارتفاع داخل الطروبوسفير - وليس في الستراتوسفير - هي أمر هام حقاً .

تخيل الشمس ساطعة تدفئ منطقة من سطح الأرض . سيبدأ الهواء الملاصق لهذا السطح الدافئ . فإذا ما أصبح دافئاً تحركت جزيئاته بعنف أكبر ليتمدد الهواء ، وفي تمده تقل كثافته ، وبانخفاض كثافته يصبح أخف من الهواء الأبرد الذي يحيط به ، وبذا يرتفع إلى أعلى ، وبارتفاعه تنخفض حرارته ، سيرتفع ليصل في نهاية المطاف إلى نقطة عندها تصبح حرارته وكثافته مساوية لنظيرتيهما بالهواء المحيط ، عندئذ يتوقف عن الصعود . فإذا ما كان في البداية أدفاً بكثير من الهواء المحيط ، فقد يستمر في الصعود حتى يصل إلى الطروبوسفير . على أنه ما أن يصل الطروبوبوز حتى يكون قد برد ليصل إلى نفس حرارة الهواء من فوقه . وهو لا بد أن يبرد لأن الطروبوبوز هو الحد الذي فوقه تثبت الحرارة ولا تتأثر بالارتفاع . وعلى هذا فإن الهواء لا يدخل الستراتوسفير .

وحزمة الهواء الصاعد هذه هي مجرد شيء نظري تماماً . ففي العالم الواقعي لا يتسبب مثل هذا التسخين السطحي في حزمة واحدة من الهواء الساخن ، إنما في تيار من الهواء الصاعد - تيار حراري يزيد من بهجة قائدئ الطائرات الشراعية ومن يتدلى منها . والحقيقة الأساسية هي أن ما يدخل الستراتوسفير من هواء الطروبوسفير قدر

ضئيل جدا . رحيثما يكون الهواء أبرد من الهواء المحيط به وأكثر كثافة فإنه سيهبط ، وينفس الشكل بالضبط ستجد أن الطروبوسفير يمنع هواء الستراتوسفير من الهبوط ، لأن درجة الحرارة تبقى ثابتة مباشرة بعد الحد الفاصل ، مهما كان الارتفاع . يتم تبادل الهواء عبر الطروبوزون ، لكن هذا لا يحدث في معظمه الا فوق خط الاستواء ، حيث يدخل الهواء الستراتوسفير ، وفوق القطبين حيث نترك الهواء الستراتوسفير . ومعدل التبادل بطيء ، والطبقتان متميزتان تماما .

وأولى نتائج هذا هو أنه لا يمر الى الستراتوسفير الا قدر ضئيل فقط. من أية مادة تدخل الطروبوسفير ، لكن أيما من هذه المواد التي تحجز عبر الطروبوزون تميل الى البقاء في منطقة دخولها . ومرور أية مادة دقائقية من الطروبوسفير الى الستراتوسفير عملية صعبة كمثل مرور جزيئات الغاز ، لكنها ان نجحت في الدخول فستبقى في الستراتوسفير فترة جد طويلة .

وثانية النتائج هي أن الستراتوسفير يميل لأن يكون ثابتا جدا ، وأن يكون الهواء بداخله جافا جدا . وهو جاف لأن بخار الماء لا يمكنه ان يدخل الغلاف الجوي الا عن طريق التبخر من سطح الأرض ، وبازدياد الارتفاع في الغلاف الجوي يتكثف الماء - بل ونكاد نقول يعصر الماء - ثم يسقط . وحرارة الطروبوزون منخفضة لدرجة لا تسمح الا لبضعة أجزاء من المليون من بخار الماء بالبقاء في الهواء ، وبذا فكمية الماء الموجودة في الحد الفاصل والتي يمكنها العبور الى الغلاف الجوي الأعلى كمية ضئيلة جدا . والستراتوسفير ثابت لأنه محدد ضد الحوادث العنيفة التي تجعل الطروبوسفير منطقة مضطربة .

هذا الاضطراب يسببه تبادل الحرارة بين سطح الأرض وسطح الماء وبين الهواء الموجود فوقهما مباشرة ، إذ أن هذا التبادل يتسبب في تكوين كتل كبيرة من الهواء لها درجات حرارة مختلفة تتحرك في مواجهة بعضها البعض ولا تختلط الا ببطء . وتحدث العواصف عندما تتركب كتلة هواء ساخنة أخرى من هواء بارد . ومثل هذه الكتل لا تمتزج الا ببطء ، لأنه بالرغم من تدفق الهواء من المناطق ذات الضغط المرتفع الى المناطق ذات الضغط المنخفض ، فإن دوران الأرض يحرف الهواء المتحرك ناحية الشمال أو ناحية الجنوب . فالهواء على أية حال يتحرك مع الأرض في دورانها ، لكن السرعة الفعلية للدوران تختلف باختلاف خط العرض - نعني أن نقطة على خط الاستواء لا بد أن تتحرك مسافة أكبر من أخرى قرب أحد القطبين ، كي تكمل الدورة اليومية ، وبذا فلا بد

ان تتحرك اسرع • والهواء الذى يتحرك الى الشمال او الى الجنوب يشرع فى حركته بسرعة دوران خط العرض الذى يتقديء منه • فهو يتحرك شمالا فى نصف الكرة الشمالى ، والجنبة تجاه الشرق - التى « يكتسبها » ستكون اذن اسرع من الحركة الى الشرق فوق المنطقة التى يدخلها ، وبذا فانه يتحرك الى الشرق ١٠٠ ما اذا تحرك نحو الجنوب ، فان الانحراف سيكون فى الاتجاه العكسى • وتكون النتيجة هى أن يتحرك الهواء حول مناطق من ضغط عالى او منخفض فى شكل حلزونى ضحل ، بدلا من التحرك مباشرة نحو المركز أو منه •

فى خضم هذا كله يقوم السطح غير المستوى للأرض بإعاقة الهواء المتحرك ، كما تتحول الرياح بسببه الى دوامات دائرية حول العوائق ، ثم أنه يتسبب فى رفع الهواء وتبريده - وربما فقد أيضا بعضا من رطوبته - أثناء عبوره المناطق المرتفعة ، ليهبط ويصبح دافئا بمروره فوق الأراضي المنخفضة • أما داخل كتل الهواء نفسها فسنجد أن التسخين والتبريد السطحي التفاضلي يتسبب فى ظواهر حمل حرارى محلية • ان هذا الاضطراب ، هذا التقلب اللازم ، هو ما يصنع مناخ الأرض • ولما كان للماء أهميته ، وهو دائما ما يغير فى حالته (فهو صلب أو سائل أو غاز) فانه لا يغير فقط من المناخ ، انما يجعل من الصعب أيضا أن يقولب المناخ بدقة ، ليصبح تنبؤنا به أمرا يكتنفه الشك • ليس اذن من المستغرب أن يخصص البعض من اكبر الحاسبات العلمية فى العالم لتنميط نماذج للمناخ •

غير أن المناخ يقتصر كليا على الطروبوسفير • ويؤثر الستراتوسفير بقوة على ما يحدث فى الطروبوسفير ، وأن كان اثره غير مفهوم جيدا ، لكنه لا يعرف المناخ المألوف لنا •

دعنا نعود الآن لكل هذا الغبار الذى نفترض دخوله فى الغلاف الجوى عقب اصطدام الكويكب • ان معظم هذا الغبار كما ذكرنا سيقتف به بعنف الى الغلاف الجوى العلوى ، بل أن بعضه قد يطرد بخارج هذا الغلاف تماما • لكن بعضه الآخر سيبقى فى الطروبوسفير • وتسمى الجسيمات الدقيقة التى تسبح فى الغلاف الجوى علميا باسم « ايروسولات » • وستستعمل هذه الكلمة فيما يلى فى وصف هذه الجسيمات •

ان الاضطراب فى الطروبوسفير يضمن الا تبقى الايروسولات به طويلا ، فهى تقسل أجلا او عاجلا بواسطة الأمطار ، أو هى تحمّل

بحركة الهواء لتتلمس اسطح تلتصق بها • وهى ان لم تكن كبيرة جدا
فستسقط ببطء بسبب وزنها : فلزوجة الهواء تعارض قوة الجاذبية
المؤثرة عليها • وهى تجدد من فوق عندما يفقدها الطروبوسفير ، وبرغم
المعدل البطيء للتبادل عبر الطروبوز ، فثمة تبادل يحدث ، وستظل
الايروسولات تدخل الطروبوسفير حتى يستهلك كل الرصيد بالمستويات
العليا •

يمكن للايروسولات ان تؤثر فى حرارة الستراتوسفير ، ولكن هذا
لايعطى بالضرورة اثرا مماثلا بالغلاف الجوى السفلى • ان الأمر يتوقف
على الايروسولات نفسها ، فاذا كانت صغيرة جدا – قطرها يبلغ نحو
واحد من عشرة الاف من المليمتر – فالأغلب ان تتسبب فى تبريد الجو
السفلى ، اما اذا كانت اكبر من ذلك ، فقد لا تؤثر على الاطلاق ، او قد
تسبب بعض التدفئة •

ان حجم الايروسولات يحدد ما تؤثر فيه من موجات الاشعاع ،
كما ان لونها يحدد ما اذا كانت ستمتص الاشعاع ام ستعكسه • فالغلاف
الجوى يتلقى الاشعاع من الشمس ، ومعظمه قصير الموجة ، كما يتلقى
اشعاعا طويل الموجة من سطح الأرض نفسها اذا ما سخن ، فالسطح
الساخن يصدر اشعاعات طويلة الموجة • والايروسولات الدقيقة جدا
يمكنها ان تعترض الاشعاع القصير الموجة ، وهذا الاشعاع اذا ما انعكس
تشقت ، ولكن لما كان الاشعاع يأتى من أعلى ، فان الانعكاس فى معظمه
سيعود به الى الفضاء • فاذا نظرنا من الفضاء ، فسنجد ان وجود
الكثير من هذه الايروسولات يتسبب فى ان تبدو الأرض أكثر لمعانا : فهى
تزيد من البידو الأرض (قدرتها على الانعكاس) •

اذا ما امتصت الايروسولات الاشعاع سخنت وبعثت بأشعاع طويل
الموجة ، ولما كانت الايروسولات نفسها الآن هى المصدر ، فسيتم الانبعاث
فى كل الاتجاهات ومنها الاتجاه الى أسفل • وكمية الاشعاع الداخل
فى الغلاف الجوى ككل تكاد تعادل بالضبط كمية الاشعاع الخارج منه •
فاذا لم يكن الأمر كذلك ، فان الأرض تغدو أدفا او أبرد •

والايروسولات الستراتوسفيرية قد تعكس الاشعاع ، وقد تمتصه
وتعتمد تشعيه • وفى كلتا الحالتين فانها تعجل من تصدير الحرارة من
هذه المنطقة من الغلاف الجوى ، وتكون النتيجة بالضرورة هى تبريد
الستراتوسفير • على أنها اذا قامت بإعادة التشعيع فان نسبة من هذه
الطاقة المصدرة ستدخل الطروبوسفير ، ليعترض البعض منها
الايروسولات الطروبوسفيرية ، اما البعض الباقي فسيمر الى السطح

ليسخنه ، أو يسخن الايروسولات المعترضة مما يتسبب في اعادة التشميع . مرة أخرى سيفقد الى الفضاء بعض من هذا الاشعاع المعاد وسيوجه البعض الآخر الى اسفل ، ليسخن الأرض مرة أخرى ، وليعترض البعض منه ايروسولات أخرى تسخن وبهذه الطريقة يمكن ان تقع الطاقة في شرك الطروپوسفير .

وفي الطروپوسفير تتسبب الايروسولات الفاتحة اللون - ذات الالبيدو المرتفع - في التبريد ، بينما تتسبب الغامقة اللون - ولها قيمة البيدو منخفضة - في التدفئة . وفي عالمنا المعاصر نجد أن معظم الايروسولات الشائعة في الستراتوسفير هي من حامض الكبريتيك ، وله قيمة البيدو عالية ، وهو يتكون في الستراتوسفير نفسه بأكسدة مركبات الكبريت الغازية التي تدخل عبر الطروپوبوز . والايروسولات الأكثر شيوعا في الطروپوسفير هي حامض الكبريتيك وأيضا سلفات النشادر والتراب - وهذا من رماد الصخور ، ولهذين الآخرين قيمة البيدو مرتفعة ، وهما يبردان السطح . أما السناج (الهباب) فله قيمة البيدو منخفضة ويسبب التدفئة .

في مقالة نشرت بمجلة العلوم الأمريكية عام ١٩٨٠ قام المؤلفان أوين ب . تون ، جيمس ب . بولاك بتلخيص الوضع الحالي لمعرفتنا بأثر الجسيمات الدقيقة بالغلاف الجوى : « يمكن لايروسولات الغلاف الجوى ان تؤثر في المناخ ، لقد فعلت ذلك مؤكدا في الماضي ، والأغلب انها تقوم بذلك الآن أيضا . أما نوع الأثر فيتوقف على حجم الايروسولات وتركيبها ، وموقعها - ان كانت في الطروپوسفير أو الستراتوسفير ... فاضافة المواد الشبه شفافة الى الغلاف الجوى السفلى - مواد كالكبريتات ومعظم جسيمات التربة - يسبب تبريد سطح الأرض ، أما اضافة المواد المعتمة الى الغلاف الجوى - مواد كالسناج - فيسبب دفء هذا الغلاف . ولما كانت أنشطة الانسان تضيف السناج والكبريتات والتراب الى مناطق مختلفة من الغلاف الجوى السفلى ، فمن الجائز أن تدفأ بعض الجهات بينما تبرد غيرها ، »

لماذا ما تفحصنا الايروسولات التي تدخل الطروپوسفير نتيجة لثورة بركانية أو لاصطدام كالأذى قمنا بوصفه ، فان أكثر الآثار احتمالا سيكون تدفئة السطح . أما ايروسولات الستراتوسفير فقد تنتج تبريدا أو تدفئة لسطح الأرض .

قد يتسبب هذا في بعض التشويش ، إذ يبدو مناقيا للعقل . فأنت اذا خرجت للتنزه في يوم غائم الشمس ، فستشعر بأن الجو ابره

من يوم صنعوا ضايفى السماء . وحواسك لم تخدعك هنا : فانت لا شك تشعر بأن الجو أبرد . فالغيم يقلل كمية الاشعاع الشمسى المباشر الذى نتلقاه - اذ يمتصه هو بعيدا من فوق رأسك - والاشعاع الشمسى المباشر هو ما يدفئك . والغيم يشكل ملادة تمتص ايضا الحرارة التى يعاد تشعيعها من سطح الأرض . ستشعر بالبرد ، لكن الجو سيكون بالفعل أدفأ - بل وكذا البيئة كلها ، لأن الحرارة المشعة تمتص وتوزع خلال كتلة تضم الغلاف الجوى على طول المسافة حتى قمة الغيم .

تعطى جزيئات ثانى أكسيد الكربون وبخار الماء اثرا مدفئسا أيضا عن طريق يختلف بعض الشيء ، وكان الموضوع ليس به ما يكفى من التعقيد ! فهى شفافة تمرر الاشعاع القصير الموجة ، لكنها معتمدة بالنسبة للاشعاع الطويل الموجة ، وعلى هذا فهى تسمح بمرور الاشعاع القادم ، أما الاشعاع الطويل الموجة الخارج فتحبسه وتعيد تشعيه ، وهذا ما يسمى « ظاهرة الصوبة » ، وإن كانت « الظاهرة » فى الصوبة تحدث أساسا بسبب الزجاج ، فهذا شفاف أيضا للموجات القصيرة ومعتم للموجات الطويلة ، لكن أهم آثاره هو أنه يمنع انتشار الهواء ، وبذا يحبس الهواء الذى يسخن ، فلا يمل محله هواء بارد من الخارج .

من سنين قليلة مضت كان البعض يعتقدون أن ما يقوم به الانسان من احراق للوقود الهيدروكربونى (الفحم ، والبترول ، والغاز الطبيعى) سيجعل الأرض أدفأ ، وأن ضخ الايروسولات فى الهواء عن طريق المصانع والتوسع العالمى فى الزراعة سيجعل الأرض أبرد ، وبذا سينعادل كل منهما الآخر . ونحن نعرف الآن أن هذا خطأ . أن مناخ النصف الشمالى للأرض يبرد لأسباب لا علاقة لها بالنشاط البشرى ، كما أن أثر ما يسببه الانسان من انتاج لثانى أكسيد الكربون ، وانتاج للايروسولات إنما هو أثر تجمعى - فلا يعادل أحدهما الآخر : فكلاهما يرفع حرارة الأرض .

أردنا أن نؤكد تعقيد الوقائع فى الغلاف الجوى ، لا سيما تلك التى تتضمن الايروسولات ، كى نبين أن فكرة الفارس عن الظلام لا تتعارض بالضرورة مع ما نعرفه من عدم حدوث تبريد على مستوى الكرة الأرضية . ليس ثمة وسيلة يمكننا بها معرفة تركيب سخابة الغبار التى نجمت عن اصطدام الكويكب . ولما كان قدر كبير من المادة التى تكون هذه السحابة قد دخل الغلاف الجوى فى صورة سحابة بلازمية أو من سحابة بلازمية ، فمن الواضح أننا لا نستطيع أن نعتبر هذه السحابة شكلا مضخما مما ينتج عن بركان جبل سانت هيلين . لقد كانت مختلفة تماما .

انما الشيء المؤكد هو أن أفراد ذلك القدر الهائل من الطاقة في الغلاف الجوي ، وضخ هذا القدر الرهيب من مادة الصخر والبحر فيه ، قد تسبب في « واقعة تلوث » لم يسبق أبدا أن رأينا مثله ، ونأمل ألا نراها أبدا .

لعلك تذكر أن الغلاف الجوي مكون من نحو ٧٨٪ نيتروجين و ٢١٪ أكسجين . ولقد كان للغلاف الجوي نفس هذا التركيب منذ ٦٥ مليون عاما . عندما يسخن الهواء تسخيناً شديداً يتأكسد النيتروجين ليكون سلسلة من أكاسيد النيتروجين . وهذا يحدث مثلاً مع طاقة البرق ، وهو يحدث في النيران الحارة ، كما يحدث في آلات الاحتراق الداخلي ذات الضغط العالي . وتهتم حكومات العالم بتقليل مثل هذا العادم الناتج عن المركبات التي تسير بالبنزين وعن أفران الصناعة .

إننا نفترض تحرر قدر كبير من الطاقة ، ويبدو من المؤكد أن هذا سينتج قدراً كبيراً من أكاسيد النيتروجين . فالأجسام التي تتحرك بسرعة خلال الهواء تسبب أكسدة النيتروجين . ولقد حسب شوك بارك (في وثيقة للناسا * ظهرت عام ١٩٧٢) أن مكوك الفضاء قد يولد عشرة أطنان من أكسيد النيتريك في كل مرة يدخل فيها الغلاف الجوي . كما أن هذا العالم قد وجد مع جين ب . مينيز (١٩٧٦) أن نسبة كبيرة من أكسيد النيتريك - الذي نعرف بوجوده في الغلاف الجوي - قد نشأت عن الأجسام النيزكية ، ومعظمها على ارتفاع يبلغ نحو ٩٥ كيلومتراً . ولاكسيد النيتروجين آثار عديدة . فهو يتأكسد وتهدرت فتحصل النترات وحامض النيتريك ، وهو يتفاعل في وجود الأوزون لينتج ثاني أكسيد النيتروجين ، وهذا يمتص الأشعاعات القصيرة الموجة ، ليتحلل بذلك إلى أكسيد نيتريك وأكسجين ذري . ووجود كميات كبيرة من ثاني أكسيد النيتروجين له أثر مبرد في الطروبوسفير . أضف إلى ذلك أن ثاني أكسيد النيتروجين هو مكون أساسي في التفاعلات التي تنتج الدخان الضبابي الكيميوضوي .

ويمكن أيضاً لحامض النيتريك أن يشكل نوايا تكثيف لبخار الماء ، وهذه تفصل من الهواء بسرعة كبيرة ، فإذا ما وصل حمض النيتريك التربة في مقادير صغيرة فمن الممكن أن يستفيد منه النبات في غذائه ، لكنه إن وصل في مقادير كبيرة قلت منفعته ، إذ قد يزيد من حموضة التربة وسطح الماء . ونحن نعرف اليوم أن إطلاق ثاني أكسيد الكبريت

(*) وكالة الفضاء الأمريكية .

– عن احتراق الوقود ذى المحتوى العالى من الكبريت – يسبب مشاكل
ايكولوجية وصعابا خطيرة للمزارعين ورجال الغابات فى مناطق تساقط
الغبار • وتساقط حامض الكبريتيك ستكون له نتائج مشابهة •

لقد شاع ان السبب فى المشاكل الايكولوجية الناجمة عن غبار
ثانى اكسيد الكبريت هو « المطر الحمضى » ، وهذا الاسم بيانى ويوحى
بان ملوثات الجو تغسل من الهواء لتزيد من حموضة ماء المطر ، وبالتالى
من حموضة التربة • ولقد ابتدا سوء الفهم من حقيقة ان ماء المطر
العادى حامض قليلا ، بحيث يصعب ان تقاس الحموضة التى تسهم بها
الملوثات • الواضح ان حموضة التربة كانت تزداد ، غير ان ماء المطر
الذى كان يفحص لم يكن حامضا اكثر من العادى • الى ان اكتشف فى
آخر الامر ان ملوثات الجو لا تصل سطح الأرض أساسا فى ماء المطر ،
وانما هى ترسب مباشرة من الهواء فوق التربة والنبات • وفى التربة
يتفاعل الحامض مع مركبات الألومنيوم ، لتنتج مركبات الومنيوم أخرى
تسمم الأسماك اذا ما غسلت الى مياه الأنهار •

أما اثر زيادة حموضة التربة فهو الاضرار بالكثير من
مجاميع النباتات التى لا تستطيع تحمل الظروف الحامضية •
فاذا ما تزايدت حموضة التربة الى حد معين فلن يتمكن من الحياة
عليها غير فلورا الخنافس وشبيهاته • درس اثر الاختلافات
التي تسببها حموضة التربة والماء فى الفلورا • والحموضة تقاس
بالأس السالب لتركيز ايون الايدروجين ، وقيمة مقياس أس الايدروجين
هذا (٠-١٠) بالنسبة للماء المتعادل هو ٧.٠ ونقص القيمة عن ٧ يعنى زيادة
الحموضة وزيارته عن ٧ يعنى زيادة القلوية • فى مستنقع بالمنطقة المعتدلة
قيمة ٠.١٠ فيه = أر٤ سنجد ان متوسط عدد الأنواع النباتية بالمتر المربع
هو خمسة ، فاذا كانت القيمة = ٦.٠ فقد يصل المتوسط الى عشرة
أنواع ، وقد نجد عشرين نوعا بالمتر المربع بالتربة القلوية قليلا بالمناطق
المفتوحة الجافة ، فاذا كانت قيمة ١.٠ ١.٠ اقل من ٠.٠ فلن نجد غير
نوعين أو ثلاثة • وفى الحقول والغابات والأراضى الجرداء ستطالعنا
مرة أخرى نفس الصورة : اذا نقصت قيمة ١.٠ ١.٠ عن ٠.٠ انخفض
عدد أنواع النباتات انخفاضاً حاداً • ومن بين نباتات المحاصيل الحقلية
الحالية سنجد ان الشعير وينجر السكر هما الأكثر حساسية لزيادة
حموضة التربة •

ان الأثر المتوقع لزيادة الحموضة الناتجة عن الغبار المتساقط فى
نهاية العصر الطباشيرى سيكون هو تغيير الفلورا ، وربما وقع ذلك على
مساحات شاسعة وفى مناطق كانت تربتها قلا متعادلة أو قلوية وعليها

الفلورا المناسبة ، ويجوز جدا أن تتحول مثل هذه المناطق الى صحارى - فيغيب فيها تماما الغطاء الأخضر ، ليستمر ذلك حتى تستعيد التربة حالتها الأصلية ، أو حتى تستعمرها الأنواع المحبة للحموضة . والتغير الكبير المستمر فى تركيب الفلورا بمنطقة واسعة سيكون له بالطبع اثر خطير على الحيوانات التى تعتمد على هذه الفلورا فى حياتها .

لكن التبدل الكبير المستمر فى حموضة التربة لن يكون له اثر اقل وضوحا على ايكولوجيا العشيرة الحيوانية (الفونا) بالتربة وعلى ما بها من كائنات دقيقة ، لأن هذا التبدل سيؤثر اساسا من خلال تغيرات فى التفاعلات الكيماوية المحضة . فالكثير من الكائنات الدقيقة يمكنه أن يتحمل مدى واسعا من قيم $0.1-10$ سينقضى البعض تماما وستسكاثر الأنواع التى يمكنها التحمل الى الحد الذى يسمح به الغذاء المتاح . سينخفض عدد الأنواع الى أن تغزو التربة أنواع أخرى مهاجرة مكيفة للعيش تحت هذه الظروف الجديدة . سيتزايد فقر التربة ايكولوجيا ، وهذا سيؤثر هو الآخر فى النباتات الكبيرة التى ترتبط بكائنات التربة ارتباطا حميما . ثمة مظهر يمكن به تشخيص التربة الحمضية هو وجود طبقة فوق سطح المراعى من الحشائش الميتة نصف المتحللة المتلبدة الشديدة الرطوبة . وترجع هذه الطبقة الى قصور البكتريا التى تحلل الحشائش الميتة طبيعيا ، فبالرغم من أن الحشائش نفسها تتحمل مدى واسعا من الحموضة ، الا انها لا تتعرض الا اذا ازيلت النوات القديمة لتسمح للاوراق الجديدة بالظهور والقيام بالتمثيل الضوئى .

وأنواع البكتريا المثبتة للنتروجين تتحمل جيدا انخفاض قيمة $0.1-10$ ، لكنها تتأثر بشدة بمركبات النتروجين التى تصل التربة من المصادر الخارجية . وفى الحالة التى نناقشها الآن ، سيدخل التربة قدر كبير من النترات ، كما أن الأحماض نفسها ستضيف الى النتروجين ، ولهذا السبب فأننا نتوقع أن تتدهور عشيرة الكائنات الدقيقة المثبتة للنتروجين .

أن اسهام الانسان فى حموضة الغلاف الجوى حتى الآن اسهام متواضع ، لكن آثاره فى الحق خطيرة . وفى الدول الاسكندنافية - وأرضها أصلا تميل الى الحمضية - تسبب التلوث ببريطانيا وألمانيا الشرقية والغربية وبولنده ، فى زيادة انخفاض قيمة $0.1-10$ ، فانخفضت بذلك انتاجية التربة للحد الذى دعا حكومتى السويد والنرويج الى المطالبة بالبحث عن طرق فعالة لضبط هذا التلوث الذى عبر الحدود . ولقد تأثرت الفلورا الطبيعية كثيرا فى بعض مناطق كندا والولايات الشمالية الشرقية بأمريكا من الأحماض التى تتكون أصلا بولايات وسط غرب أمريكا . ولقد كان هذا أيضا موضوع احتجاجات حكومية على

المستوى القومى والمحلى • اننا نفترض تلوثا على مستوى اكبر بكثير مما خبرناه فى عصرنا الحالى ، وليس امامنا اذن الا أن نخمن نتائج •
فهل تحولت مناطق باكملها الى صحراء ؟ ان هذا محتمل •

لقد وجدت اكسيد النتروجين فى الستراتوسفير بعد اصطدام الكويكب ، ليس فقط لأنها نقلت عبر الطروبوز ، بل لأنها تكونت فى المناطق المرتفعة كما تكونت فى المناطق المنخفضة • منذ بضع سنين تخوف البعض من أن وجود اكسيدات النتروجين فى الستراتوسفير - وكان مصدرها المحتمل عندئذ هو الأساطيل المقترحة من الطائرات التجارية التى تتحرك أسرع من الصوت - قد يتسبب فى تآكل طبقة الأوزون • لقد اقترح أن هذه الأكسيدات ستدخل فى تفاعلات تتطلب اكسিজينا ذريا ، لتكون مركبات ثابتة ، « فيحيس » الأكسجين الذرى بذلك ويمنع من تكوين طبقة الأوزون • ثم اتضح فى النهاية أن مثل هذا الأثر - لو حدث - فسيكون صغيرا جدا ولا أهمية له ، طالما بقى عدد الطائرات فى الستراتوسفير قليلا • ولقد ظهر مؤخرا أن المقادير الصغيرة من اكسيد النتروجين تؤثر بالفعل فى كيمياء الستراتوسفير ، ولكنها لا تستنزف الأوزون بل تنشط تكوينه • على أية حال ، لقد ظل حجم الأسطول العالمى من الطائرات الأسرع من الصوت صغيرا •

ماذا حدث فى واقعة الكويكب التى نحن بصدها الآن ؟ ليس ثمة من طريق أمامنا كى نعرف • ان معرفتنا بكيمياء الستراتوسفير تتحسن ، لكنها ما تزال بعيدة جدا عن حد الكمال ، فما زلنا نجهد الكثير من العوامل • من المحتمل أن تكون طبقة الأوزون قد استنزفت ، أو أنها قد استنزفت فى مناطق منها ، أو أنها قد استنزفت فى مناطق وعززت فى مناطق أخرى - تبعا لكميات اكسيدات النتروجين التى تكونت • لكن الأمر فى الحقيقة لا يهم كثيرا ، بل وسنرى حالا أنه يكاد يكون من المؤكد أن الاصطدام الهائل يمكنه أن يعطى أثرا كيمائيا آخر أخطر بكثير يتسبب فى استنزاف ضخم للأوزون • لكن هذا الاستنزاف - بفرض حدوثه - لن تكون له أهمية كبيرة • ان اختفاء طبقة الأوزون بالكامل لن يكون بالخطورة التى يفترضها بعض علماء البيئة • واقل ما يمكن أن نقوله هو : لو أن كويكبا قطره عشرة كيلو مترات اصطدم بكل قوته بالأرض ، فإن فقد طبقة الأوزون لن يكون الا واحدة من آتفه النتائج !
يزيد من تعقيد هذه الصورة حقيقة أن افراد كمية كبيرة من الطاقة فى الغلاف الجوى سيكسر الروابط التى تربط الذرات داخل الجزيئات سينتج عن هذا قدر كبير من الأكسجين الذرى ، يتحول بعضه الى أوزون ، وبذا فإن الواقعة نفسها ستضيف الى الأوزون بالغلاف الجوى ،

وسيصبح هذا الأوزون فى الطروبوسفير نوعا من التلوث : فالأوزون فى تركيزاته المنخفضة يثير الحيوانات التى تتنفس الهواء وهو سام جدا إلا اذا كان تركيزه ضعيفا .

أما فى الماء المالح - وسترسب مركبات النتروجين فوق البحار كما تترسب فوق اليابسة - فإن الانخفاض الحاد فى قيمة $^{10-6}$ سييدل الكثير من التفاعلات الكيماوية . سيحدث فى حالتنا هذه تغير فجائى اعتبارا فى قيمة $^{10-6}$ تصبحه طاقة نعرف انها قد رفعت حرارة الماء فى العالم كله . كل هذا سينتج أثارا معقدة يحتمل أن تكون مؤذية ، وأن كان الأغلب أنها ستحدث فى مناطق محلية ، ذلك أن للبحر عمله الكبير فى الموازنة . ولكى يكون التغير فى الكيمياء أكثر عمومية يلزم أن ترسب المواد فى البحر بكميات ضخمة . من بين التفاعلات التى ستتحور محليا تلك التفاعلات التى تدخلها أيونات الكربونات والبيكربونات ، الشيء الذى سيؤثر فى الكائنات البحرية عموما ، ونخص منها بالذات الحيوانات ذات الأصداف الكلسية . ولقد قتل من هذه الكائنات بالطبع أعداد هائلة فى نهاية العصر الطباشيرى .

علينا أن نتذكر أيضا أن زيادة ثورات البراكين فى العالم ككل - لا سيما فى منطقة شمال الأطلنطى اذا ما اعتبرنا أن بزوغ آيسلنده كان نتيجة للواقعة - هذه الزيادة قد حدثت فى الغلاف الجوى عناصر أخرى تكون الأحماض - من بينها بالذات عناصر كبريتية .

لكى نتفهم ما نخمنه عن الكيمياء مباشرة بعد اصطدام الكويكب ، فإننا نحتاج أن نعيد التأمل فى طبيعة الاصطدام نفسه . دعنا نفترض أن الجسم قد دخل رأسيا ، وأنه وصل سطح البحر بعد ١٠ ثوانى من ملاقاته الحافة الخارجية للغلاف الجوى على ارتفاع ١٦٠ كيلومترا . عندما وصل الجسم سطح البحر لابد وأنه كان يدفع أمامه بضعة أمتار من الهواء المتوهج المضغوط للغاية . هذه الطبقة ستحتوى تقريبا كل الهواء فى عمود عرضه عشرة كيلو مترات هو مسار الكويكب . وفى دخوله الى البحر ستنشق منطقة مشابهة من البلازما . المكثفة المتوهجة ، وذلك خلال الثانية أو ما أشبه التى سيستغرقها حتى يصل قاع البحر . وفى خلال هذا ستسخن مقدمة الكويكب وستضغط بنفس الشكل بينما تنتقل موجة الصدمة الى أعلى . وتكون المرحلة الأخيرة هى ملاقات الجسم لصخور قاع البحر ، عندئذ سيكون الجسم ما يزال يحتفظ بنحو نصف طاقته الأصلية ، وستكون سرعته قريبة من ٤٠ ضعفا لسرعة الصوت .

ستضاف الصخور الى شظيرة البلازما المكونة من الهواء والبحر . وأخيرا فإن قوة الصدمة ، على عمق كبير نسبيا - ١٩ كيلومترا على

الأقل - ستكون وقد تعادلت مع الضغط الرهيب للبلازما ، التي ستكون قد سخنت الى حرارة أعلى من حرارة الشمس • هنا لن يكون ثمة بقايا صلبة من الكويكب نفسه ، لكن سحابة البلازما الكثيفة التي حلت محله ستتمدد منفجرة الى أعلى ، تدفعها الضغوط الهائلة الناتجة عن شظيرة الهواء - البحر - الصخر الموجودة تحتها • وسيبدو وكأن الجسم قد ارتد •

لن يستغرق الوقت من الارتطام حتى الارتداد أكثر من بضع ثوان • فى خلال هذه البرهة سيكون ماء البحر وقاع البحر قد بدا بالكاد رحلتها الطويلة - البطيئة نسبيا - نحو الحواف القصية للحفرة التي قدر لها ان تتشكل - فبين الجانبيين ثمة ما يقرب من ٢٠٠ كيلو متر • أما ما يتحرك من البحر والصخر لمتشكل الحفرة فسيبلغ ٦٠ ضعفا حجم الكويكب نفسه • فإذا كان التحرك بسرعة الصوت ، فان هذا يعنى ان نحو ٣٠٪ من طاقة الاصطدام سيبدل فى تشكيل الحفرة ، ليتحول الباقي الى حرارة البلازما وحركتها ، الا من قدر ضئيل يضيع فى مواجهة الانجراف اثناء المرور خلال الماء والصخر • أما الطاقة التي تفقد اثناء مرور الكويكب خلال الهواء وفى الظواهر المعنيطوهيدروديناميكية فيبدو انها قد لا تصل لأكثر من بعض فى المائة •

المادة الا تسبب الأجسام ، التي تدخل غلاف الأرض الجوى من الفضاء لتصلطدم بالسطح - أى ارتداد للمادة الى الفضاء • لو أن هذا قد حدث فى تاريخ الأرض ، فلا بد أن يكون قد حدث أيضا فى القمر حيث سرعة الافلات اقل وكمية الطاقة اللازمة لطرد المادة الى الفضاء اقل • ولو أن الاصطدام بالقمر قد تسبب فى طرد بعض مادته القمرية الى الفضاء ، فلا بد وأن قد وصل الأرض بعض منها • لكننا نعرف انه ما من نيزك من أصل قمرى قد عثر عليه فوق الأرض • غير أن الأرض فريدة فى غطائها المائى ، ومن الجائز أن ارتداد كويكب ، من خمسة أميال من المحيط ، مضغوطا الى بلازما ، قد يقذف على الأقل ببعض من بقايا الجسم فى مدار حول الأرض •

دعنا نترك للمحظة معالجة تلوث الغلاف الجوى لنتأمل مصير الكائنات البحرية ، ودعنا ننحى الآن جانبا المحيط المفتوح العميق الذى تتأثر فيه عشائر الكائنات الحية ، لنفكر فى المياه الأضحل على رفوف القارات حيث توجد العشائر الكثيفة • أيا كان ما حدث ، فانا لا نتوقع ان يبقى الكثير من الكائنات الحية فى شمال الأطلنطى • ثم أن ما تبقى لابد وأن كان يحيا فى الطين أو فى قاع البحر • أما الكائنات التي لم تتبرخ فى المياه العليا - والتي يلزم ان نعالج اسهاماتها فيما تلى من

أحداث من وجهة علاقتها بالغلاف الجوى - هذه الكائنات قد تواجدت فى صورة جثث • ماذا حدث لهذه الجثث ؟

عندما تموت النباتات والحيوانات تقوم نباتات أخرى وحيوانات باستهلاكها فى تسلسل ينتهى - كما ابتدا - بالكائنات الحية الدقيقة • بهذه الطريقة تتحلل التراكييب العضوية المعقدة الى مركبات غير عضوية بسيطة ، تعود لتدخل فى دورة الغذاء • غير أن معظم هذه الحلقة سيتحطم فى حالتنا هذه • فالكائنات الدقيقة المتبقية ستتكاثر بسرعة فى وجود هذه الوفرة من الغذاء ، لمتزايد المراد الغذائية البسيطة • لكننا نشك فى وجود نباتات تستخدمها أو حيوانات ترعى النباتات •

لن نتجرف الجثث - فى المياه العميقة - الى قاع البحر بهدوء ، لتدفنها - فى وقار - عملية الترسيب البطيئة ، لكن هذا سيحدث فى المياه الضحلة ، وستتحلل الجثث جميعا فيما عدا تلك التى حملت الى البحر الذى أصبح الدانيمارك • والماء العميق ، كالغلاف الجوى ، مكون من طبقات ، وثمة تدرج فى الحرارة كما هو الحال فى الهواء ، ويسمى المستوى الثابت الحرارة باسم مستوى الميل الحرارى أو « الثيرموكلين » ، وهذا المستوى يشكل حدا يصعب عبوره ، كما الطوربوبيوز • والمادة تبره فعلا ، وتعتمد كائنات البحار العميقة على المد الذى يصلها من أعلى ويغذيها ، لكن العبور بطيء ، ولقد تحمل الكائنات الميتة بعيدا جدا مع تيارات المحيط قبل أن تعبر الثيرموكلين • يمكننا الآن حساب حركة مثل هذه الكائنات فى المحيط الحالى ، لأن حركة التيارات معروفة لنا جيدا ، لكن شمال الأطلسى أيام ما قبل التاريخ كان مختلفا فى الحجم والشكل ، كما أن مياهه عقب واقعة الكويكب لم تكن لتسلك سلوكها فى الأوقات العادية • لنذكر أن قدرا كبيرا من الماء قد أزيل من موقع الاصطدام عند حدوثه ، ومن الطبيعى أن يحل محله شيء ، وليس من شيء الا امواه تصله من الجنوب ، فهذا هو الاتجاه الوحيد لموصول الماء الى شمال الأطلسى أيام هذه الواقعة منذ ٦٥ مليون سنة • ومن المحتمل أن يتسبب اندفاع الماء فى خلق نوع من الدوران فيمزج محتويات شمال الأطلسى - من مركبات غذائية بسيطة ومن جثث - مزجا جيدا ، مما قد يسهل عملية التحلل ، ليتحول الماء الى « حساء » غذائى شتى لا سيما فى المناطق الساحلية وعند مصبات الأنهار •

لم يكن الحساء الغذائى ليترك طويلا دون استخدام • ستتمثل النباتات البسيطة - الطحالب على الأغلب - لتستهلكه ، سيحدث ازدهار طحلبي هائل ، فى بعض المناطق على الأقل • وعندما تموت الطحالب ، فانها ستتحلل فى الأخرى •

تستهلك عملية التحلل للاكسيجين الذائب فى الماء - فالكائنات التى تقوم بعملية التحلل تحتاج الاكسيجين للنفس ، والتحلل أساسا هو اكسيد الكربون - وبذا تموت مختلفة تلك الأحياء المائية التى تتطلب ماء غنيا بالاكسيجين ، تبدأ اذن عملية « اثرء فى الغذاء » ، وتستمر الى أن تصل حدها الأقصى عندما لا يعول الماء غير عدد قليل جدا من الكائنات بجانب البكتريا . تموت الأنواع اذن الواحد بعد الآخر ، لتسهم بقاياها فى اثرء الغذاء ، وفى حالتنا هذه ، سنجد أن عشائر المياه العليا ستقتل أولا ، لكن الماء الغنى بالغذاء سيمنع عودتها .

امن الجائز أن يكون هذا ما حدث ؟ هل من الممكن أن يقود الموت الفجائى - للبلايين والبلانيين من الكائنات الدقيقة والنباتات والأسماك ، والزواحف بالطبع - أن يقود الى اثارء الشامل فى الغدء بمياه الشواطىء ومصبات الأنهار حول شمال الاطلنطى ؟ نعم ، هذا ممكن .

ثمة اثر ثانوى يرتبط باثرء مياه البحر بالغذاء هناك من الكائنات البلاكتونية ما ينتج سموها قوية . ومن المعروف أن هذه الكائنات تدهر ما بين الحين والآخر فى المياه الغنية بالغذاء . وبذا فمن الجائز أن يكون اثرء البحار بالغذاء قد صاحبه تسميم الكائنات . واثر هذه السموم قد يكون مباشرا ، فقتل الأنواع الحساسة أو تضار عند تناولها للسم ، أو غير مباشر ، بأن تتركز السموم فى أنسجة الأنواع غير الحساسة حتى اذا ما أكلتها الأنواع الحساسة ماتت . فالكثير من الرخويات على سبيل المثال يمكنه تحمل السموم ، لكن بعض الأنواع التى تتغذى على الرخويات لا تتحمل السموم ، فتموت . والواقع أن مثل هذا سيجعل قدرا كبيرا من الماء ساما لمعظم الحيوانات الكبيرة ، وربما أيضا لبعض أنواع البلاكتون . ايجوز أيضا أن يكون هذا الماء قد مزج بماء من مواقع أخرى لينشر السم ؟ ثمة اثر نهائى يشمل كلا من البحر والهواء ، وهو - كما وعدناك - أكثرها مأساوية .

يلزم أن نرجع الى طاقة الاصطدام . اذا ما اصطدمت برصيف الميناء باخرة تحمل - مثلا - ٢٠٠ ألف طن من الركاز وتسير بسرعة عقدة واحدة ، تحررت طاقة قدرها ٢٠ مليون جول (الجول هو الوحدة القياسية للشغل ، وإذا عبر عنه كهربائيا ، فهو الطاقة التى يبذلها واط واحد فى ثانية واحدة) . يمكنك أن ترى الاصطدام وتسمعه ، لكن ، لما كانت الشحنة غير قابلة للاشتعال فلن تشب النار ولن يكون ثمة دخان ولا انبعاث ضخم من الحرارة . والواقع أنه من الممكن أن تنتج نفس كمية الطاقة عن انفجار ٢٠ كيلو جرام من مادة ت.ن.ت ، لكن الانفجار هنا سيكون أكثر مأساوية لأن الطاقة ستحرر فى حجم أصغر بكثير .

ان قولنا ان الطاقة التى حصلت عن اصطدام كويكبنا تكافئ انفجار مائة مليون مليون طن من القنابل الهيدروجينية . هذا القول صحيح ، ولكنه مضلل . ستكون سرعة الاصطدام ٣٦٠٠٠ ضعف اصطدام الباخرة السابقة ، لكن معدل تحرر الطاقة سيكون اقل تركيزا بكثير من انفجار القنابل الهيدروجينية .

من الممكن ان نعبر عن شدة الطاقة فى صورة عدد الجولات للم كيلو جرام . ستكون القيمة بالنسبة لاصطدام السفينة هى ٠ ، وبالنسبة لانفجار مادة ت٠ن ١٧ مليونا ، و لاصطدام الكويكب ١٨٠ مليونا وللانفجار النووى ٢٠٠٠٠٠ بليون . ان الامر يبدو كما لو ان كل جسم من الكويكب قد صنع من مادة قوة انفجارها عشرة اضعاف قوة مادة ت٠ن ٠ ، وهى اقل مليون مرة من قوة الانفجار النووى .

تهدنا هذه الفروق . لان نوع التلف الذى ينجم عن الاصطدام يتوقف كثيرا على سرعة تحرر الطاقة وشدها . فالباخرة (ومثلها ايضا «البلدور») تحطم التراكيب الصلبة وبقوة ، لكنها لا تضر جزيئات الهواء والانفجار النووى فيه من القوة ما يكفى لصهر الذرات نفسها . اما كويكبنا - الاقوى عشر مرات من الت٠ن ٠ - فسيكون له من القوة ما يكفى كى يفتت الجزيئات الى ذرات ، والذرات الى ايونات ذات شحنة كهربية ، لكنها لا تكفى لتحويل الذرات نفسها . ان قدرة الاصطدام على كسر الروابط الجزيئية امر هام لتفهمنا لطبيعة التلف الذى جرى ، اذ لو حدث ان كسرت روابط جزيئات المكونات الطبيعية للهواء والماء ، واعيد ترتيبها ، اذن لتكونت تركيبات جديدة سامة جدا .

نعرف ان الوجه البيئى - المنضغط جدا - بين الكويكب والبصر لابد وان قد ارتفعت حرارته الى درجة اعلى من درجة حرارة سطح الشمس . ونعرف ايضا ان كل الروابط الكيماوية تنكسر بالتعرض لمثل هذه الحرارة ، ويتحول كل شئ الى ذرات عارية ، وايونات مشحونة كهربيا ، والكترونات حرة . اما ما لا نعرفه فهو كم من البحر قد تحول الى مثل هذه البلازما . ثم ماذا كان معدل مزج هذه البلازما بالهواء وكيف كان اسلوب المزج .

اذا تصورنا ان ١٠٪ من طاقة الاصطدام قد استخدمت فى تحويل ماء البحر الى غاز متوهج حرارته ٣٠٠٠° م فان قدر الماء الذى سيتحول سيبلغ نحو ١٠٠ - ١٠٠٠ بليون طن . فاذا ما اختلط هذا الغاز مباشرة مع كتلة مساوية من الهواء فاننا نتوقع ان تكون ذرات الكلور من بين اول المنتجات ، لان ٢٪ من ماء البحر به ايونات الكلور . اما بقاء هذه الذرات حرة فى شكل كلور ، او اتصاها بالصوديوم والايروجين

الموجودين بالسحابة المتوهجة ، فسيتوقف على نفس طريقة تبريد البلازما وسرعة اختلاطها بالهواء البارد أو ماء البحر البارد • ولو أن ١٪ من الكلور ظل حرا في شكل غاز ، فإن كميته ستبلغ نحو ٢٠٠ مليون طن ، وهذا قدر يكفي ليحيط مساحة هائلة من المحيط الى حوض معقم خال من الطحالب • سيتأثر من المحيط مساحة ٤٠٠٠٠ كيلو متر مربع لعمق خمسة كيلو مترات ، أو ١٩٦ مليون كيلو متر مربع لعمق ١٠٠ متر •

من حسن الحظ أن الوجود الدائم للميثان بالهواء والماء سيضمن ألا يتحرك الكلور بعيدا خلال الهواء • يتفاعل الميثان مع الكلور بسرعة في وجود ضوء الشمس ، وفي الهواء من الميثان ما يكفي للتفاعل مع ٣٠٠٠٠ مليون طن من الكلور • ربما قلل من سرعة التفاعل ذلك الاضطراب الذي نتج عن الغبار ، نقصد الضوء المرشح في الفتحة التالية مباشرة لواقعة الاصطدام ، غير أنه من المستبعد جدا أن يكون الكلور قد انتشر بعيدا عن نصف الكرة الأرضي الذي وقع به الاصطدام ليصل الى النصف الآخر من العالم •

تحدثنا الآن عن الكلور لنوضح كيف يمكن لهذه الكمية الهائلة من قشرة الأرض وعن البحر - التي اقلقتها الاصطدام وسخنت لحد التوهج - أن تتسبب في تلوث على مستوى رهيب • وليس الكلور الحر هو المنتج الوحيد الممكن ، فمن الجائز أن تتكون أيضا مركبات كلورية مثل حامض الأيدروكلوريك وحامض الهيبوكلوريك • اننا لا نعرف إذا كان هذا التسمم قد حدث ، ولكن سيكون من المثير أن نتتبع نتائج الباحثين الميدانيين لنعرف بأية شواهد قد تظهر •

عندما أراد كينيث هسو تفسير هذه الكارثة ، تأمل في احتمال أن يكون كل هذا التسمم - على مستوى الكرة الأرضية بأكملها - راجعا الى اصطدام مذنب يحمل ثلجا غنيا بسيانيد الهيدروجين • من السهل أن نحسب أنه إذا كان سيانيد الأيدروجين يشكل ١٠٪ من رأس مذنب قطره عشرة كيلو مترات ، ثم لم تتأثر هذه المادة بالاصطدام ونجت بالكامل ، فإن تركيز السيانيد في المائة متر السطحية من المحيط سيكون ١ في ١٠٠٠٠٠ وربما كان هذا التركيز كافيا لافلاق أو قتل الكثير من الأنواع الموجودة - وليس كلها •

لكننا نستبعد أن ينجم من حرارة الاصطدام الفظيعة والأكسدة التي أعقبتها ، أكثر من نسبة مئوية محدودة من السيانيد • فهو - مثل الكلور - يتفاعل بسرعة ، ومن المستبعد جدا أن ينفذ بكميات مؤذية عبر حدود نصف الكرة الأرضية •



شكل (٦)

- أعلى : خريطة لجنوب شرق إنجلترا تبين حجم الحفرة التي قد تحدث عن اصطدام كويكب بالحجم الذي نعتقد أنه تسبب في الانقراض العظيم .
- أسفل : خريطة لنينوربورك تبين حجم الكويكب - يقترَب من حجم جزيرة مانهاغن .

أما المادة السامة التي نعرف أنها توزعت على مستوى العالم عقب الاصطدام ، فهي مادة الأوسميوم وهذا العنصر النئيل عنصر طبيعته خامل غير مؤذ ، لكنه إذا سخن في الهواء تأكسد ويكون بخار رابع أكسيد الأوسميوم الشديد السمية . ولقد يقدو من سفرية الأقدار أن يكون العنصر الذي هدى فريق الفارس الى فكرة الكويكب كسبب للانقراض هو نفسه الذي تسبب في هذا الانقراض .

ان المواد اللا ارضية غير صحية من نواحي متعددة . بغض النظر عن حملتها من الأوسميوم ، فهي بالمقارنة بقشرة الأرض غنية في الزرنيخ والرصاص والانتيمون والسلينيوم والكروم والباريوم . وكل هذه عناصر سامة ، ولابد أنها قد انتشرت على طول الأرض وعرضها عند اصطدام الكويكب . من بين الالهانات البالغة التي واجهتها الحياة نتيجة للاصطدام ، هناك اذن حقيقة أنها قد تجرعت كوكتيلا من السموم لابد وأن كانت ستباركه عائلة يورجيا العتيدة !

ان محاولات مصانعنا الحالية في تلويث البيئة - بل واية محاولة منا يمكن تخيلها - ستبدو جد تافهة مقارنة بهذا . لم تكن المعجزة في انقراض الأنواع ، وانما كانت في أن البعض منها قد نجا . وما أن انتهت الواقعة وانقضت ، حتى عادت الحياة تؤكد نفسها ، في حماية جديدة .

الفصل التاسع

مسرح الجريمة

منذ فترة ليست بالبعيدة أعلنت شركة لتصنيع السيارات - لن نذكر اسمها - مزايا انتاجها الجديد فى الصحافة البريطانية وذلك بتشبيه العريات المنافسة بالدينوصورات . قالت فى نشرة الدعاية ان الدينوصورات حيوانات مزعجة ، ثقيلة ، ساذجة ، بطيئة ، ولا تستطيع ان تواجه منافسيها الاكثر تطورا . وهنا - لحسن الحظ - ظهرت احتجاجات سريعة وحادة قام بها البعض ممن يعلمون الكثير عن هذه الحيوانات القديمة . فسحب الاعلان . كان وصف هذه الحيوانات بالاعلان غير دقيق لدرجة اعتبر فيها عدوانيا من قبل من كرس سنين طويلة من حياته لدراسة هذه الأنواع المنقرضة ولتأمل طريقة حياتها ، مستخدما المتاح من المعلومات .

اما الشيء المهم فهو ان هذا الوصف وصف غير معقول ، ولا يمكن ان يكون معقولا . فالكائنات الحية لا تنجح فى العيش على كوكبنا ، او على غيره ، الا اذا كانت مهياة التهيئة الكافية للظروف التى تحيا بها . ان الحقيقة هى ان الزواحف الضخمة التى عمرت هذه الارض قبل العصر الطباشيرى واثناؤه ، كانت حيوانات ناجحة تماما . لقد كانت متلائمة تماما مع العالم الذى عاشت فيه .

اما الحقيقة الأخرى ، فهى ان هذا الاعلان لم يفعل سوى ان ردد خرافة شائعة . ولقد حان الوقت كى نحمو هذه الخرافة ، لاننا اذا لم نفعل ذلك ، فسيظل البعض من الناس يعتقدون - برغم الأدلة المقتعة على حدوث الكارثة - ان الأنواع تنقرض لأنها « سيئة التصميم » .

طبيعى انه من الهرطقة العلمية ان نستخدم كلمة « التصميم » عند الحديث عن الكائنات الحية ، لكننا ننزع اكثر مما نعتقد الى الوقوع فى شرك الافكار الثقافية التى زرعت فىنا ونحن بعد أطفال . فمعظمنا على أية حال قد سمع عن هذه العماليق القديمة الهائلة عندما كان طفلا . أمن

المحتمل أن يظل البعض منا يربطها بالتعاليم الأخلاقية المشكوك فيها ،
التي عادة ما تحيط بمواديتنا عن السورخ ؟ يبدو أن ثمة فريقا على الأقل
من وكالة للإعلانات قد فعل ذلك ، وأن كنا نأمل أن يكون هذا الفريق قد وجه
الى جادة الصواب .

ربما كانت المشكلة قد بدأت منذ نحو قرن وربع . كان ثمة معلومات
عن زواحف ضخمة منقرضة ومعلومات وأفكار تتعلق بتطور الأنواع .
اختلفت هذه مع نظريات القرن التاسع عشر الاقتصادية ومع محاولات
تفهم طريقة عمل المجتمعات الصناعية . وحدث تضليل فكري متعمد عندما
حاول بعض المنظرين أن يطبقوا على الأمور الانسانية افكارا علمية
مستعارة من ميادين جد مختلفة ، وذلك بغية تبرير النظم السياسية التي
يفضلونها . ليس من الغريب إذن أن تكون صور العلم التي وصلت عامة
الناس - لا سيما الأطفال - صورا مشوشة . انسابت بعض الروايات
من خلال الصحافة الشعبية ، وعولج البعض الآخر عن طريق مبسطى
العلوم ، ليتوصلوا الى استنباطات أخلاقية حيث لا يجوز منطقيا ثمة
استنباطات . وبذا ارتبطت الآراء عن التطور وعن الأنواع المنقرضة فى
معظم الأذهان - ولم يكن العلماء انفسهم دائما محصنين - ارتبطت بفكرة
« الارتقاء » .

قد يبدو الأمر موهلا فى القدم بعيدا عن عصرنا هذا المستثير ، لكن
لو حدث يوما ووقعت فى محل للكتب القديمة على كتب للأطفال تتحدث
عما قبل التاريخ وضعت منذ نصف قرن لا أكثر ، أو وقعت على كتب فوق
الأرفف بالكثير من المنازل كتبت بعد هذا ، فانك على الأغلب واجد نفس
وجهات النظر التي سادت القرن التاسع عشر وهى تقفز ثلث المسافة الى
القرن العشرين . ان اتجاهاتنا الجديدة ومعرفتنا الجديدة ، هى فى الواقع
جديدة أيضا بالنسبة للكثيرين . فاذا خالجه الشك فى هذا فما عليك الا
أن تتذكر انه بالرغم من أن فكرة التطور كتحول للأنواع كانت قد قبلت
على نهاية القرن التاسع عشر ، فان الفكرة الدارونية بأن الانتخاب
الطبيعى هو القوة الرئيسية الدافعة لنشأة الأنواع ، هذه الفكرة قد شكلت
صعوبات هائلة ، حتى أنها لم تقبل تماما من قبل المجتمع العلمى الى
أربعينات قرننا الحالى .

ربما كان علينا أن نعالج أولا قضية « المعيارية الانسانية » ، ذلك
المصطلح الذى يبعث بالرجفة الباردة فى ظهور علماء الحيوان ، والذى
يثير صورة للعالم أكثر انتشارا ، وأصعب تجنباً ، مما يتوقع هؤلاء العلماء
•• اننا بشر • ونحن نرى العالم كبشر • والمعلومات عن العالم تصلنا من

خلال حواسنا البشرية ، وتفسرها أذهاننا البشرية • ولحسن تعرف أن الحيوانات الأخرى لها حواس مشابهة • لها أعين ترى ، وآذان تسمع ، والسنن تتذوق ، وأنوف تشم ، وجلد يحس • بل ويبدو أن بعض ما يؤلمنا يؤلمها أيضا • ليس من الطبيعي أن نفترض أن ما يبهجننا يبهجها ؟ وإنما أنن تشعر بعواطف كمواطننا ؟ الحق أن الحيوانات تبين كل ما ذكرناه ، وهي تحس « بالغضب » و « الخوف » • لماذا نضن عليها بمثل هذه العواطف الممتعة ؟

فى بحثنا عن التماثل هكذا مع الحيوانات اللابشرية ، فإننا نعتبرها بشرا برغم المظهر الخارجى المختلف ، أننا نفسر سلوكها فى ضوء خبرتنا نحن ، وبذا نضفى عليها بعضا من انسانيتنا • اذ يكاد يكون من المستحيل علينا – ونحن بشر – أن نتجنب المعيارية الانسانية دائما لا سيما عندما نتعامل مع حيواناتنا الاليفة • افلم نقابل جميعا القطه التى « تفهم كل ما يقال » ؟ بل أن الكثير من كتب الأطفال تعلمهم بالفعل مثل هذه المواقف الانسانية للطبع فى أذهانهم احترام الحيوان • لكن المحاولات الزائدة الحماس لمواجهة المواقف الانسانية تقود – بكل أسف – الى نظرة متطرفة الحيوان فتعتبره ماكينة لا أكثر ، لا يمكنها التمتع بالاحساسات الجميلة او بالمعاناة • وهذا بدوره يفضى وجهة النظر المؤكدة للحساسية الزائدة للبشر • الى أن يصطدم الموقفان المتطرفان المتعارضان ، فيحمل كل فريق لافتاته ، مدعيا الرغبة فى السلم ، مخفيا من العنف قدر ما يعارضه •

ان النتيجة الحتمية للمعيارية الانسانية وما تؤثر به فى موقفنا من الزواحف الطباشيرية ، هى أننا لا نستطيع أن نتجنب مقارنة الأنواع الأخرى بنا نحن ، وهذا من شأنه – بالضرورة – أن يكون فى غير صالح اللابشر ، لأن افتقارها الى الصفات البشرية سيؤخذ ضدها كدليل على نقصها ، اللقص الأخلاقى عادة • فابن عرس « غير أمين » ، والثعلب « مكر » ، والقط « قاس » • فإذا ما أضفنا الى هذه النظرة المضللة للعالم فكرة التطور كارتقاء قمته نحن ، فإننا سنضيف بعدا جديدا • أننا انكباء – تبعاً لتعريف « الذكاء » الذى استكرناه نحن لنصفه به انفسنا – والزواحف مقارنة بنا غيبة • وكل صفة فيها هم خصصة ترتبط بالخاص ، وفقدانها يعنى التخلف • وعلمى هذا ، لأن الدينصورات قد انقرضت فلاند وإن كان بنقصها شيء من خصائصنا الدشنة • لقد اندثرت لأنها لم تكن مثلنا • أننا النجاح الذى عليه نقيس فشل غيرنا • ونسألك أن تلاحظ السهولة – التى يسمح بها استخدامنا لكلمة « النجاح » – فى استعمال كلمة « الفشل » • ان الدينصورات بكل تأكيد لم « تفشل » • فالأنواع لا تفشل • ان الفكرة لا تجوز •

أما حقيقة أننا لا ننظر هكذا إلا للحيوانات - بالرغم من بعض المحاولات للتحديث إلى النباتات ثم معاملتها في غير هذا كأنها هي الأخرى بشر - هذه الحقيقة تفصح عن خطأ آخر أعمق . فنحن من الحيوانات ، وهكذا كان أجدادنا - سواء اعترفوا بذلك أم لم يعترفوا - ونحن نفترض أن الحيوانات بالتأكيد أكثر أهمية من النباتات ، كما أن النباتات أهم من الأعداد اللانهائية من الكائنات الدقيقة الميكروسكوبية التي قد لا نعرف حتى بوجودها . ويمكن أن نلخص موقفنا العام في الآتي : « أن البكتيريا كائنات قادرة قد تمرضك ، وعلى ذلك يلزم أن تقتلها حيثما أمكن ، ومعظم النباتات جذابة ، والكثير منها مفيد ولذا يلزم أن نتمتعها بحرص ، والحيوانات شبيهة بنا ، وإن كان البعض منها قد يكون من أخطر أعدائنا » . ولقد سبق أن قلنا ، وسنقولها مرة أخرى ، أن هذه النظرة الطبيعية تماما نظرة خاطئة ، والحق أنها خاطئة جملة وتفصيلا . إن البكتيريا هي التي تقوم بالعمليات التي تحفظ كوكبنا بيئة صالحة لحياة الكائنات الحية . فلو أن المظهر الذي يقتل ٩٩٪ من الجراثيم المنزلية يقوم بهذا العمل فعلا ، ولو أننا استعملناه بكثرة ، إذا لغدا وضعنا مؤسفا حقا .

دعنا نرجع الآن إلى ما حدث من تشويش قديم بالقرن التاسع عشر ، فهم أن تشارلس داروين قد قال أن التنافس بين الأفراد والأنواع يضمن البقاء للأصلح . أما حقيقة أنه لم يقل هذا فعلا فهو أمر لا يهمننا الآن . إنما يهمننا ما سمع عنه . فلقد فهم الذكور من الأوروبيين والأمريكيين بالقرن التاسع عشر ، فهموا أن « الصلاحية » هي كلمة تتماشى مع « الذكورة » و « الرجولة » و « النشاط » و « العفة » ، ومع مفاهيم أخرى مثل القوة البدنية والبسالة العسكرية . « فالبقاء » يشبه كثيرا « الانتصار في المعركة » أو « النجاح في العمل » . وبذا ولدت فكرة « الدارونية الاجتماعية » ، لتسبب الكثير من الأذى ، وعندما طبقت الفكرة الشائعة عن الدارونية على الطبيعة ككل ، لم يتشكك كل من قبل ارتباط الإنسان تطوريا بالأنواع الأخرى ، لم يتشكك في أننا ذروة العملية ، أن الإنسان كان أكثر صلاحية من كل ما سبقه من أنواع . فنحن على أية حال ما نزال هنا ، بينما انقرضت هي . فالحق لا تستحق حتى أن تسمع . أما من لم يقبل الارتباط فلم تكن أمامه مشكلة . أن الإنسان هو سيد هذه الأرض .

ولقد ساهم استخدام كلمة « التطور » في زيادة الاختلاط ، وداروين نفسه لم يستخدم هذه الكلمة كثيرا ، وكان استخدامه لها بعض شديدا . هكذا أشار ستيفن جوبي جولد ، ومسئله الكلمة كانت بالفعل شائعة

بانجلترا فى القرن التاسع عشر ، وكانت تستخدم فعلا كمرادف لكلمة « الارتقاء » . والطبعة الأخيرة من قاموس اكسفورد لم تذكر معنى « الظهور بالتتالى الواجب » كتعريف للتطور الا بعد تعريفين آخرين . فالطور اذن يعنى الارتقاء ، الحركة من موقع الى آخر ، مع احتمال وجود غرض ، حتى وان بقى الغرض مخبوا . ولقد استعمل داروين الكلمة على مضض لأنها وان كانت تصف وجها من أوجه العملية ، الا انها - من الناحية العامة - تعارض بصراحة فكرته عن الطريقة التى تمت بها العملية . أما الآن فان الكلمة تستعمل كثيرا ، ولكنها تبقى غير دقيقة علميا ، تماما كما كانت ، ويحسن أن نذكر هذا دائما . ان أى فكرة عن الارتقاء خطوة خطوة فى تسلسل هى فكرة خاطئة - وعلينا هنا أن نستثنى المعنى الضيق للتقدم ، أو التنوع ان أردت .

أما بالنسبة لأجدادنا الفكتوريين فقد كان « الارتقاء » يعنى مفهوما يمكن للشخص الواسع الخبرة أن يحققه . فإذا ما قيل له ان الأنواع قد تطورت عن بدايات بسيطة وصلت الى الكائنات المعقدة ، فانه يستطيع أن يضيف هذه المعلومة الى ما يعرفه من أن لبنى البشر فوق الأرض سلطانا على حياة وموت الحيوانات الأخرى الكبيرة والنباتات ، وبذا يغدو من البدء أننا ندرك العملية . أننا الصورة « السائدة » فى الحياة ، سادة كل ما نرى ، وفى مقدورنا أن نضفى القليل من الاحترام الظاهرى على هذه الفكرة بأن ندعى أننا الأرفع تطورا بين كل الكائنات . والحق أن « الأرفع تطورا » مصطلح لا معنى له على الإطلاق ، ولكنه يبدو فخيفا مهييا .

فإذا كنا الصورة السائدة اليوم ، فسيغدو من حماقة أن نذكر على بعض الأشكال الأخرى أن تكون هى السائدة قبل أن نظهر نحن على وجه الأرض . ربما سادت قناديل البحر يوما ، وربما سادت الأممك ، وربما ساد لفترة طويلة أسلافنا من الكائنات البسيطة وحيدة الخلية ، وفى مرحلة معينة ربما سادت الزواحف . ان من يسود هو من يهيى فى ساحة الحياة ، فى المصنع الذى نسميه الحياة . أما من لا يسود فهو - بالتعريف - التابع الأقل أهمية . ثمة ثورة تصدت من آن لآخر ، فيفصل صاحب المصنع من رئاسته ، ويطرد من قصره ليتقلد السلطة شخص آخر أقوى يصبح هو السيد الجديد . هذا هو ما يجب أن يكون ، لأن هذا هو الذى أدى فى نهاية الأمر الى ظهورنا نحن . أننا البرهان على صواب النظام .

اثرنا فىنا وبعمق صورة التطور الفكتورية هذه (برغم خطئها وتشوشها) حتى غدا من الصعب التخلص منها . ما زال الكثيرون منا

يعتقدون أن الثدييات هي « شكل الحياة السادس » على كوكبنا في الوقت الحالي ، وأن الانسان من بين الثدييات هو الأسمى . بل أن كبار العلماء – ممن يعرفون أكثر – قد يسمحون لأنفسهم باستخدام هذا التعبير الشائع وهم يتحدثون عن العصر الطباشيري ويسمونه عصر «حكم الدينوصورات» . انهم يعرفون ما يتحدثون عنه ، لكن مثل هذا الحديث غير الدقيق انمسا يثبت البلبلة في عقول العامة .

لم « تحكم » الدينوصورات ، ولم نحكم نحن . لم يحدث أبدا أن حكمت الدينوصورات أو حكم الانسان أو حكم أى نبات أو أى حيوان . يحكم الملوك والملكات رعاياهم من البشر ، لكن الحيوانات والنباتات لا تحكم غيرها من الحيوانات والنباتات . لا وليس من الصحيح أننا كنا يوما شكل الحياة « السادس » ولم تكن كذلك أبدا الدينوصورات أو غيرها من الحيوانات الكبيرة أو النباتات . كل ما نستطيع أن نقوله عنها أنها كانت – مقارنة بغيرها من الأنواع ذات الحجم نفسه – أكثر تعدادا وأكثر نجاحا في التكاثر . والانسان في زماننا هذا يتكاثر بنجاح – وربما كان نجاحه أكثر من اللازم – ولقد استعمر معظم سطح الأرض – ليس كله على أية حال ، بل وربما ليس معظمه إذا تكلمنا عن المساحة . ونحن على أية حال لسنا أكثر الثدييات تعدادا . فالفئران أكثر منا ، والخفافيش كذلك ، ولن نذكرك بالآرانب . لكن من الصحيح بالطبع أننا ولحد بعيد أكثر الثدييات الانسانية نجاحا ! فإذا ما أردنا أن نستخدم كلمة « حكم » بمعناها الصحيح فعلينا أن نجدول الكائنات على أساس قدر الفوضى الذي يحدث على سطح الأرض لو حدث وأزيلت . عندئذ ستكون الكائنات الدقيقة على رأس القائمة ، ومن بينها سائبات النوى ، تلك الكائنات الأصغر من أن ترى بالعين المجردة وتحتاج الميكروسكوبات الأقوى لرؤيتها . لكن القائمة للأسف – نقصد للأسف من وجهة غرورنا – ستضم النباتات الخضراء التي تستخدم الطاقة الشمسية لصناعة السكر ، والطحالب التي تلعب دورا هاما في المراحل الأولى لتحلل البقايا العضوية – أما الحيوانات – تلك التي تستهلك الغذاء الذي توفره الكائنات الدقيقة والنباتات – فلن يكون لها مكان بالقائمة . فهي ليست سوى عابري سبيل بالنسبة لهذا النظام ، ويستطيع النظام أن يعمل جيدا في غير وجودها .

أما ما حدث خلال التاريخ فهو أن الكائنات الدقيقة ، التي قد تكون (وقد لا تكون) قد ظهرت أولا في المياه الضحلة ، قد حورت من البيئة الأرضية بحيث جعلتها أكثر ملائمة لحياتها . ثم أن بعضها – بطريقة ليس أمانا إلا أن نضعها – قد بدأ في التعاون فظهرت الكائنات عديدة الخلايا . ثم ثبت التعاون فيخصيصت الخلايا داخل تجمعاتها التي غدت الكائنات

الأكبر ، لتبدأ هذه التجمعات أو الكائنات فى الازدهار • وفى ازدهارها حورت البيئة من حولها أكثر وأكثر • ثم بدأت التغيرات تظهر بين الأفراد عن طريق طفرات عشوائية صغيرة جدا تحدث فى جزيئات الحامض النووى البالغة التعقيد التى تعمل كقوالب لتجميع البروتينات ، والتى تورث الى النسل • عندئذ سنجد أن الأفراد الأكثر قدرة على التغذية والتناسل ستترك من النسل أكثر من غيرها • أن هذا هو ما يسمى فى القاموس الفكتورى باسم « البقاء للأصلح » وربما كان من الأدق أن نسميه « البقاء للمتوسط » فالنظم البيولوجية تنحو نحو الثبات •

أما السبب فى هذا فهو أمر واضح إذا حررنا أنفسنا من أفكارنا عن الارتقاء ، ولم ننظر الى النوع بمعزل عن غيره ، وإنما كعضو بين عشائر تتألف من عديد من الأنواع • أن حقلا فى مزرعة قد يصلح كمثال قريب • فغذاء الشمس سيوفر الحرارة لاتمام التفاعلات الكيميائية اللازمة للكائنات الدقيقة كي تتغذى على المعادن التى تحصل عليها من فترات الصخر الناتج عن تكرر تجمد الماء وذوبانه • ثمة كائنات أخرى دقيقة ستغذى على الفضلات التى تتركها الكائنات الأولى ، بجانب كائنات أخرى ستفترسها • ثم إن البعض من هذه الكائنات ستنكاثف بأن تحيا سويا داخل جدران نفس الخلايا ، والبعض سيضمن بين هذه الجدران كائنات تستطيع أن تستخدم ضوء الشمس فى تصنيع السكريات من ثانى أكسيد الكربون والماء • تهور هذه من الغلاف الجوى ، وبدأ تنظم - بشكل عريض - درجة حرارة بيئتها • ثمة كائنات أكبر (يعتقد بعض البيولوجيين أنها نشأت عن تعاون أبعد لكائنات صغيرة) تستطيع أن تتغذى وتتكاثر ، لتمدور من البيئة أكثر وأكثر ، وهذه توفر أساسا فضلات يمكن أن تتغذى عليها مجموعة من الكائنات ، توفر بدورها الغذاء لمجاميع غيرها • فلولو الكائنات الدقيقة لما توفرت المواد الغذائية للنباتات الكبيرة • لن تنمو الحشائش • ولولا النباتات لما وجدت العواشب • ولولا العواشب لما وجدت اللواحم • كل مجموعة تستغل مجاميع أخرى ، وتستغلها غيرها • وعندما يأتى الفلاح ليحرق حقله ويبدد بذوره ، فإنه لا يتصرف إلا كما تصرف غيره من الكائنات •

إن النقطة التى يجب أن نتذكرها - النقطة الهامة والمراوغة - هى أن نجاح مجموعة ما لا يعنى ، ولا يمكن أن يعنى ، فشل المجاميع التى تستغلها • ففى داخل أى نظام مستقر بطبيعته ، سنجد أن الزيادة فى موقع لا يمكن أن تثبت إلا بزيادات موازية فى أماكن أخرى • لا وليس التطور هو تغيير نوع من الكائنات الى آخر أفضل بعض الشيء ، وإنما هو تلك

التغيرات الضئيلة نسبيا والتحويلات داخل الهيكل الكلى التى بها تتمكن المادة الحية من أن تنظم نفسها ، مرة هكذا ، ومرة بطريقة أخسرى - بينما يظل النموذج مستمرا • قد يزداد تعقيد الكائنات المفردة - نقصد تنظيمات المادة الحية - ولكن هذا لا يعنى بالضرورة اختفاء الكائنات الأبسط • فالكائنات الدقيقة - التى يعتقد أن الأنواع الأخرى قد نشأت عنها - لم تستأصل ، ولا يمكن أن تستأصل • فهى لا تزال موجودة • وهى فى غاية الأهمية • ولما كانت الأنواع تعتمد تماما على بعضها البعض، لتخلق سويا الظروف التى بها تحيا جميعا ، فإن للنظام الذى تشكله آليات قوية ذاتية الإصلاح - تغذية استرجاعية سالبة - النظام اذن مستقر يقاوم أى نزوع للتغير ما دام لم يتعد قدرة النظام فيحمله أكثر مما يطيق •

• لا تبرز الأنواع الجديدة ولا تتولد الا حيث توجد الموارد التى يمكنها استغلالها • وهذه الموارد لا تتوفر فى معظم الانظمة معظم الوقت • فكل شئ له من يستعمله ، وكل مكان به من يشغله ، ليكون الاخفاق مصير كل جسد •

• نتوقع اذن أن تتم التغيرات التطورية الرئيسية - على الأرجح - بسبب اضطراب النظم الثابتة ، وأن ينتج هذا الاضطراب عن أسباب من خارج النظم نفسها • ربما كانت هناك استثناءات ، لأن النظم الثابتة نفسها قد تنهار ، لكننا عندما نهتج عن سبب التغير الكبير فإن علينا أن نبدأ فى البحث خارج النظام لا داخله •

والحق أن الكثير من محاولات تفسير التغير فى النظم الحيوية قد ظل حتى عهد قريب يرتكز على آراء عن تغيرات داخل النظم ، حتى أن واحدا من كبار الأساتذة قد وضع - فى ستينات هذا القرن - كتابا عما قبل التاريخ استخدم فيه مثل هذا التفسير - الذى كان سائدا فى القرن الماضى - فى تحليل اختفاء الدينوصورات •

كانت نظريته تقول انه مثلما تكون للأفراد دورات للحياة ، كذا تكون أيضا للأنواع ومجاميع الأنواع • فهى تنشا ، وتتكاثر ، وتزدهر ، لكنها تتدهور أخيرا لتختفى نتيجة لما يشبه الشيخوخة • ولما كان الانتخاب الطبيعى يتخلص من الأفراد والسلالات الأضعف ، فإن أثره خلال الفترات الطويلة من الثبات هو تناقص حجم المستودع الجينى، فتزداد بذلك التريبة الداخلية التى تضعف العشيرة ككل • من بين الصفات التى يرثها كل جيل عن آباءه هناك ثمة صفات للتأقلم تساعد الفرد فى حياته اليومية ، لكن هناك أيضا البعض مما قد يصبح موقفا • وتقول النظرية انه بعد عدد كبير من الأجيال تتراكم مثل هذه الصفات الدنيئة ، لتقود فى نهاية الأمر الى،

اضعاف القدرة على التكاثر ، فتنجب الأفراد التي تحملها - وهذا يعني كل أفراد النوع - عددا أقل من النسل فى كل جيل ، حتى يتلاشى النوع تماما . لقد أصابه الهرم وتدهور . وتضم « البراهين » بالنسبة للدينوصورات ما يزعم عن حجمها الضخم وحركتها البطيئة وعدم قدرتها على التأقلم مع الظروف المتغيرة .

ثمة فكرة مشابهة تكمل هذه كانت أيضا شائعة أيام أجدادنا . تقول هذه الفكرة ان بعض الخصائص يمكن أن تتطور بطريقة لا يمكن السيطرة عليها بحيث تتضخم أكثر وأكثر فى كل جيل جديد . فالدينوصورات تصبح أكبر وأكبر ، أبطأ وأبطأ ، أغشى وأغشى ، حتى تصل - كما كان يحكى لنا ونحن أطفال - الى الهرونتصور مثلا الذى كان من الغباء وبطء الحركة حتى ليطالب الأمر منه نصف ساعة كى يستجيب لسقوط حجر على طرف ذيله . أما من يصدقون هذه النظرية - وكانوا كثيرين جدا حتى زمن قريب - فهم يعتقدون أن أيل الالك - وهو أكبر أعضاء عائلة الغزلان - قد انقرض لأن قروونه أخذت تكبر جيلا وراء جيل الى أن أصبحت تشتهك مع النباتات فلا يستطيع أن يخلص نفسه لياكل ، وربما ازداد وزن هذه القرون حتى لم تستطع الحيوانات أن ترفع رأسها . وتدعى هذه النظرية أن النمر المسيف الأسنان أخذت أسنانه تكبر حتى وصلت الى حجم لم يستطع يعده الحيوان المسكين أن يغلغ فمه ، ففقد القدرة على العض .

ان مثل هذه الأمثلة توضح سخف النظرية - والنظرية السابقة لم تكن أقل سخفا - ولكنها بالرغم من ذلك استمرت بشكل محور . انه لمن المستحيل أن تقود أية عملية تطورية الى أفراد أقل تأقلا ، فمثل هذه لن تعيش حتى تنجب . وبدأ فهم يتلاشى فورا .

ما يزال الكثيرون يعتقدون أنه من الممكن أن تتطور الأنواع الى أشكال أكثر وأكثر تخصصا تقودها فى طريق مقفل حيث لا فكاك اذا غدا من الصعب الحفاظ على طريقة الحياة التى تكيفت عليها . ويوصف النمر أحيانا بأنه حيوان متخصص ، ذلك لأنه كلاحم كبير يحتاج الى أرض واسعة فلا يستطيع البقاء اذا نقصت المساحة التى يعيش عليها . وكل هذا يعنى بالطبع أن النمر لا يستطيع أن يحيا دون غذاء ، وهكذا نحن ايضا ! غير أننا نعتبر أنفسنا من الأنواع الأقل تخصصا ، ولذلك فتحن من بين أقوى الكائنات . ان قائمة الأنواع العالية التخصص من الكائنات الدقيقة والنباتات والحيوانات قائمة طويلة جدا . والكثير من هذه الكائنات يحيا بهذه الأرض منذ مئات الملايين من السنين ، وتخصصها - كما هو واضح - لم يسبب لها أى اذى ، فأسنانها لم تكبر لا ولا كبرت قرونها ولا

أى من زوائدها فسببت تعويقا لها • وبهرغم سلسلة انسابها فانها لا تبين
أية دلالة على الهرم ، على اننا نستطيع أن نفهم كيف كتب صانعو السيارات
أعلاّتهم الذى اشرنا اليه فى أول هذا الفصل •

اننا ندعى اذن أن زواحف العصر الطباشيرى كانت « ملائمة » تماما ،
بالعنى التطورى ، وليس ثمة سبب يدعوننا للفرض بأنها كانت تتدهور •
والآن ، ماذا نعنى بكلمة « ملائمة » ؟

بعد أن خالصنا انفسنا من أية فكرة نعتبر بها التطور ارتقاء ، علينا
أن نسأل انفسنا عما يحدد النجاح التطورى • الواضح أن النوع الكثير
العند هو نوع ناجح • لكن ، ماذا « ينجح » بالتحديد ؟ فكل الكائنات
على أية حال – لابد أن تموت – اذا نحينا جانبا الكائنات الدقيقة التى
تتكاثر بالتضاعف الخلوئى الميتوزى (والتى يمكن اعتبارها خالدة •
يصعب أن نعتبر الموت صفة تتعلق بالنجاح •

كان أول مفتاح لفهم العملية جملة ذكية قالها صمويل پطر (١٨٣٥
– ١٩٠٢) : « ليست الدجاجة سوى وسيلة البيضضة لصناعة بيضة أخرى » •
فالبيضضة تنقل البيانات المشفرة من جيل الى جيل ، البيانات التى توجه
تكوين الدجاجة أولا ، ثم البيضضة الجديدة • هل بقاء هذه التعليمات اذن
هو ما يهم ؟ ثمة حامض يسمى د ن ا – هو الحامض الذى يتضاعف
وينتقل من جيل الى جيل وتنشأ عنه قوالب لتجميع الأحماض الأمينية • أن
فكرة أن يكون هذا الحامض هو مادة التاريخ البيولوجى وأنه من الممكن
أن نعتبر التطور تنمية لجموعة من « آلات البقاء » تضمن خلود تشكيلات
معينة من الد ن ا ، هذه الفكرة عرضها باقناع ريتشارد دوكنز ، ولخص
وجهة نظره فى كتاب له سهل القراءة (الجين الانانى ، ١٩٧٦) • ويعزز
من معقولية فكرته كثيرا ، حقيقة أن الخلايا تحوى من الد ن ا أكثر
مما يلزم لتكوين خلايا أخرى مشابهة ، والوظيفة الوحيدة على ما يبدو هى
أن يضاعف نفسه لينتقل عبر الأجيال • وعلى هذا فعندما نتأمل الكائنات
الحية علينا أن نفهم « ملائمتها » فى ضوء نجاحها فى ضمان بقاء الـ
د ن ا الذى تحمله معها • هى قد تنقل هذا الد ن ا الى مواطن جديدة
فتنتشر بالأرض على نطاق أوسع ، وهى قد تسلمه لنسلها بكفاءة تفوق
كفاءة أسلافها •

أمام النوع تدبيران : أحدهما أن ينتج الكثير من النسل • سيموت
منه الكثير ، لكن ، لو حدث وتحسنت فجأة الظروف البيئية فسيكون ثمة
أعداد كبيرة من الأفراد لاغتنام الفرصة • وهذه الاستراتيجية تميز الأنواع

التي تتعرض بيئتها لتغير سريع غير متوقع ، أما البديل الآخر فهو أن ينتج الفرد عددا محدودا من النسل يتلاءم مع قدرة حمل البيئة - التي تكون هنا ثابتة تقريبا . وهذه هي الاستراتيجية التي نلاحظها بين الرئيسات مثلا ، وكثير غيرها من الحيوانات ، ونجدها عموما شائعة عند خطوط العرض الدنيا والظروف المستقرة ، بعكس بديلتها التي نجدها في البيئات ذات الفصول الواضحة عند خطوط العرض العليا . ولكن لهذه القاعدة الكثير من الاستثناءات .

دعنا نفحص ملامحة الزواحف والنبتدئ أولا بكفاءتها التناسلية . ان تشعب خطوط الأفراد الى ما نعرفه كأنواع مختلفة يتطلب امكان مزج الجينات عن طريق تزواج الأفراد . لكل فرد طاقم من الجينات يختلف في تفاصيله عما لغيره من الأفراد . وسنجد أن جينات بعض الأفراد فيها من التشابه ما يكفي كي يسمح لها بالتزاوج سويا لينتج عنها أفراد خصبة قادرة على التكاثر . ولما كان التزاوج يعني اقتران المادة الوراثية - جديلة من كل أب - لينتج اللولب المزدوج الكامل ، فمن الضروري أن تكون الجديلتان « متناغمتين » كيميائيا . ولكي يصبح هذا ممكنا يلزم أن يكون الاختلاف بين الجديلتين داخل حدود محدودة . فمن الممكن للإنسان مثلا أن يتزاوج بنجاح مع انسان آخر (من الجنس الآخر) لكن تزواج انسان مع غير انسان سيفشل ، بسبب الاختلافات الجوهرية في ترتيب وحدات مادتهما الوراثية . ومثل هذه المجاميع المنفصلة من الكائنات الحية ، التي ينجح داخلها التزاوج ، هي ما نسميه « الأنواع » . ولقد نشأ التكاثر عن طريق تزواج الأفراد - أول الأمر - بالكائنات الحية الدقيقة .

بدأت الأنواع فيما بعد تضع البيض ، أما الخط السذي قاد الى البرمائيات والزواحف والطيور والثدييات (قادها في الزمن وليس بمعنى الارتقاء نحو هدف معين) فهو يضم الأسماك . تضع الأسماك بيضها لتخصبه الذكور خارج الجسم ، في الماء . يفقس البيض وتخرج منه اليرقات ، لتبدأ في أعالة نفسها مباشرة عقب الفقس . يتعرض البيض لأنواع أخرى تاكله - وأن يكن بيض بعض الأسماك محصنا - وتضيق معظم اليرقات في أفواه المفترسات . وعلى هذا ، فلكي تضمن الأسماك بقاء القدر المطلوب من النسل فإن كل سمكة ستضع عددا هائلا من البيض - عادة يقدر بمئات الألوف . هذه الطريقة إذن تبذل الموارد لاسيما من الناحية ، لكنها تعمل جيدا مع الأسماك . فبيئتها عرضة للتغيرات المفاجئة في قدر الغذاء المتاح وفيما تتعرض له من المفترسات .

تتكاثر البرمائيات بنفس الطريقة تقريبا ، وإن كان بعضها قد يبقى بيضه أو حتى يرقاته داخل جسم أحد الأبوين أو فوقه مما يزيد فرصة البقاء . لكن بيض البرمائيات - مثل بيض الأسماك - لابد أن يوضع في الماء ، كما أن اليرقات التي تفقس عنه تحيا بالسباحة حرة في الماء .

فإذا ما وصلنا إلى الزواحف وجدنا فرصة بقاء الصغار وقد ازدادت . فالزواحف تضع بيضا له أمنيون ، وهذا كيس ممتلئ بسائل ينمو داخله الجنين . وعلى هذا تتم كل مرحلة نمو اليرقة داخل البيضة بدلا من السباحة وبدلا من أن تكون فريسة للكثير من اللحومات التي تسكن الأنهار والبرك والبحار . ثم تفقس البيضة ليخرج منها حيوان يشبه أبويه كثيرا .

وقد تمضي مرحلة هذا النمو في بعض أنواع الزواحف إلى مدى أبعد . ثمة زواحف - كالسحلية الانجليزية الشائعة - تسمى الولود البيوض تحتفظ الأنثى فيها بالبيض داخل جسمها - منفصلة عنه - حتى يفقس ، معنى أن الأم لا تغذيه وإنما توفر له الحماية بجانب البيئة المثلى للحضانة (ثمة إيس في المصطلحات هنا : فالأنواع الولود البيوض تنتج صغارا حية عندما تترك جسم الأم ، وعلى هذا فكثيرا ما تسمى بالحيوانات الولود ، وهذا خطأ) . ومثل هذه الحيوانات تنجب عددا من الصغار أقل بكثير ، ولكنها عادة ما تعيش في بيئات مستقرة ، أو بيئات يمكن فيها التنبؤ بالتقلبات .

أما الثدييات فتصبح البيضة جزءا متناهما لجسم الأنثى . إذ يصل الغذاء الجنين لا عن طريق مخزن - الصغار - وإنما مباشرة من جسم الأم . كما أن فضلاته تزال عن طريق الجهاز الإخراجي للأم . فالأم تسمى جنينا تماما من الأخطار الفيزيائية ، كما تحميه غذائيا . وبذا تكون فرصته في الحياة خلال فترة الحمل أعلى من مثيلتها في أجنة الزواحف والبرمائيات والأسماك . لكن بالرغم من أن جنين الثدييات لا يمر بمرحلة اليرقة إلا أنه يولد عاجزا تقريبا ، فهو لا يستطيع الحياة مستقلا عن أمه ، وهو في بعض الأنواع - ومنها الإنسان - يحتاج إلى رعاية كلا الأبوين . لكن النظام الثديي - مقارنة بالزواحف - يسمح بالفعل بنسبة بقاء أعلى للصغار - أولاد د ن المستثمر ، أن شئت .

إن استعمار النباتات للأرض الجافة يوفر مصدرا للغذاء يمكن للحيوانات استغلاله ، لكن يلزم أن تتمكن الحيوانات أن تتنفس أكسجين الجو مباشرة ، لا أن تحصل على الذائب منه في الماء ، كما يلزمها أن تحتجز الماء جيدا بأجسامها كي تحفظ البيئة السائلة التي فيها تتحرك المواد داخل أجسامها وبها تتم معظم التفاعلات الكيميائية الحيوية . تستطيع بعض الأسماك أن تحصل على الأكسجين من الهواء إذا كانت لها مشابهاة

العموم - وتمتلك البرمائيات والزواحف والطيور والثدييات رئات ، وأن كانت البرمائيات تحصل على معظم أكسيجينها من خلال الجلد . والحشرات - وكانت أول الحيوانات التي تحولت الى الأرض الجافة - تتنفس بالية تتضمن الانتشار ، والانتشار عملية كفاءتها عالية في المسافات القصيرة لكنها لا تكفي أى حيوان أكبر من الحشرة . وبالرغم من أن البرمائيات البالغة تحصل على الأكسجين أيضا من طريق الانتشار إلا أنها تعزز هذه العملية بالتنفس بالرئات . ويظل الجفاف خطرا تواجهه الأسماك ان هي تركت الماء ، وتواجهه أيضا البرمائيات لأن جلدها ليس محصنا بحيث لا ينفذ الماء تماما . لكن جلد الزواحف لا يتنفذ الماء إطلاقا ، ولقد مكنتها هذا بجانب بيضها الأمنيوني من التحرك بعيدا عن الماء .

انتشرت الزواحف لتستعمر معظم سطح العالم . ولقد وجدت أحافيرها في كل القارات فيما عدا قارة القطب الجنوبي ، وفيها توجد الأحافير على الأرجح تحت الغلاف الثلجي . ومن المعتقد أن كل الأرض الجافة على كوكبنا كانت تشكل قارة واحدة ، هي بانجيا ، كانت قد انقسمت على العصر الطباشيري لتشكّل جوندوانالاند في الجنوب ولوراسيا في الشمال . ثم انشطرت جوندوانالاند لتنفذ الهند أولا ثم كتلة الأرض المشتركة لأستراليا وقارة القطب الجنوبي ، وتتكرر فيما بعد الى ما هو الآن إفريقيا ومدغشقر وجنوب أمريكا . انشطرت لوراسيا عندما انفتح شمال الأطلنطي عبرها ، لكنها لم تنقسم الى الكتل الحالية حتى وقت متأخر كثيرا . ظهرت الزواحف أول الأمر خلال العصر البينسلفاني من الحقب الباليوزي ، منذ نحو ٣٠٠ مليون سنة . وعندما انقسمت بانجيا الى قسمين كانت الزواحف قد ثبتت أقدامها على الأرض وابتدأت في التطور الى أشكال جديدة .

أدى هذا التطور الى نشوء الأركوصورات - وهذه الكلمة تعني « الزواحف الحاكمة » لتعكس أصلها الفيكترى - ثم الى الدينوصورات الحقيقية . ولقد ظهرت الثعابين والسحالي فيما بعد - وهي نمطية للزواحف الحالية - السحالي في القرياس والثعابين في الطباشيري . أما الأركوصورات التي بقيت حتى عصرنا هذا فهي التماسيح .

تسبب في تعقيد تطور الدينوصورات حقيقة أن الكثير منها استمر يتطور بالتوازي بعد أن انشعب من الأرومة الأصلية ، الشيء الذي نتج عنه الكثير من أوجه التشابه بين مجاميع بعيدة القربى . كانت المجموعة الأولى من الدينوصورات البدائية هي الثيكودونتات ، فهي السلف لكل المجاميع التي تلتها . ولقد عبرت الانقراض الذي حدث في نهاية العصر البرمي ، منذ نحو ٢٢٥ مليون سنة .

كانت الشيكودونتات وكل الأركوصورات من اللواحم • كانت تتغذى على البرمائيات والزواحف الأقدم • كان في مقدورها اصطلياد الحيوانات الأخرى لأنها كانت تسير أسرع من فرائسها • وهى من سلالة أفراد كان حوضها يختلف عن شكل حوض البرمائيات والزواحف الأقدم باحدى طريقتين : إما أن تحول الأطراف الى موضع تحت الجسم مباشرة (فى البرمائيات والتماسيح يركب عظم الذراع وعظم الفخذ أفقيا ، وتكون الأطراف السفلى هى الرأسية) ، أو أن يسمح بوجود قدمين •

كانت معظم الأركوصورات من ذوات القدمين ، وإن كان بعضها هكذا جزئيا فقط ، كما أن بعضها كان أصلا ذا قدمين ثم تخلى عن ذلك • ومثل هذه قد خانت الطريق الذى غدت به حيوانات من ذوات الأربع بأن حملت رجلين خلفيتين أطول وأقوى من الأماميتين ، كما حملت اذينا قوية كانت تساعد فى توازن الأشكال ذات القدمين •

كان للأركوصورات الأولى أسنان توحى بغذاء نباتي ، كما أن البعض الآخر فقد أسنانه تماما واستبدلها بمنقار قرني صلب • ولقد تميزت الأركوصورات عن غيرها من مجاميع الزواحف بخصائص فسيولوجية أخرى تتعلق بالجمجمة وكذا بالأطراف •

بزغت الدينوصورات من بين الأركوصورات • اننا نميل الى تجميع كل الدينوصورات سويا ، لكنها فى الحق تشكل بضع مجاميع مميزة • صحيح أن البعض استمر لاحما ، إلا أن معظمها قد تحول الى عاشب يمشى على أربع - لا على اثنين - عندما تميز كدينوصور • وعن الأركوصورات نشأت الصوريشيا والأورنيثيشيا والتماسيح والصورات المنحطة والطيور • وهذه المجاميع مختلفة تماما • وبالرغم من أن الطيور ليست من الزواحف إلا انها قد ادرجت لأنها تشعبت مبكرا عن أرومة الزواحف ، ولأنها عاشت فى الفترة التى كانت فيها الزواحف أكثر فقاريات اليابسة عددا ، كما انها احتفظت بالكثير من خصائص الزواحف • والشئ الغريب انها لا ترتبط كثيرا بالصورات الجلحة التى تطورت عن طريق مختلف • أما رقبنا الدينوصورات الحقيقية فهما الصوريشيا والأورنيثيشيا •

تختلف المجاميع فى تركيب الحوض ، لكنها تختلف أيضا فى غير هذا من الصفات • ابتدأت الصوريشيات ، كلواحم تطور الكثير منها الى عواشب تمشى على أربع • لكن كل الدينوصورات اللاحمة تنتمى الى هذه المجموعة • أما الأورنيثيشيات فقد كانت عاشبة من البداية وبقيت هكذا ، لكن البعض منها - تماما كالصوريشيات - قد تطور الى حيوانات ضخمة

دات قدمين ، على الأقل جزئيا . ولقد تطور البعض من هذه الأشكال ذات الرجلين الى الهادروصورات ، ومن المبعد أن هذه الدينوصورات العجيبة ذات المنقار كانت ترمى فى قطمان كبيرة فى النهايات الأخيرة للعصر الطباشيرى .

كان ثمة داخل هاتين المجموعتين الرئيسيتين مجاميع أصغر ، فى داخلها أعداد ضخمة من الأجناس والأنواع ، كان لها كل الأشكال والأحجام ، ولم تكن جميعا ضخمة . فبعض الدينوصورات لم يزد حجمه عن حجم الأوزة . واكتسب البعض منها صفائح عظمية – ربما للدفاع – أو اكتسب أهدابا عظمية ضخمة تشكلت فى بعض الأنواع عن سحب جزء من الجمجمة لتوفير المكان لعضلات الفك . كانت الدينوصورات بالتأكيد متباينة ، وكان انتشارها واسعا . ويمكننا أن نقول أنها قد استغلت كل الموارد التى أتتحت لها . كما أنها بكل تأكيد لم تكن قندهور فى نهاية العصر الطباشيرى ، أو كما قال سى . رومر : « إذا استثنينا الباليوبودات والاستيجوصورات البدائية ، فإن كل الأنماط الرئيسية للدينوصورات كانت ما تزال موجودة فى المراحل النهائية للحقب الميزوزوى (العصر الطباشيرى) لكنها أختفت جميعا على بداية الحقب السينوزوى (الحقب الثالث) »

فנית الدينوصورات نتيجة لكارثة ما . لو أن الكارثة لم تحدث ، فهل كانت ستقصر فى ذلك الوقت على أية حال ؟ اننا نعرف بوضوح – لاننا من الثدييات – المميزات التى يضيفها علينا ملمعان أساسيان من ملامحنا : ثبات حرارة الجسم ، وولادة الأحياء . كانت الثدييات – وهى سليفة زواحف شبه ثديية – موجودة خلال الفترة الأخيرة من العصر الطباشيرى . والنظم الثابتة يمكن أن تقلق إذا ما غزتها أنواع جديدة تثبت أنفسها . ولقد حدثت التغيرات الايكولوجية فى زماننا نحن بسبب دخول أنواع خارجية فى نظم ايكولوجية كانت ثابتة – فالأرانب والعنبر البرى والقطط البرية قد سببت مثل هذه التغيرات فى الكثير من أجزاء العالم .

طبيعى أن تكون الأنواع الجديدة – فى مثل هذه الأحوال – غريبة بالنسبة للنظام الذى تغزوه . فلو أنها تطورت داخل النظام لشكلت جزءا من شبكة العلاقات التى تضم المفترسات والطفيليات ، ولأوقف تزايد أعدادها عند حد محدود – فالنظام الثابت لا يمكن أن يقلق هكذا ، من داخله . أمن الممكن أن تكون الثدييات قد جاءت غازية ؟ أمن الجائز أن تكون قد ظهرت أولا – أو ظهر البعض منها – فى منطقة معينة ثم هاجرت ، وأن علاقتها بالدينوصورات كانت تشبه مثلا علاقة الجرابيات الشديدة فى استراليا بالمشيمات التى أدخلها الأوربيون بهذه القسارة فاحتلت معظم

مواطنها وتسببت في انقراض البعض منها ؟ نعم ، هذا ممكن • وإن لم يكن ثمة دليل على حدوث هذا غير أن هذا التفسير غير كاف • فالمؤكد أن المشيميات الثديية قد حلت محل الجرابيات باستراليا ، لكن لم ينقرض من الجرابيات إلا البعض - فهي لم تنقرض جميعا • بل وربما استفاد من ذلك أكبر العواشب الجرابية - الكنغر - فازدادت أعداده •

هل علينا إذن أن نفترض أن مثالنا عن الجرابيات في مواجهة المشيميات لم يكن صارما بما فيه الكفاية ؟ هل علينا أن ننسب ميزة أكبر الثدييات في تنافسها مع الزواحف ؟ أن هذه واحدة من وجهات النظر التقليدية ، ولكن ما مدى واقعية مثل هذه الميزة ؟

الثدييات ثابتة الحرارة ، وهي تلد أحيانا ، كما قلنا • كلتا الصفتين تضفيان بعض المزايا ، لكن ثبات الحرارة له ثمن يدفع كغذاء أكثر • من الجائز جدا أن يكون الظهور الفجائي لثابتات الحرارة قد أجهد موارد الغذاء التي كانت لا تكاد تكفي الغذاء المتواضع لتغيرات الحرارة • لاشك إن بعض الزواحف ، كان يحيا على الكفاف في مراعى ضعيفة • في مثل هذه الظروف سيصعب أن تحل ثابتات الحرارة محل متغيرات الحرارة • فعندما يكون الغذاء شحيحا لن يتميز النهم • وعلى هذا فإذا ما ظلت الظروف البيئية ثابتة في موطن تزدهر فيه متغيرات الحرارة فلن تتميز فيه ثابتات الحرارة • إنما يتحقق التميز إذا ما هاجرت ثابتات الحرارة إلى بيئات تركبتها متغيرات الحرارة بسبب الجو • ومن الممكن جدا أن تنخيل وضعا يمكن فيه لثابتات الحرارة أن تستغل موارد عديمة النفع بالنسبة لمتغيرات الحرارة السابقة التواجد بالموقع ، بحيث تحيا الثدييات في وضع التابع بجانب الزواحف • لكن من الصعب أن نتصور أن تكون للثدييات اليد العليا إلا حينما - وحتى - تقع حادثة خارجية تغير البيئة لتصبح في غير صالح متغيرات الحرارة •

وأكثر من ذلك • أننا نفترض أن الزواحف كانت متغيرة الحرارة • ولقد سبق أن ذكرنا أنها قد لا تكون كذلك • فالثدييات لم تتطور إلا مؤخرا عن الزواحف الشبيهة بالثدييات ، التي يجوز جدا أن تكون ثابتة الحرارة ، وقد تكون الأسلاف الثابتة الحرارة للطيور موجودة أيضا عندئذ • حتى لو سمحنا بميزة لثابتات الحرارة ، فستكون ميزة للثدييات يشاركتها فيها على الأغلب بعض الزواحف •

والولادة تضفي أيضا ميزة ، لكن هذه لا تفيد الثدييات بأكثر مما تفيد الزواحف • فالكثير من زواحف العصر الحالي - كما ذكرنا - ولود بيوض الشيء الذي يسمح لها بالتمتع بنفس المميزات • ولما كانت الثدييات

الولود قد انحدرت عن الزواحف ، فليس من المستحيل أن تكون بعض الزواحف العصر الطباشيري ولودا حقيقية .

بمعنى ما ، نحن اذن لا نقارن بالضرورة شبيهها بشبيهه . فالكثير من الزواحف ولود ييـوس ، وربما كان البعض منها ولودا وربما كان البعض ثابت الحرارة . لكن ليس لدينا سبب يدعونا للقرض بأن الكثير من الزواحف - أو حتى بأن أيا من الزواحف - كان ولودا وكان في نفس الوقت ثابت الحرارة ، كما هو حال الثدييات .

إذا أردنا أن نتصور حالة كارثة تزدهر فيها الحيوانات أن كانت لها الصفتان على حساب الحيوانات التي لا تمتلك أيا من الصفتين أو واحدة منهما فقط ، فأننا سنحتاج نوعا من التغير البيئي ناتجبا عن عوامل خارجية . وربما كان العامل الأكثر احتمالا هنا هو المناخ . فإذا ما تحول المناخ بحيث أصبحت فصوله واضحة ، عندئذ سنقاسي الزواحف ولا شك .

لا يلزم أن يكون الصيف أبرد ، طالما كان أدفا من الشتاء وطالما انخفضت حرارة الشتاء الى مستوى لا تتحمله متغيرات الحرارة . فإذا ما كان الصيف أيضا أدفا تزايد الأثر المعاكس على هذه الحيوانات . وحيثما كانت الحرارة أعلى أو أدنى من المدى الذي تنشط عنده متغيرات الحرارة ، فسيكون عليها أن تنفق في تدفئة أو تبريد انفسها وقتا لا تستطيع أن تكترسه في أي نشاط آخر .

فإذا كانت هذه الحيوانات تضع بيضا مخصبا فإن البيض أيضا سيتأثر بالحرارة المرتفعة والمنخفضة . ومن الجائز ألا يكون ثمة فصل للتناسل في الحيوانات التي تطورت تحت مناخ بلا فصول مميزة ، فلن يكون هناك سبب يستدعي ذلك . لكن ما أن تتحول البيئة الى المناخ الموسمي حتى يدعم الضغط الانتخابي تحولا الى التناسل الموسمي . قد لا يكون هذا في ذاته كافيا لضمان البقاء ، فليس أيض الحيوانات وحده هو ما يتأثر بدرجة الحرارة ، إذ تتأثر أيضا النباتات التي تعتمد عليها الحيوانات في غذائها . فالمناخ الموسمي هو مناخ يتباين فيه أيضا مع الفصول القدر المتاح من الغذاء .

لا شك أن هذا سيضيف ضغطا انتخابيا آخر على السلوك التناسلي . فلا يلقى أن يضع الحيوان بيضه عندما تكون حرارة الجو ملائمة لتفريخه، إذ يلزم أن تنلق الصغار الى بيئة غنية بالغذاء . ذلك أنها إذا لم تتمكن من النمو بسرعة حتى تصل الى الحجم البالغ - الشيء الذي يحصر مجال الاستراتيجية في الحيوانات الصغيرة - فإن عليها أن تنفقس مبكرا في

فصل نمو النباتات كى تقضى أطول وقت ممكن فى التغذية وزيادة الوزن
انتظارا لنقص الغذاء فى الشتاء القادم . غير أنه اذا كان للبيض أن
يفقس مبكرا ، فسيستحم أن تضع الحيوانات بيضها فى وقت أبكر حتى
من هذا ، وفى هذا ما يزيد من خطر أن تتسبب برودة الجو فى تبريد
البيض ، فتقتل الأجنة .

ثمة طريقتان لحل هذه المشكلة . فالطيور التى تعيش عند خطوط
العرض العليا مثلا تضع بيضها مبكرا فى العام ، لكنها تقوم بحضانتها
بحرارة أجسامها ، وهى لا تستطيع أن تفعل هذا لو لم تكن من ثابتات
الحرارة . فالزواحف الحديثة لا يمكنها أن تقوم بهذا .

أما الطريق الثانى فهو أن يكون الحيوان ولودا ، أو على الأقل
ولودا بيوضا . فباحدى هاتين الوسيلتين يمكن للكلباء السيطرة بثبات
على بيئة البيض المحضن ، ففى بحثها عن الظروف التى تفضلها ستصلح
أوتوماتيكيا الى الظروف التى يحتاجها بيضها . وهذه الاستراتيجية تصلح
لمتغيرات الحرارة ، كما تصلح لثابتات الحرارة . فعندما تدفئ متغيرات
الحرارة جسمها أو تبرده فانها تدفئ بيضها وتبرده . ورغم ذلك فإن
ثابتات الحرارة تتمتع بميزة واضحة لأنها أقل انصياعا لحرارة الجو ،
وتستطيع أن تعمل بكفاءة فى مدى واسع من درجات الحرارة الخارجية .
ومن الممكن أن تتزاوج فى الخريف ، ويمتد الحمل خلال الشتاء ، لتلد على
نهاية الشتاء وتقطع صغارها عندما يكون الغذاء النباتى وفيرا .

ولقد تحولت طريقة الولادة فى بعض الثدييات الحالية لتسمح
بامتصاص الأجنة الميتة ، وبذا تضمن الأيولد إلا الأفراد التى لها أعلى
فرصة فى البقاء ، كما تضمن ألا تبسدد الأم الموارد التى تستثمرها فى
اجنتها . كما أن تثبيت البويضة المخصبة فى الرحم قد يتأخر فى بعض
الثدييات لفترة قد تصل شهورا ، وهذا يسمح بأن تتزاوج الأفراد البالغة
فى الفصل الذى تكون فيه أكثر نشاطا ، وبأن تولد الصغار عندما تصبح
الظروف البيئية أفضل ما تكون بالنسبة لها . ولا يمكن بطبيعة الحال
أن تتم أى من هاتين الطريقتين إلا اذا كان الحيوان ولودا .

بذا تزدهر الثدييات والطيور فى المناخ الموسمى الحقيقى ، بينما
تزدهر الغالبية العظمى من الزواحف فى المناخ غير الموسمى . فإذا كان
المناخ قد تغير خلال العصر الطباشيرى، فمن الممكن أن يسمح ذلك للثدييات
بأن تحل محل الزواحف ولو كان المناخ قد تغير فجأة ، فإن التغير لابد وأن
يكون أيضا فجائيا . فهل تحول المناخ بهذه الطريقة ؟

كان المناخ خلال العصر الطباشيرى معتدلا فى العالم كله ، كما أنه

- وهذا هو المهم - كان ثابتا مستقرا . كان المناخ مثاليا بالنسبة للزواحف ، لسبب بسيط هو أنها قد تطورت بالتمديد داخل هذا المناخ . ولو أن المناخ قد بقي دون تغير حتى زماننا هذا ، فإن يكون ثمة سبب لتدهور الزواحف . ربما بقيت الثدييات تحيا في ظلام الليل . ولو حدث وتطورت بعض الكائنات « الذكية » - كائنات مثلا ذات تكنولوجيات متقدمة - فسيكون جلدها على الأغلب ذا حراشيف و (ربما) كانت لها ذيول طويلة .

غير أن المناخ كان يتغير في نهاية الحقب الميزوزوى ، ومن الممكن أن نلاحظ بداية التغير في العصر الطباشيري . لكن التغير على نهاية هذا العصر لم يكن قد تقدم كثيرا - لم يكن ثمة ثلوج على السطح - لكن العالم كان يتجه نحو البرودة . غير ظهور الجبال من انماط دورات الهواء كما حور من المناخات المحلية . تسببت تحركات قشرة الأرض في رفع كتل القارات وخفض مستوى ماء البحر . وربما سببت بعض التغيرات في الشمس نفسها انخفاضا في كمية الطاقة التي تصل الأرض . قد تكون هذه التغيرات كافية لحدوث بعض الانقراضات المحلية . وهناك أدلة حفرية تقول أن مثل هذه التغيرات قد نتج عنها بعض الانقراضات ، ولكن ليس من سبب للدعاء بأنها كانت أكثر من انقراضات محلية .

استمر تغير المناخ حتى العصر الثالث . ارتفعت مستويات البحر مرة أخرى بسبب تحركات تالية في قشرة الأرض . لكن ، برغم ذلك ظلت عملية التبريد بطيئة . وحتى الفترة الأوليجوسينية - التي ابتدأت منذ ٢٨ مليون سنة - كان المناخ الاستوائي يمتد على جانبي خط الاستواء إلى مسافة نحو ٥٠ درجة . ولم يصبح مناخ الأرض موسميا وانحسا إلا منذ نحو ٢٧ مليون سنة ، ليضمحل الحزام الاستوائي في اتجاه خط الاستواء . عندئذ بدأت مزايا ثبات حرارة الجسم مع صفة الولادة ، بدأت تظهر أثرها - لتتزايد أعداد الثدييات وتتدهور أعداد الزواحف .

لم يكن هذا بالطبع هو السبب في اختفاء الدينوصورات . لقد اختفت لأن كارثة وقعت أودت بالحيوانات الكبيرة ، وبسرعة عادت الظروف بعد الواقعة إلى ما كانت عليه ، لتتكاثر الثدييات قتلًا المواطن الأيكولوجية التي فرغتها الزواحف . ثم إن الدينوصورات قد اختفت منذ ٦٥ مليون سنة لا منذ ٢٧ مليون سنة ، أي قبل ٣٨ مليون سنة من حدوث التغير في المناخ الذي قد يؤدي إلى اختفائها . لو أن هذه الواقعة لم تحدث ، إذن لترقبنا بالتأكيد أن تتسبب برودة المناخ في تغيرات تطورية تكيف بها الأنواع نفسها مع الظروف الجديدة . ولا يمكننا إلا أن نفترض بأن الثدييات كانت ستستفيد في مثل هذه الحالة . ولنا أن نتوقع ظهور أنواع

من الزواحف افضل تكيفا مع الظروف البيئية الجديدة التى تعيش تحتها -
ليس الزاحف الثابت الحرارة الولود المتكيف للحياة فى المناخ الموسمى ،
ثدييا تحت اسم آخر ؟

ورغم ذلك فهناك نتيجة تطورية مثيرة • ان النجاح العظيم للثدييات
قد ابتدأ منذ ٦٥ مليون سنة ، مباشرة بعد الاصطدام • لو ان هذا
الاصطدام لم يحدث ، فسيكون تغير المناخ (بعد ٢٨ مليون سنة) هو
اكثر الاسباب احتمالا لاي تغير تطورى كبير • ان الامر يبدو ان كما لو
كان الاثر البيولوجى الرئيسى الطويل المدى للاصطدام هو التبريد بتغيير
كان سيحدث بعد ٢٨ مليون سنة • لقد تسبب الاصطدام فى اسراع التطور
بهذا القدر •

ان العادة ان نفكر فى الكوارث الهائلة فى صورة حجم الخراب
الذى تسببه وعدد الكائنات الحية الذى تقتله • وهذه بالطبع طريقة -
قصيرة الامد - للنظر الى الآثار • اما اذا نظرنا الى النتائج البعيدة
المدى ، فان علينا ان نعترف بان الآثار لم تكن بهذه الخطورة - فلقد
استمرت الحياة ، بل وسنعتبرها مفيدة ، لاننا من جنس الانسان • فهناك
من الاسباب ما يجعلنا نعتقد ان هذه الكارثة قد منحتنا الارض بضع
عشرات الملايين من السنين ، لم تكن دونها لنتمتع بخيراتها • وهذا لا يعنى
ان كل الكوارث العظمى سيكون لها مثل هذا الاثر ، فربما كانت هذه النتيجة
مرتبطة بالحوادث التى تقع خلال فترة طويلة من الثبات ، ان الأرجح ان
يكون للكوارث التى تحدث خلال فترة تغير سريع اثر اقل نفعا • ربما كانت
هذه الكارثة المعينة قد اسرعت من عملية التطور ، لكن هذا لا يعنى ان
نرحب - بالنيابة عن انفسنا وبالأصالة عن كوكب الأرض - بوقائع اخرى
من هذا القبيل • فقد تختلف النتائج تماما • اما فى حالتنا التى ندرسها ،
فيبدو ان ثمة اذى كبيرا لم يحدث •

الفصل العاشر

السماء الشائرة

اننا نعتقد ان كويكبا قد ارتطم بالأرض منذ ٦٥ مليون سنة ، وأن هذا الاصطدام قد قتل بلايين لا تعد ولا تحصى من الكائنات الحية ، وغير من مجرى التطور . وليس امامنا الا أن نسأل الاسئلة التى تبرز تلقائيا عن هذا الاكتشاف . هل كانت الواقعة منفردة ؟ هل حدث ما يشبهها مثلا ؟ هل يمكن أن تحدث مستقبلا ؟

ان القمر هو المكان الذى سنبدا فيه البحث عن الاجابات . وعندما نفحص تابعنا هذا علينا أن نقارن نتائجنا بما نعرفه من الشواهد عن جيراننا فى النظام الشمسى : المريخ والزهرة وعطارد .

ان اول ما نلاحظه هو أن سطح القمر ملئ بالحفر . ولقد ظل أصل هذه الحفر غير مؤكد لفترة طويلة . كان المعتقد أنها نشأت عن اجسام تصطدم بالسطح ، أو أنها ناتجة عن البراكين ، ولكن معظمها ناتج عن اصطدامات .

تكاد هذه الحفر جميعا تكون دائرية . وهذا شيء غريب . فلقد رأينا أن احتمال أن تكون زاوية اصطدام الجسم الساقط بسطح الجسم الآخر زاوية قائمة بالضبط هو أمر مستبعد للغاية ، وأن احتمال أن يحدث ذلك مع كل الأجسام المصطدمة هو احتمال مرفوض تماما . فإذا ما كان الاصطدام يتم بزاوية ضحلة ، فإن ذلك سيسبب حفرة لها شكل بيضاوى تقريبا . أما الحفر الدائرية فالأرجح أن تنشأ عن البراكين . لكن اللغز قد حل ، وللحل علاقة بقصتنا .

عندما يصطدم نيزك يزن عدة أطنان بسطح الأرض أو القمر بسرعة تحسب بالكيلو مترات فى الثانية ، فإنه ينقل قوة دفعه الهائلة الى صخور السطح . تضغط هذه فى أول الأمر وتدفع الى أسفل . لكن الضغط المتزايد من الصخور السفلية سريعا ما يقاوم قوة الاصطدام ويوقف الحركة

الى أسفل . هنا تكون معظم طاقة الاصطدام محصورة فى منطقة صغيرة من الصخر الساخن المضغوط ، فتتدد الى الخارج مع اتجاه القطر ، وتدفق بصخور السطح جانبا لتكون حفرة دائرية مضبوطة . وفى الوقت الذى يبدأ فيه التدفق الى الخارج تكون حركة النيزك الى أسفل قد توقفت .

عندما يحدث الانضغاط الزهيب فى أول الامر ، ويبطىء الاصطدام من سرعة النيزك ، يتولد من الحرارة مايكفى لتحويل النيزك الى بلازما غازية . وعندما تتمدد هذه لتشكل الحفرة ، فلن يتبقى من المادة الأصلية التى سقطت من السماء أية آثار صلبة ، لا على قاع الحفرة ولا تحته . تنشئت هذه كفتبار تحمله الرياح بعيدا .

يبطىء الغلاف الجوى للأرض كثيرا من سرعة النيازك الصغيرة - تماما كما يحدث مع مركبات عودة رجال الفضاء - بحيث تهب بهدوء نسبي ، فتبقى كما هى سليمة . أما الأجسام الضخمة أو الكويكبية فأنها تفقد فى الهواء نسبة جد صغيرة من طاقتها الحركية الكلية ، بحيث يصبح أثر وجود الغلاف الجوى على قوة الاصطدام مع السطح أثرا تافها .

اصطدم بالقمر اذن خلال تاريخه الكثير من الأجسام الصلبة الضخمة التى تتحرك بسرعة . عندما أرسلت مركبة الفضاء غير المأهولة بأول الصور القريبة لسطح عطارد ، اتضح انه سطح ملئ بالحفر . ومعلوماتنا عن سطح الزهرة اقل تفصيلا ، لكن سطح المريخ هو الآخر ملئ بالحفر ، الشيء الذى يدفعنا للفرض بأن كوكب الزهرة لابد وأن يكون قد تعرض هو الآخر لنفس الشيء . والحقيقة أن الأجرام بالمنطقة الداخلية من النظام الشمسى - عطارد والزهرة والقمر والمريخ - كلها قد تعرض للاصطدام مرات ومرات لا تعد ولا تحصى . فلماذا اذن نفترض أن تتميز الأرض عنها جميعا ؟ لماذا تصطدم الأجسام بالقمر ولا تصطدم بالأرض ، وهى القريبة جدا منه والأكبر حجما ؟

لا يوجد غير اجابة واحدة . ان الأرض ليست مميزة خاصة . لقد اصطدم بها الكثير من مثل هذه الكويكبات . أما أن سطحها لا يحفظ الا القليل من الحفر ، فهذا يرجع الى كونها نشطة تكتونيكيا ، ولأن وفرة مياهها تسبب التجوية وستأكل مع الزمان سلاسل باكملها من الجبال بسبب جو الأرض . من المستبعد اذن أن تبقى مثل هذه الحفر على سطح الأرض فترة طويلة ، فسطح الأرض لا يحفظ مثل هذه الآثار جيدا . وقد يكون سطح كوكب الزهرة كسطح الأرض من هذه الوجهة - فالحفر عليهما ليست بالكثيرة . ولن يكون سبب التعرية فيه هو الماء ، وإنما الغلاف

الجوى الذى يصل من الكثافة حدا يمكن فيه اعتباره محيطا هائلا من ثانى اكسيد الكريون . أما أسطح الكواكب القريبة فتحتفظ الحفر جيدا .

هذا يجيب على السؤالين الأول والثانى . لم يكن اصطدام الكويكب الذى وصفناه واقعة منفردة . فلقد حدثت قبلا مثل هذه الاصطدامات كثيرا ولا شك . لقد حدثت هذه الواقعة منذ ٦٥ مليون سنة مضت ، وهذا يبدو زمنا طويلا . فهل يعنى ذلك أن هذا الاصطدام الأخير كان النهائى ، وأن السماء لا تحوى أية أجسام ضخمة يمكنها أن تمطرنا بها ؟ أن اجابة هذا السؤال - يا للأسف - لا بد وأن تكون « كلا » .

حياتنا قصيرة ، ونحن نقيس الزمن بها . فليس ثمة فارق كبير بين الأبد وبين بضعة ملايين من السنين . أن مثل هذه الأرقام الضخمة أبعد من خبراتنا . يلزمنا أن نفكر فى الحوادث داخل النظام الشمسى فى صورة ما يمكن أن نسميه « الزمن الشمسى » لا « الزمن البشرى » . قد تمتد حياة الانسان - ونادرا - الى مائة عام ، أما فترة حياة النظام الشمسى فتتمتد آلاف الملايين من السنين . ولقد وجد هذا النظام بالفعل منذ نحو ٥ بليون سنة . دعنا نربط الاثنين بتحويل الزمن الشمسى الى زمن بشرى . لكى نفعل هذا علينا أن نفترض طولا لحياة الشمس ثم نقدر عمرها . دعنا نفترض أنها فى خريف العمر : أن هذا يعادل خمسين عاما من عمر الانسان . معنى هذا أن خمسين عاما من عمر الانسان تعادل خمسة بلايين سنة فى عمر النظام الشمسى . وبذا فإن ٦٥ مليون سنة من عمر النظام الشمسى لا تعادل سوى أقل من ثمانية أشهر من عمر الانسان . وعلى هذا فإن الواقعة التى حدثت منذ ثمانية أشهر والتى نعرف أنها تتكرر كثيرا هى واقعة دورية . أما أن نتصور أن الواقعة قد حدثت منذ زمان طويل فهو مجرد وهم .

ما مدى تكرر مثل هذه الاصطدامات ؟ أمكن تقدير هذا على أساس أن الأرض تتلقى مثل هذه الاصطدامات بنفس معدل تلقى القمر وغيره من الكواكب الداخلية ، ولأنه من الممكن عند فحص الحفر بدقة أن نحدد عمرها عن طريق طبقات الصخور حولها . كانت الصورة التى بزغت عن ذلك تشير الى أن الاصطدامات كانت كثيرة جدا فى التاريخ المبكر للنظام الشمسى ، ثم تناقص تكررها بحدّة منذ نحو ٣ - ٣٥ بليون سنة الى مستوىبقى ثابتا من ذاك الحين . وعلى هذا فإننا نتوقع أن يكون الكثير من الحفر التى نراها على الكواكب الأخرى معناها فى القدم - وأن كانت الحفر القديمة قديمة بأن تغشاها حفر أحدث . وقد قدر نابير وكلوب - من المرصد الملكى بأدنبره - أن الأرض يصطدم بها كويكب قطره نحو ٣٩ كم كل ٩٢ مليون سنة (وقد حسب القطر من حجم الحفر) وكويكب

سنة ، وكويكب قطره ٣٠٨ كم كل ٣٦٠ مليون سنة . ومعنى هذا واضح .
 اننا نتوقع أن الاصطدام القادم لجسم له حجم الكويكب الذى تسبب فى
 الانقراضات الطباشيرية على وشك الحدوث ا ثمة عزاء - ان يكن محدودا
 - للعصبيين منا : لقد قام علماء آخرون بحسابات أخرى وتوصل بعضهم
 الى أن تكرر الاصطدام بأجسام قطرها ١٠ - ١١ كم يبلغ نحو مرة كل
 ١٠٠ مليون سنة .

توصلنا الى اجابات على الأسئلة الثلاثة التى بدأنا بها هذا الفصل .
 لقد حدثت اصطدمات هائلة بالأرض ، والحق أنها وقائع عادية جدا ،
 وستحدث مثل هذه الاصطدمات فى المستقبل . أما حقيقة أنها تحدث بمعدل
 يمكن حسابه فتقودنا الى تأمل جديد . فإذا كانت واقعة من هذا القبيل
 قد أنهت العصر الطباشيرى ، فهل حدثت اصطدمات أخرى نهاية عصور
 جيولوجية أخرى ؟ ان هذا احتمال قائم ، ولقد اقترحه بعض العلماء فى
 بعض الحالات على الأقل . لقد وجد نايبر وكلوب شواهد على اصطدمات
 يرجع تاريخها بالتقريب الى بداية العصر البليستوسينى (منذ مليون سنة)
 واليوسينى (منذ ١٣ مليون سنة) والميوسينى (منذ ٢٥ مليون سنة)
 والأوليوجوسينى (منذ ٣٦ مليون سنة) ، والأيوسينى (منذ ٥٨ مليون
 سنة) والجورائى (منذ ١٨١ مليون سنة) ، والترياسى (منذ ٢٣٠ مليون
 سنة) والكربونى (منذ ٣٤٥ مليون سنة) ، وان كان التقديران الأخيران
 غير دقيقين لصعوبات فى تقدير العمر . وهما يظنان أن واقعة شبيهة قد
 حدثت تتعلق بالعصر البرمى (منذ ٢٨٠ مليون سنة) وبداية العصر
 الديفونى (منذ ٤٠٥ مليون سنة) وكذا بداية العصر الطباشيرى ونهايته .

ربما واجهتك الآن صعوبة . فإذا ما كان تاريخنا مرصعا
 بالاصطدمات الهائلة مع الكويكبات ، فلماذا لم يستنفد النظام الشمسى
 ما فى جعبته من كويكبات مناسبة ؟ فمثل هذا الجسم لا يستطيع أن يصطدم
 بالكوكب أكثر من مرة ، ومعنى هذا أن جسما يفقد مع كل ارتطام . ورغم
 ذلك فإن معدل الاصطدمات يمكن حسابه ، وهو معدل يكاد يكون ثابتا .
 وعلى اية حال فليس ثمة من دليل على تناقصه .

ان هذه صعوبة حقيقية ، ولقد ذكرها الكثيرون ممن اعملوا فكرهم
 فى الموضوع . ولم يستطع أحد ان يجد الاجابة . وان كان ثمة بضعة
 نظريات . علينا أولا أن نحاول تبرير الانخفاض المصاد فى معدل
 الاصطدمات منذ ٣٥٠ مليون سنة .

من المعتقد أن النظام الشمسى قد تكثف عن سديم غازى وحطام
 صلب . ما تزال قضية الآلية الحقيقية التى تكونت بها الكواكب موضع

جدل ، لكن ، من بين النظريات الأكثر قبولا هناك نظرية التجميع عن طريق الاصطدام المتسلسل للكويكبات . وتبعاً لهذه النظرية تلتحم الأجسام المتصادمة مع بعضها ، وكلما ازداد حجم الكتلة الناتجة كلما أضافت الصخور الأصغر التي تصطدم بها كتلتها ، تماماً كما تفعل النيازك الآن . وما أن توطدت عائلة الكواكب الحالية حتى بدأت الكويكبات الباقية تستنزف بالتدريج الى أن توقف انهماهما . ولقد حدثت هذه النهاية السلمية - التي تحدد تجمع النظام الشمسي - منذ ٣٥٠ مليون عام .

تناقص معدل الاصطدامات ، ولكن لماذا لم يستمر تناقصه حتى الصفر ؟ فإذا ما كان كل كوكب جديد سيقتنص ما يجده متاحاً من المادة ، فلا بد أن تكون الكتل المتبقية آمنة تدور في أفلاك لها لا تأخذها قرب كوكب تصطدم به . ويلزم أن نوافق على أن بعض هذه الأفلاك كان واسعاً جداً ، وبذا تكون فترة الأجسام كبيرة (نقص الوقت الذي ينفق ما بين المرور بنقطة في النظام الشمسي والعودة إليها) ، وبالرغم من ذلك فالمفروض أن تكون قد اختفت من زمان طويل . ربما كان الحطام النموذجي الباقي منذ نشأة النظام الشمسي هو الموجود في الحزام النجمي ، حيث منع أن يتكون هنالك كوكب - هكذا يتصور بعض الفلكيين - بسبب القوى المغناطيسية لكوكب عطارد التي تمزق الكتل إذا ما التحمت ووصلت الى حجم معين . غير أن النجيمات لها أفلاك معروفة ويصعب أن نتخيل كيف تحيد عنها لتتجه إلينا أو الى أي كوكب آخر .

ربما كان هناك بعض من المادة - ما يزال - باقياً منذ نشأة النظام الشمسي ، وربما كانت الكواكب - ومنها الأرض - ما تزال تجمعها . أن تجميع الجسيمات الصغيرة في كتل أكبر كان أمراً أكثر احتمالاً عندما كانت سحابة المادة كثيفة نسبياً . ثم حدث أن تجمع معظمها ليكون الشمس والكواكب - والشمس وحدها تشكل أكثر من ٩٩٪ من الكتلة الكلية للنظام الشمسي - وظل الباقي منتشراً لدرجة لم تعد تسمح بالتحامه في صورة أجرام كبيرة . قد يتساقط البعض من هذه البقايا مع مطر الجسيمات الذي ما نفتاً نشاهده كنيازك أو شهب . وتجمع الأرض سنوياً ما يصل الى ١٠٠٠ طن منها . وهناك أيضاً المذنبات التي قد تكون - أو لا تكون - ناشئة من داخل النظام الشمسي ، وكذا أجسام أبولو التي قد تكون في الأصل مذنبات - وقد لا تكون . لم يتبقى - لحد علمنا - من المادة بعد نشأة النظام الشمسي ما يعادل الاصطدامات الضخمة على المستوى الذي فحصه نابير وكلوب .

ان الوضع يبدو كما لو كانت المادة تستطيع أن تدخل النظام الشمسي من خارجه . فإذا كان هذا صحيحا فسيغدو أمرا مثيرا ، لأن هذا يعني أننا قد نستطيع أن نفحص موادا لم تنشأ داخل النظام الشمسي ، وبهذا نتمكن من معرفة الكثير عن مناطق أخرى من مجرتنا .

كان أول اقتراح لنشأ من خارج النظام الشمسي هو الاقتراح الذي قدمه سنة ١٩٥٠ الفلكي الهولندي البارز جان هندريك أورت . ولقد تطور هذا الاقتراح عن أفكار قديمة حاول بها الفلكيون تفسير بعض الشذوذ في نظريات نشأة النظام الشمسي . كانت هذه تختص أساسا بالسرعات وبالعزوم الزاوية للكواكب (الكتلة \times السرعة) . فإذا ما كانت الكواكب قد نشأت حول حافة الكتلة التي أصبحت الشمس ، فكيف تتحرك بسرعة أكبر من معدل دوران الشمس ؟ فعطارد مثلا يتحرك بسرعة تبلغ ٣٠ ضعف العزم الزاوي المفروض لو كانت هذه هي القصة الكاملة لنشأة النظام الشمسي ، أما نبتون فيتحرك بسرعة تبلغ ٨٠ ضعفا . ولو أن نجما مارا عجل من سرعة الكواكب لتصل إلى مداها الحالي ، فلماذا لم تقلت الكواكب كلية من الشمس ؟ وجد هذا الاشكال حله عندما اعتبرت الشمس العضو الباقي من نظام ثنائى كان موجودا يوما ما . ونظم الانجم الثنائية شائعة جدا فى مجرتنا حتى ليتمكن اعتبارها القاعدة لا الاستثناء . ولو أن آلية ما حطمت النجم رفيق الشمس - مثلا اصطدامه بنجم آخر - وأن كان ثمة نظريات أخرى فى هذا الشأن - إذن لأمكننا تحليل سلوك الكواكب .

ماذا حدث لمادة هذا الكوكب الرفيق ؟ اقترح أورت أنها - أو بعضا منها - قد بقى ليكون سحابة من الأجسام الصغيرة تلف على محورها وتدور حول الشمس ، ولكنها ظلت غير مرئية فيما وراء فلك الكوكب بلوتو . وقد حاج بأن هذه السحابة - التي تسمى الآن سحابة أورت - هى مصدر المذنبات وكل الكويكبات التي تتحرك فى أفلاكه تختلف تماما عن افلاك الكواكب والنجميات .

لا بد أن تتكون سحابة أورت بالتصادم من نفس مادة النظام الشمسي فهى جزء منه ، وبذا فإن الأجسام التي تدخل وتصل إلى مركز النظام الشمسي لا يجب أن تعتبر سخيلة عليه . غير أن هناك نظرية أخرى بديلة ربما كانت لا تتفق مع وجود سحابة أورت .

يبدو أن الأرض تتعرض لحوادث اصطدام هائلة على فترات لا يمكن تقديرها ، لكن هذا لا يعنى أن هذه تحدث كوقائع فردية متفرقة . أنها « تتجمع » - نعنى أن الاصطدام الكبير عادة ما تصاحبه اصطدامات عديدة صغيرة فى نفس الوقت - أى تتلوه بعد بضع عشرات الآلاف من السنين أو على الأكثر بعد مليون سنة أو مليونين . وهذا يثير احتمال مقابلة

النظام الشمسى من آن لآخر لسحابات من مادة تتكون من جسيمات تتباين حجما ما بين الدقائقية وبين الكويكبية . وعلى هذا فان البعض من هذه الجسيمات قد يدخل النظام الشمسى ، وقد يصطدم البعض بالأجرام داخل هذا النظام .

نعرف ان الكواكب تدور حول الشمس : هذا امر تسهل ملاحظته . ونعرف ايضا ان الكواكب والشمس كلها تدور حول محاورها . وهذا ايضا امر يدهى بالنسبة للأرض ، ولا تصعب ملاحظته بالنسبة لبقية الكواكب . انما قد يصعب ادراك ان يكون النظام الشمسى بأكمله مشتركا فى تحرك على مستوى اعظم .

فمجرتنا - التى تتكون من مركز كثيف نسبيا يشبه القرص ، له اندرج تتحلزن عنه - مجرتنا هذه تدور حول محور لها ، ونظامنا الشمسى يتحرك بالطبع معها ، فهو جزء منها . وهذه الحركة حركة معقدة فالمجرة ليست جسما صلبا واحدا ، وأجزاءها المختلفة تتحرك بسرعات مختلفة . غير اننا نستطيع بالحساب ان نقول ان النظام الشمسى منذ نشأته قد قام بنحو خمس وعشرين دورة كاملة حول مركز المجرة - نعلم ان عمره يبلغ خمسا وعشرين سنة مجرية . وبالإضافة الى ذلك فان للشمس - مثلها مثل بقية الأنجم - تحركات غير منتظمة تحملها الى مناطق مختلفة من المجرة . وهذا امر يصعب تفهمه ، لكن قد يساعدنا فى ذلك القياس الذى عرضه ١٠٦ س . شكوفسكيائى وكارل ساجان . طلبا من قراءهما ان يتصوروا المجرة كسحابة غازية ، النجوم فيها جزيئات . وأول ما يجب الانتباه اليه هو ان السحابة نقية حقا ، لكن الجزيئات بها ليست موزعة بالتساوى ، فالسحابة اكدف فى بعض المواضع عنها فى البعض الآخر . تدور السحابة بأكملها ، وبدا فجزئياتها تشترك فى الدوران . لكن هذه الجزيئات تتجول استجابة للقوى الموضعية - شأنها شأن الجزيئات الحقيقية فى أى سحابة غاز طبيعية .

ثمة حركة مماثلة تحمل الشمس خلال الأذرع اللولبية للمجرة ، ونحن نعتبر ذراعاً من هذه كل يضع عشرات من ملايين السنين . فإذا كانت هذه الأذرع اللولبية تضم كويكبات ، فمن الجائز ان تتسبب حركة الشمس خلالها من حيز بعض منها ليشكل سحابة أورث . ومثل هذه السحابة لن تبقى طويلا (بالزمن المجرى) ، ذلك ان حركتها ، بجانب القوى الجاذبية للشمس ، ستسبب تشتتها ، اذ سيتطوح ببعض الأجرام بعيدا ، كما ستدفع بعض الأجرام الأخرى نحو الشمس نفسها - الى داخل النظام الشمسى - حيث يفقد بعضها بالاصطدام بالكواكب . اقترح نابير وكلوب

– اللذان يعضدان هذه النظرية – أن هذه الطريقة قد أسر بها معظم المذنبات ، والكويكبات من خارج الحزام النجمي ، والكثير من النجوم .
أن بقاء هذه الأجسام داخل النظام الشمسي إنما هو أمر مؤقت . فستضيع في نهاية الأمر ، أما بالاصطدام بالكواكب ، أو بتحريكها خارج النظام تماما .

لكن هذه النظرية تواجه صعوبات يعترف بها نابير وكلوب . فليس من السهل عليها أن تعلق كيف تكون بالأذرع اللولبية للمجرة هذا العدد الكبير من الأجسام الكبيرة ، عن طريق الالتحام ، وذلك في الزمن المتاح ، والذي يقدر من عمر المجرة بأكملها . ورغم ذلك فإن تكوين هذه الأجسام ليس مستحيلا ، والنظرية في الواقع مقنعة .

إذا كان ما نلاحظه خلال المجرة هو من المادة غير النجمية ، فكيف ينسجم هذا مع قولنا بأنه لما كان تحليل النيازك مطابقا لمادة النظام الشمسي فأنها لابد وقد نشأت داخل النظام الشمسي ؟

نعلم أن مادة الكون الأساسية هي الأيدروجين ، وأن كل العناصر الأثقل مصنوعة منه . ونعلم أيضا كيف تتكون داخل النجوم ، كما نعلم أن العناصر الأثقل من الحديد لابد وأن تتشكل في ظروف لا توفرها إلا السوبرنوفا . ولدينا نظريات تفسر تشكيل نظامنا الشمسي ، الذي نعرف تركيبه . وليس من المعقول أن يكون نظامنا الشمسي نظاما متفردا ، لا ولا أن تكون هكذا حتى منطقتنا من المجرة . أن القوانين التي تحكم تكوين العناصر وتكوين النجوم لابد وأن تكون عامة ، على الأقل داخل مجرتنا . وعلى هذا فإن ما نعثر عليه من مواد داخل مجرتنا سيكون من عناصر مشابهة لما نجده في نظامنا ، لأن تشكيلها وتنظيمها لابد وأن يكون ناتجا عن عمليات مطابقة لما حدث بمجرتنا . أما فكرة أن تتشكل الكويكبات عن التحام الغبار داخل الأذرع اللولبية للمجرة فهي فكرة تستقيم مع النظرية ، وهي تستقيم أيضا مع ما نلاحظه من نقص الكربون والنيتروجين والأكسجين في الغبار بين النجوم ، ومن وجود « الكريات الباردة » التي ينبعث منها أول أكسيد الكربون والتي قد ترتبط بتكوين الكويكبات . ويبدو أن هذه الكريات هي التجمعات المتممة للغبار التي قد تكون في سبيلها إلى التكون أو التفتت ، بنفس الطريقة تقريبا التي تنشأ بها النجوم في المراحل الأولى . أما حقيقة ملاحظة هذه الكريات وهي تقذف بأول أكسيد الكربون – الذي يمكن رصده – فقد قادت نابير وكلوب لاستنباط وجودها في بعض أجزاء السحابة التي تطلق أول أكسيد الكربون والتي لا يلحظ بها أجسام صلبة .

قد يكون توزيع نظائر العناصر نمطيا للأفران النجمية - أو السوبر نوفا - التي تكونت بها ، ولكن ليس هناك سبب حقيقي للفرض بهذا . ولن نستطيع الفرض بأن النجوم التي تتكون بها العناصر الثقيلة تضع بصمتها فوق هذه العناصر حتى نكتشف عينات من العناصر تختلف عن بعضها اختلافا واضحا في التركيب النظائري .

ونحن أولا وأخيرا لا نعرف ما اذا كان كويكب العصر الطباشيري قد نشأ داخل النظام الشمسي أم أنه قد اقتنص من خارجه ، لكن احتمال دخول الكويكبات الى النظام الشمسي من آن لآخر احتمال قائم وقوي . أما ما نعرفه فهو أن ثمة اصطدامات بالكويكبات قد حدثت مرات عديدة في الماضي ، وأن معدلات الاصطدامات خلال الثلاثة بلايين سنة الماضية (أو الثلاثة بلايين ونصف) قد بقيت ثابتة ، وأنه اذا ما كان ثمة رصيد ثابت منها فانه بعد لم يستنفذ . ويوما ما ، قريبا لا بعيدا - بالنظر الى ما نعرفه عن متوسط حدوث هذه الاصطدامات - سيرتطم بأرضنا كويكب آخر !

ماذا سنفعل حياله ؟ نظريا ، أمامنا خياران : الوقاية أو العلاج .

الواقع أن طريق « العلاج » لن يكون عمليا . انه يعنى اقرارنا بالامناص من وقوع الكارثة ، وأنه ليس أمامنا الا أن نحاول النجاة منها . وإن نتجر منها جميعا - بالطبع . ستتطم كل الحياة في منطقة الاصطدام نفسه ، أما في المناطق الأبعد فالبقاء ممكن اذا كنا قد اتخذنا احتياطاتنا مقدما . والواضح أن هذا يتطلب اقامة مخابيه للوقاية ، يلزم أن تكون قادرة على ترشيح الهواء وتنقيته ، كما يلزم أن تتحمل الحرارة العالية والهزة العنيفة ، بينما توفر في نفس الوقت الظروف الصالحة للحياة ، بل وقد يلزم أيضا أن تتحمل الغمر الكامل تحت الماء . أما من سيحتمون داخلها فسيضطرون للبقاء بضعة أسابيع ، وبذا يلزم أن يكون معهم ما يكفي من الغذاء والماء . وهذه الحاجات - من ناحية المبدأ - لا تشكل صعوبات تقنية كبيرة ، ففى مقدورنا أن نقيم مبان بهذه المواصفات .

علينا أن نسلم باحتمال أن يواجه الناس عند خروجهم من مخبئهم بأن كل الحيوانات الكبيرة قد قتلت لسبب أو لآخر ، ومثلها أيضا معظم النباتات . قد تصبح التربة أيضا حامضية جدا والماء ملوثا . يمكننا أن نسلم بهذا . فإذا ما كان مخزون الغذاء يكفي سنتين على الأقل ، وإذا كنا قد حمينا معنا نوية للتربية من حيوانات المزرعة ، فمن الممكن أن نستعيد تربية الحيوانات ثانية . وإذا ما كنا قد أخذنا معنا بذور محاصيل الحقل وغيرها من النباتات التي تنمو طبيعيا في المنطقة القريبة ، فمن الممكن أن يعوض الغطاء الأخضر . وإذا كنا قد حفظنا قدرا كبيرا من الجير ، فمن

الممكن اصلاح جموضة التربة • وإذا كنا قد خصصنا بعض المخاضىء
للنباتات التى تطهر الماء فمن الممكن أن نوفر بسرعة ما يكفى من الماء
الصالح للشرب • يمكن القيام بهذا ، كل هذا ، ولكن هل هذا أمر عملى ؟

فالوا ، سننقذ ٠٠ من ؟ فاما أن نجد مكانا بالملجأ لكل البشر ، واما
أن نواجه قرارات أخلاقية صعبة • ستكون الاستجابة السياسية على الأرجح
- والثى ربما كانت الأفضل - هو ألا نتخذ قرارا على الإطلاق • ستكون
تكاليف انشاء المخاضىء هائلة ، ولابد أن تدفعها مجتمعات فشلت حتى الآن
فى تهيئة ما يكفى من الغذاء والسكن للملايين البشر تحت الظروف
الطبيعية • اما حجم هذه التكاليف فلا بد أن يقدر حسب قدر الحظر الذى
سيعرض له البشر وهذا يتطلب منا ليس فقط أن نقدر مدى أثر الاصطدام،
وانما أيضا احتمال وقوعه • اننا نستطيع أن نقول ببعض الثقة انه من
المحتمل جدا أن يقع مثل هذا الاصطدام خلال الخمسين مليون سنة القادمة
ولكن يصعب أن نجد محاسبا يتأثر بهذا ! انه يريد أن يعرف الاحتمال
خلال العشرة أو الخمسة أعوام القادمة • فإذا كان ثمة اصطدام ضخم
يحدث كل مائة مليون عام ، فإن احتمال وقوعه فى فترة تبلغ عشر سنوات
هو واحد على عشرة ملايين • والاحتمال بالطبع صحيح بالنسبة لأى
فترة من عشر سنوات ، بما فيها الأعوام العشرة التى ستحدث فيها الواقعة
•• ولكن هذا لن يساعدنا كثيرا فى تحديد العقد المميت !

لنا إذن أن نفترض أن لا استعدادات ستجرى لننجو من الواقعة •
فهل يمكن منعها ؟

هذا أمر عملى تماما مقارنة بالسابق ، بالرغم مما قد يبدو فى
هذه الجملة من غرابة • والحق أن فيلما من الخيال العلمى اسمه «النيزك»
(ظهر سنة ١٩٧٩) قد افترض هذه الواقعة بالتمديد ، وأن كان كويكبه
قد جاء من الحزام النجمى • أن بالنظرية من المصافاة ما يكفى • فإذا
ما أمكن رصد الجرم وهو ما يزال بعيدا عن الأرض ، فمن المفروض أن
نتسكن من اطلاق صواريخ تصمم لتنفجر على مقربة منه - وليس بالضرورة
على سطحه - بحيث تحرفه عن مساره • قد تبدو هذه المهمة صعبة للغاية،
ولكنها قد لا تكون كذلك • فهذه الصواريخ ستوجه نحو هدفها ، وليس
من الضرورى أن تصيبه اصابة مباشرة ، إذ يكفى أن تنفجر بجواره وتفرق
طاقة كافية ، فيتحرف الجسم ، ولا يهمنا كثيرا أى اتجاه سيسلكه ، لأن أى
انحراف سيأخذه بعيدا عن أرضنا •

كم يكفى من الطاقة كى نحرفه عن مساره ؟ ان هذا يتوقف على قدر
الانحراف المطلوب ، وهذا بدوره يتوقف على بعد الجسم عن الأرض عندما

ينحرف • لو تذكرت مشكلة اطلاق قذيفة على القمر ، فستذكر ان الزاوية ما بين أحد طرفى الهدف والآخر كانت صغيرة جدا • تصور الآن انك ستوجه قذيفتك نحو المريخ لا القمر • والمريخ جسم اكبر بكثير ، ولكنه يبدو لنا مجرد نقطة من الضوء فى السماء لا تختلف كثيرا عن النجوم بسبب انه يبعد كثيرا عنا • والزاوية بين حافظيه هى مجرد كسر صغير جدا من الدرجة • وتتناقص الزاوية كلما ازداد بعدنا عن الهدف • فاذا ما تمكنا من أن نرصد الكويكب وهو ما يزال يبعد عنا بضعة ملايين من الكيلومترات ، وإذا أمكننا أن نحسب مساره وتأكدنا من أنه سيصطدم بنا ، وإذا كان لدينا من الصواريخ التى يمكن إطلاقها ثم توجيهها من الأرض (لاحظ أن الصواريخ الحربية البعيدة المدى مبرمجة مسبقا ولا يمكن إعادة توجيهها بعد إطلاقها) بحيث يمكن أن تعترض الكويكب وهو ما يزال بعيدا عنا بملايين الكيلو مترات وعندئذ سيكفى من الطاقة بضع عشرات الملايين من الأطنان •

هل سيكون من العملى أن ننشئ نظاما دفاعيا كهذا ؟ مرة أخرى علينا أن نزن المخاطرة ونحن تفادينا • ان احتمال حدوث الاصطدام هذا العام لا يختلف عن احتمال حدوثه العام القادم ، ولكن ربما كان علينا أن نولى اهتمامنا الى نتائج مثل هذا الاصطدام ، لأن تكاليف النظام الدفاعى ستكون صغيرة جدا • فهو لا يستدعى الا قدرا متواضعا من الصواريخ والرؤوس الحربية - الموجودة بالفعل بكميات وافرة - ومن الممكن أن تجنب كل قوة من القوى العظمى عددا منها لهذا الغرض يتفق عليه دون أن يؤثر ذلك فى قدرتها الحربية • وهناك بالفعل خطط لتشييد مراصد تدور ، فاذا لم يكن المسح الروتينى للنظام الشمسى من بين المهام التى صممت من أجلها - وهذا يكاد يكون مؤكدا - فلن يكلفنا الكثير أن نضيف مثل هذه المهمة والمعدات اللازمة لها • قد لا تتواجد نظم توجيه الصواريخ منفصلة ، لكن المنظومات التى استطاعت أن تنزل بسلام عربات صغيرة على سطح المريخ والزهرة لن يصعب عليها اقامتها • فصناعتها ممكنة ، بل وواجبة • وستكون تكاليفها بسيطة ، فنتائج اصطدام كبير أمر يفوق كل تصوراتنا •

ربما كان فى هذا درس لن يفضل منا العودة الى طريق بسيط للحياة ، طريق أقل اعتمادا على التكنولوجيات المتطورة كوسيلة لبقاء الانسان •

اننا نستطيع أن نتفادى وقوع كارثة على مستوى الكرة الأرضية إذا ما كرسنا أكثر التكنولوجيات تقدما لحل المشكلة . فإذا كان الخطر حقيقيا ، وهو حقيقى ، فإن بقاء الإنسان – بل وربما بقاء معظم أشكال الحياة على هذا الكوكب – لا يمكن أن تؤمنه غير التكنولوجيات الرفيعة . اننا لا نقول ان الحياة نفسها ستنطفئ تماما فوق هذا الكوكب ، ولكننا نقول ان اتجاه التطور فى المستقبل قد يتغير . ربما استفاد أسلافنا من مثل هذا التغير فى الماضى ، فهل سنستفيد نحن أيضا ؟ هل نحن متأكدون من أنه لا توجد مجموعة صغيرة تافهة من الحيوانات تنتظر رحيلنا كى تتطور ؟ هل سنلعب نحن دور الدينوصورات فى المرة القادمة ؟

وقبل أن نترك الكويكب ربما حاولنا أن نعرف شيئا أكثر عن خبرة الأرض به وبأمثاله . ما حجم هذا التهديد مقارنة بغيره من التهديدات التى نسمع عنها أكثر ؟

الفصل الحادى عشر

البقاء

ناقشنا فى هذا الكتاب فاجعة واحدة • ولقد تعودنا منذ الستينات على تنبؤات بوقائع فاجعة - من هندسة البشر انفسهم - ستقع فى المستقبل • لماذا اذن نطلب منك ان تقبل - كحقيقة - واقعة تبدو حسب الظواهر اقل احتمالا وابعد كثيرا فى الزمن ؟

ربما كان علينا - بادئ ذى بدء - ان نناقش افطع الوقائع التى يمكننا تصورها : الحرب النووية الشاملة • ويقولون ان هذه الحرب تعنى القضاء على جنس البشر ، وربما كان فيها نهاية الحياة على الارض • سيحترق بها كوكبنا ويتحول الى رماد •

حسبت - كما نتوقع - نتائج مثل هذه الصرب • والواقع ان المجموعة التى قامت بهذه الحسابات قد عملت تحت رعاية اكااديمية العلوم الأمريكية • افترضت المجموعة حربا شاملة بين حلف شمال الأطلسى (ناتو) وحلف وارسو ، استعملت فيها كل الأسلحة المتاحة • سيعم الخراب اراضى الدول المتحاربة ، وسيقتل فيها الملايين من البشر • اما خارج نطاق هذه الدول - لا سيما فى نصف الكرة الجنوبى - فلن يكون الأثر الا ضئيلا (وهذه الحرب على أية حال ستقتصر على نصف الكرة الشمالى ، ولن تشمل الكرة الأرضية بأكملها) ، أما السبب فى اقتصارها على نصف الكرة الشمالى فيرجع أساسا الى القدر المحدود جدا لتبادل الهواء عبر خط الاستواء • وفى خلال ثلاثين سنة من هذه الحرب ستعود ثانية كل النظم البيئية الطبيعية التى تأثرت ، ولن تحفظ الأرض جروحا تترك ندوبا دائمة • ستهن الحرب الجنس البشرى ، لكن ليس ثمة احتمال لانقراض الانسان ، ناهيك عن انقراض الحياة نفسها •

هذه هى النتيجة التى نتوقعها من المعلومات التى نعرفها • نعلم ان موت البشر بعد استعمال القنبلتين الذريتين على اليابان عام ١٩٤٥ قد

نتج عن الحرارة ، عن الانفجار العنيف ، عن الاشعاع (أساسا الاشعاع الذى انبعث مع وهج الانفجار) وعن تلوث الجروح التى لم يمكن معالجتها لنقص الخدمات الطبية ، وعن الأمراض الناتجة عن تلوث مصادر المياه .

تعرض الكثيرون لجرعات عالية من الاشعاع المؤين ، ومات الكثيرون بسببه ، وكان المتوقع أن من تعرض لجرعات غير قاتلة ، ومن تعرض للاشعاع عن طريق الغبار المتساقط بعيدا عن منطقتى الانفجار ، كل هؤلاء سيصابون فى مستقبل حياتهم بأمراض سببها الاشعاع . ولقد حدث هذا فعلا للبعض . لكن أنواع الأمراض التى نربطها بالاشعاع - وهى السرطانات أساسا - تحدث أيضا لأسباب أخرى ، والبشر جميعا يتعرضون باستمرار للاشعاع الطبيعى . ولما كانت هذه الأمراض تحدث بالمجتمعات البشرية فى كل مكان ، فلا يصح أن نعزو للاشعاع الذى هو من صنع الانسان ، الا ما يزيد عن المعدل المتوقع . والآن ، وبعد مرور ٢٨ عاما من القاء القنبلتين ، سنجد أن نسبة هذه الأمراض فى المدينتين اقل من نسبتها فى المجتمعات التى تتعرض لمثل هذا الاشعاع . وعلى هذا ، فإن فكرة أن يكون اشعاع الأسلحة الذرية هو السبب الرئيسى فى الموت ، أو أن يكون هو السبب فى تزايد ظهور الطفرات الوراثية ، هذه الفكرة لا أساس لها . اننا لا نحاول أن نبرر أو نغفر ما حدث لهيروشيما ونجازاكى ، لكن تبقى الحقيقة ، وهى أن هاتين المدينتين قد ازدهرتا واكتظتا بالبشر ، بعد أن كانتا اكرواما مهجورة من الحطام .

ولدينا الآن بيانات مفصلة عن جزيرة بكينى المرجانية وجزيرة اينوتوك ، الموقعين بالباسيفيكي اللذين يستخدمان فى اختبار الأسلحة الذرية . فهاتان الجزيرتان بجانب مواقع الاختبار السوفيتية بسيبيريا هى أكثر الأماكن على سطح الأرض تعرضا للاشعاع . تحطمت كل الحياة عليها اثناء فترة الاختبار ، كما احترقت تربتها وصوح بها ، ليتعمرى الصخر أجردا . وعندما توقفت الاختبارات، عادت الحياة تستعمرها ثانية، حتى ليكاد يكون من المستحيل الآن أن نميزها ايكولوجيا عن المواقع الشبيهة فى المناطق الأخرى من العالم التى لم تتعرض لمثلها .

ندرك إذن أن كوكبنا يستطيع فعلا أن ينجو من أسوأ كارثة - من صنع أيدينا - يمكن تخيلها . ولم لا ؟ ألم تتحمل الأرض هذا الاصطدام، الذى وصفناه ، بالكويكب الذى كان أسوأ آلاف المرات ؟ .

قد يساعدنا هذا فى أن نضع بمخيلتنا فكرة قدرة النشاط البشرى على تعظيم الحياة على الأرض . فإذا ما تفحصنا التنبؤات المتشائمة بتفصيل أكبر فسنجد أنها مبنية على بيانات خاطئة أو على تقديرات مبالغ فيها

جدا عن قوة الانسان • سنلوث البحار حتى تصبح غير صالحة لاقامة الحياة • سندمر النباتات الخضراء • لا سيما الفيتويلانكتون البحري - فيستنفذ أكسجين الغلاف الجوى • سنستخدم علب الايروسول فنخرب طبقة الأوزون وتشوينا الأشعة فوق البنفسجين! سنشيد الكثير والكثير من محطات القوى النووية فنحطم انفسنا (بآليات لم نعيها) ! ان القائمة طويلة جدا ، واذا ما سخرنا منها فاننا لا نقصد ان نسخر من الاهتمام بالبيئة الأرضية • ان هذا يستحوذ على اهتمامنا الحقيقي • ولكن ليس هناك من عذر اذا لم نستخدم ما لدينا من معرفة فى جعل كوكبنا أكثر حسنا وبهجة ، لأجلنا ولأجل الأنواع الأخرى • ان كل ما علينا ان نفعله هو ان نشطب من قاموسنا الجمل الأكثر تهورا ، وأولها وأخطرهما هى ان النشاط البشرى يهدد حياة الانسان ويمكن ان يهددها - برغم أننا بالطبع نستطيع ان نحطم مدنا بل وأوطانا بكل ما تحمله من بشر - او انه يهدد الحياة بأكملها •

كيف يمكن ان نتأكد من هذا ؟ لقد عمل كلانا فكره فى هذه القضية سنين وسنين لنصل الى نفس النتيجة عن طريقين مختلفين • ولقد قادنا الاستنتاج الى ان ننظر الى الأرض ، والحياة التى تدعمها ، بما قد يبدو نظرة جديدة • ان الحياة لا شك مرنة للغاية سهلة التكيف ، تبرا بسرعة من جرحها ، فتستعاد الظروف الملائمة للحياة • وهى تستعاد - كما نشأت أصلا - عن طريق الكائنات الحية نفسها • ولقد شكلت العمليات الحيوية سطح الأرض بأكمله من أعماق محيطاته الى اقصى قمة لغلافه الجوى • ولقد شرح الجدل المعضد لهذه النظرة فى كتاب : « جايا : نظرة جديدة للحياة على الأرض » (مؤلفه ج ١٠٠ لوفلوك ، سنة ١٩٧٩) ، فلا يلزمنا اذن ان نلخصها هنا • والجدل فى ذلك الكتاب يبرر مرونة الحياة •

وهو يضع النشاط البشرى فى منظوره الصحيح • فنحن نحرف مثلا ان مناطق مختلفة من كوكبنا على خطوط العرض العليا تختفى تحت ملاءات ثلجية فى عملية تسمى عملية التثلج • وكل السطوح الأرضية الموجودة على خطوط عرض اعلى من ٤٥° شمالا أو جنوبا قد تثلجت يوما وستثلج ثانية • يقتل التثلج كل الحياة النباتية وربما ايضا معظم الكائنات الدقيقة بالتربة ، كما يسبب فساد القرية على سطح الأرض • وهو يسبب خرابا على مستوى يفوق بكثير المصاومات الثقافية لرجال الصناعة أو حتى رجال الزراعة • ولما لم يكن للتثلج اثر ضار مستديم على الحياة ككل ، فلنا ان نثق بأن المناطق على خطوط العرض العليا مناطق مرنة ، فإيا كان ما نفعله بسطح تربتها ، فالأغلب الا تكون النتائج خطيرة • ولنا ايضا ان نثق فى ان المشاكل البيئية التى يسببها التوسع.

الصناعى لن تكون على الأرجح خطيرة طالما كانت قدرتنا على التنسيق بنتائج العمليات التى نبدؤها - ومن ثم السيطرة عليها - يمشى بنفس المعدل أو أسرع . ربما كان التوسع فى مجال صناعة المعلومات الآن هو الأكبر ، وبذا فإن المشاكل البيئية تحد الآن وتشخص بمعدل سريع . وبرغم وجود الكثير من المشاكل السياسية فإن العمل المناسب عادة ما يتخذ .

تنشأ معظم مخاوفنا البيئية من ملاحظتنا أن البشر يحورون من بيئتهم كى تصبح أكثر ملاءمة لهم ولنباتهم وحيواناتهم المستأنسة . وعادة ما يقابل الموطن الذى يصنعه الانسان بالموطن الذى لم يصنعه هو ، فمثل هذا الأخير يعتبر موطننا « طبيعيا » ، وهذا يعنى تضمينا أن ما يصنعه الانسان « ليس طبيعيا » . وعلى هذا فالغاية العذراء « طبيعية » والمزرعة التى تجاوزها ليست كذلك . ولقد تسبب هذا الخطأ البسيط ، فى الملاحظة وفى المنطق ، فى الكثير جدا من المشاكل . وإذا كان لنا أن نميز بدقة بين التهديدات الحقيقية والتخيلية فعلينا أن نصححه .

أن كل الأنواع - بدءا من أبسط الكائنات الدقيقة وحتى أكبر نبات أو حيوان - كلها تحور من بيئاتها المباشرة ، ولا حيلة لها فى ذلك . أن نشاطا أساسيا كالتنفس يغير من كيمياء الجو ، ولقد غير التمثيل الضوئى - وهو العملية الطبيعية تماما - غير بشكل جذرى ، فى التاريخ المبكر للأرض ، من كيمياء الجو باطلاق غاز الأكسجين . وكان هذا الغاز شديدا السمية بالنسبة للكثير من الكائنات التى كانت موجودة عندئذ . كانت هذه الكائنات على أية حال قد تعودت على بيئة خالية من الأكسجين . وكان انتاج كميات وفيرة من هذا الغاز هو أخطر واقعة تلوث فى تاريخ هذا الكوكب - ورغم ذلك لم تندثر الحياة ، لقد بقيت ، تماما كما حدث أيضا عقب الاصطدام بالكويكب فى العصر الطباشيرى . ولا يحتاج الأمر الرجوع بعيدا فى الزمن كى نبحث عن بيئة من صنع غير البشر ، لأن كل بيئات الأرض قد صنعت هكذا . أن بعض الكائنات تحور من بيئاتها بطريقة يمكن ملاحظتها مباشرة . أن فى مقدور القندس أن يحيل أراضى الغابات الى مراعى ، وهو يفعل ذلك . وحيوانات الرعى الكبيرة تميل الغابات الى برارى . فإذا ما حور البشر من بيئتهم ، فهم بالطبع لا يقومون بما لا يفعله غيرهم من الأنواع الحية .

أن استعمال كلمة « الطبيعى » ليس بأكثر من تشوش لفظى نجم عن كلمة لها - وكان لها - العديد من المعانى . حملت الكلمة معنى أخلاقيا إضافيا على الأقل لدى القديس توماس الأكوينى عندما كتب عن « القانون الطبيعى » ، والذى كان يعنى به « القانون الإلهى » . ولقد ضمننا هذا - مدركين أو غير مدركين - فى حكمنا على سلوك البشر عندما نقابل

بين السلوك « الطبيعي » - أو الهمجي ، أو « الحيواني » - والسلوك « المتحضر » . ولقد أصبح الناس في القرنين الماضيين يميلون الى تفضيل هذا النوع من السلوك أو الآخر . ولقد ناصر مؤخرا بعض علماء البيئة وجهة نظر جان جاك روسو القائلة بأن الانسان في « الحالة الطبيعية » يعيش في سلام مع بيئته « الطبيعية » . وأصبح الناس يعتقدون في خرافة « الهمجي النبيل » - وساندهم في ذلك الكثير من الانسانيين الهواة ، كما لو كان الأمر حقيقيا . أما الحقيقة فهي بالطبع اننا انفسنا قد أصبحنا « الهمج النبلاء » ، وليس هناك أدنى سبب يدعون أن نتصور أن أجدادنا الأقربين كانوا أكثر إدراكا بالبيئة منا نحن . والواقع أن الشواهد المعروفة تشير الى أنهم كانوا أقل منا إدراكا بها .

وعلى هذا فليس أمامنا الا أن نستنتج أن قدرتنا على تحطيم العالم، أو حتى تحطيم انفسنا ، هو أمر خيالي تماما ، ناتج عن عجزتنا . ولو اننا اكتسبنا مثل هذه القدرة - وفي الامكان اكتسابها اذا طورنا مثلا مصادر للطاقة رخيصة لا تنضب يمكن أن نرفع بها حرارة الجو حتى نصل الى تثبيت ظاهرة صوتية دائمة - نقول لو اكتسبنا مثل هذه القدرة فمن المستبعد الا نستطيع السيطرة عليها . ان الأفضل أن نتأكد تماما بأن قدراتنا على السيطرة على صناعاتنا وتكنولوجياتنا لن تتآكل . وهذا لن يتطلب منا أكثر من اليقظة . ان علينا أن ننظر بعين الشك لكل من يحاول أن يجعلنا نرفض الصناعة والتكنولوجيا بعامة ، وتكنولوجيا المعلومات بالذات . ان مثل هؤلاء يجعلون من زوالنا أمرا أكثر احتمالا ، لا أقل .

لا بد ان تأتي التهديدات الحقيقية من خارج الأرض ، ولعل أكثرها مباشرة هو اصطدام كويكب كبير بالأرض . ان احتمال حدوث هذا احتمال كبير يكاد يبلغ حد اليقين . لقد تسبب مثل هذا الاصطدام ذات يوم منذ خمس وستين مليون سنة في تغيير مسار التطور ، أو على الأقل في اسراع عجلته . فماذا يا ترى سينتج لو حدث اصطدام آخر ؟ ان علينا - نحن - أن نستطيع تخمين النتائج - واجبا أخلاقيا أن نأخذ هذا مأخذ الجد ، وأن نقوم بكل ما نستطيع من خطوات متواضعة ورخيصة الثمن كي نتفادها ، لأننا نعتقد أن في إمكاننا أن نتفادها . اننا ندين بالكثير لن يحدو حدوثنا ، انسانا كان أو غير بشر .

فإذا بحثنا عن تهديدات أخرى ، فسنجدها . اننا نشغل قطعة ثائرة خطيرة في السماء . لكن هذه قصة أخرى ..

الفهرس

الموضوع	الصفحة
مقدمة المترجم	• • • • •
مقدمة	٧ • • • • •
١ - العثور على الجثة	١١ • • • • •
٢ - أدلة من الصلصال	٢٣ • • • • •
٣ - فجأة ، أم بالتدريج ؟	٢٩ • • • • •
٤ - السحب والمذنبات والنيازك	٦١ • • • • •
٥ - برميل النار	٧٧ • • • • •
٦ - السماء والبحر والصخر	٩٥ • • • • •
٧ - أسباب الوفاة	١١٥ • • • • •
٨ - القتل الرهيب للجو	١٣٥ • • • • •
٩ - مسرح الجريمة	١٥٥ • • • • •
١٠ - السماء الثائرة	١٧٥ • • • • •
١١ - اليقظاء	١٨٧ • • • • •

● ● صدر من هذه السلسلة :

المؤلف	اسم الكتاب
برتراند رسل	١ - أحلام الأعلام وقصص أخرى
ي . وادونسكايا	٢ - الإلكترونيات والحياة الحديثة
السدس هكسلى	٣ - نقطة مقابل نقطة
ت . و . فريمان	٤ - الجغرافيا فى مائة عام
رايموند وليامز	٥ - الثقافة والمجتمع
ر . ج . فوريس	٦ - تاريخ العلم والتكنولوجيا . ج ٢
ليستر ديل راي	القرن الثامن عشر والتاسع عشر
والتر ألن	٧ - الأرض الغامضة
لويس فارجاس	٨ - الرواية الانجليزية
فرانسوا دوماس	٩ - المرشد الى فن المسرح
د . قدرى حفى وأخرون	١٠ - آلهة مصر
أولج فولكف	١١ - الانسان المصرى على الشاشة
هاشم النحاس	١٢ - القاهرة مدينة ألف ليلة وليلة
ديفيد وليام ماك دونالد	١٣ - الهوية القومية فى السينما العربية
عزیز الشوان	١٤ - مجموعات النقود . صيانتها ٠٠ تصنيفها ٠٠ عرضها
	١٥ - الموسيقى - تعبير نغمى - ومنطق
د . محسن جاسم الموسوى	١٦ - عصر الرواية - مقال فى النوع الأدبى
اشراف س . بى . كوكس	١٧ - ديLAN توماس
جون لويس	١٨ - الانسان ذلك الكائن الفريد
بول ويسبت	١٩ - الرواية الحديثة
د . عبد المعطى شعراوى	٢٠ - المصرح المصرى المعاصر
أنور المصناوى	أصله ويدايتة
بيل شول وأدلييت	٢١ - على محمود طه . الشاعر والانسان
د . صفاء خلوصى	٢٢ - القوة النفسية للامرام
	٢٣ - فن الترجمة

المؤلف	اسم الكتاب
رالف ماتيلو	٢٤ - تولستوى
فيكتور برومير	٢٥ - سقندال
فيكتور هوجو	٢٦ - رسائل وأحاديث من المنفى
فيرنر هيزنبرج	٢٧ - الجزء والكل
سدنى هوك	٢٨ - التراث الغامس ماركس
ف.ع. أدنيكوف	والماركسيون
هادى نمان الهيتى	٢٩ - فن الأدب الروائى عند تولستوى
د. نعمة رحيم العزاوى	٣٠ - أدب الأطفال (فلسفته - فنونه - وسائله)
د. فاضل أحمد الطائى	٣١ - أحمد حسن الزيات
فرنسيس فرجون	٣٢ - أعلام العرب فى الكيمياء
هنرى باربوس	٣٣ - فكرة المسرح
السيد عليوة	٣٤ - الجحيم
جواكوب برونوفسكى	٣٥ - صنع القرار السياسى فى منظمات الادارة العامة
د. روجر ستروجان	٣٦ - التطور الحضارى للانسان
كاتى ثير	(ارتقاء الانسان)
ا. سبنسر	٣٧ - هل نستطيع تعليم الاخلاق للأطفال ؟
د. ناعوم بيتروفيتش	٣٨ - تربية الدواجن
جوزيف داهموس	٣٩ - الموتى وعالمهم فى مصر القديمة
	٤٠ - النصل والطب
	٤١ - سبع معارك فاصلة فى العصور الوسطى
	٤٢ - سياسة الولايات المتحدة
د. لينوان تشامبرز رايت	الامريكية ازاء مصر
د. جون سنذر	١٨٣٠ - ١٩١٤
بيير البير	٤٣ - كيف تعيش ٣٦٥ يوما فى السنة
	٤٤ - الصحافة
الدكتور غبريال وهبه	٤٥ - اثر الكوميديا الالهية لدانتى فى الفن التشكيلى

المؤلف

اسم الكتاب

- ٤٦ - الأدب الروسى قبيل الثورة البلشفية وبعدها د. رمسيس عوض
- ٤٧ - حركة عدم الانحياز فى عالم متغير د. محمد نعمان جلال
- ٤٨ - الفكر الأوروبى الحديث ج ١ فرانكلين ل. باومر
- ٤٩ - الفن التشكلى المعاصر فى الوطن العربى ١٨٨٥-١٩٨٥ شوكت الريمى
- ٥٠ - التنشئة الأسرية والأبناء الصغار د. محيى الدين أحمد حسين
- ٥١ - نظريات الفيلم الكبرى تأليف : ج. ج. دادلى أندرو
- ٥٢ - مختارات من الأدب القصصى جوزيف كورناد
- ٥٣ - الحياة فى الكون كيف نشأت وأين توجد ؟ د. جوهان دورشنر
- ٥٤ - حرب الفضاء ، دراسة تحليلية طائفة من العلماء الأمريكينة
- ٥٥ - إدارة الصراعات الدولية ، دراسة د. السيد عليوة
- ٥٦ - الميكروكمبيوتر د. مصطفى عنانى
- ٥٧ - مختارات من الأدب اليابانى (الشعر - السردا - الحكاية - القصة القصيرة) اختيار وترجمة
- ٥٨ - الفكر الأوروبى الحديث ج ٢ اليابانيين القدماء والمحدثين
- ٥٩ - تاريخ ملكية الأرض فى مصر الحديثة فرانكلين ل. بلومر
- ٦٠ - اعلام الفلسفة السياسية المعاصرة جابريل باير
- ٦١ - الفكر الأوروبى الحديث ج ٣ أنطونى دى كوسبى
- ٦٢ - كتابة السيناريو للسينما فرانكلين ل. باومر
- ٦٣ - الزمن وقياسه دوايت سوين
- ٦٤ - أجهزة تكييف الهواء زافيلسكى ف. س
- ٦٥ - الخدمة الاجتماعية والانتضباط الاجتماعى ابراهيم القرضاوى
- ٦٦ - سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى بيتر ر. داي
- ٦٧ - التجربة اليونانية جوزيف داهموس
- ٦٨ - مراكز الصناعة فى مصر الاسلامية س. م. بورا
- د. عاصم محمد رزق
- رونالد د. سمبسون

المؤلف	اسم الكتاب
رونالد د. سمبسون	٦٩ - العلم والطلاب والمدارس
و نورمان د. اندرسون	٧٠ - الشارح المصرى والفكر
د. انور عبد الملك	٧١ - حوار حول التنمية
والت روستو	٧٢ - تبسيط الكيمياء
فريد هيس	٧٣ - العادات والتقاليد المصرية
جون بوركهارت	٧٤ - التذوق السينائى
آلان كاسبر	٧٥ - التخطيط السياحى
سامى عبد المعطى	٧٦ - البذور الكونية
فريد هول	
شنندرا ويكرا ماسينغ	٧٧ - دراما الشاشة ج ١
حسين حلمى المهندس	٧٨ - الهيرودين والايديز
روى روبرتسون	٧٩ - الفكر الاوربى الحديث ج ٤
فرانكلين ل. باومر	٨٠ - نجيب محفوظ على الشاشة
هاشم النحاس	٨١ - صبور افريقية
دور كاس ماكينتوك	٨٢ - الكمبيوتر فى مجالات الحياة
د. محمود سرى طه	٨٣ - دراما الشاشة ج ٢
حسين حلمى المهندس	٨٤ - المخدرات حقائق اجتماعية
بيتر لسورى	ونفسية
	٨٥ - وظائف الأعضاء من الألف
بوريس فيدروفيتش سيرجيف	الى الياء
ويليام بينر	٨٦ - الهندسة الوراثية
ديفيد الدرتون	٨٧ - تربية أسماك الزينة
أحمد محمد الشنوانى	٨٨ - كتب غيرت الفكر الانسانى
جمعها : جون ر. بورو	٨٩ - الفلسفة وقضايا العصر ج ١
جمعها : جون ر. بورو	
وميلتون جولدينجر	٩٠ - الفكر التاريخى عند الاغريق
أرنولد توينبى	٩١ - قضايا وملامح الفن التشكيلى
د. صالح رضا	٩٢ - التغذية فى البلاد النامية
م.م. كنج وآخرين	
وميلتون جولدينجر	٩٣ - الفلسفة وقضايا العصر ج ٢
جورج جاموف	٩٤ - بداية بلا نهاية

اسم المؤلف	اسم الكتاب
د. الصيد طه أبو سديرة	٩٥ - الحرف والصناعات في مصر الإسلامية
جاليليو جاليليه	٩٦ - حوار حول النظامين الرئيسيين للكون ج١
جاليليو جاليليه	٩٧ - حوار حول النظامين الرئيسيين للكون ج٢
جاليليو جاليليه	٩٨ - حوار حول النظامين الرئيسيين للكون ج٣
أريك موريس ، آلان هو	٩٩ - الارهاب
سيريل الدريد	١٠٠ - أخناتون
آرثر كيسترل	١٠١ - القبيلة الثالثة عشرة
جميعها : جون ر. بورر	١٠٢ - الفلسفة وقضايا العصر ج ٣
ميلتون جولده ينجر	
ر.ج. فويس ،	١٠٣ - العلم والتكنولوجيا
أ.ج. ديكسترهوز	١٠٤ - الأساطير الاغريقية
كوفلان	
توماس هاريس	١٠٥ - التوافق النفسي
مجموعة من الباحثين	١٠٦ - الدليل البيولوجرافي
روى أرمنز	١٠٧ - لغة الصورة
ناجاي متشيو	١٠٨ - الثورة الاصلاحية في اليابان
بول هاريسون	١٠٩ - العالم الثالث غدا

مطابع الهيئة العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ٥٦٨٢ / ١٩٩٢

ISBN — 977 — 10 — 3103 — 2

يعرض الكتاب نقادية جديدة شيقة تعلل انكراض
الدينوصورات في نهاية العصر الطباشيرى ومعها نحو
٧٠٪ من الشائعات الحية التي كانت موجودة عندئذ
يؤثق الكاتبان النظريه ببياهين تمتاز فيها علم التطور
والطريات والزراعه والجيولوجيا والبيئة والمنح
والأقلام والكيمياء والفيزيكا والفاك